

Ex Libris Quos

INSTITUTIONI SMITHSONIANAE

Anno MCMV Donavit

John Donnell Smith

Accesio N.

D46

8/9/61

CRYPTOGAMES VASCULAIRES

DU

BRÉSIL

STRASBOURG, IMPRIMERIE DE VEUVE BERGER-LEVRAULT.

QK
526.4
B6F29
1869
pt. 1-2
Bot.

CRYPTOGAMES VASCULAIRES

(FOUGÈRES, LYCOPODIACÉES, HYDROPTÉRIDÉES, ÉQUISÉTACÉES)

DU

BRÉSIL

PAR

A. L. A. FÉE

PROFESSEUR DE BOTANIQUE A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE STRASBOURG
MEMBRE TITULAIRE DE L'ACADÉMIE IMPÉRIALE DE MÉDECINE
OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR

AVEC LE CONCOURS ÉCLAIRÉ DE M. LE DOCTEUR F. M. GLAZIOU, DIRECTEUR DES JARDINS IMPÉRIAUX DU BRÉSIL A RIO-JANEIRO
OFFICIER DE L'ORDRE DU CHRIST

MATÉRIAUX POUR UNE FLORE GÉNÉRALE DE CE PAYS

SMITHSONIAN INSTITUTION
JUL 29 1929
SPECIAL COLLECTIONS

PARIS

J. B. BAILLIÈRE ET FILS, LIBRAIRES
RUE HAUTEFEUILLE, 19

VICTOR MASSON ET FILS, LIBRAIRES
RUE DE L'ÉCOLE DE MÉDECINE, 17

VEUVE BERGER-LEVRAULT & FILS, LIBRAIRES
RUE DES BEAUX-ARTS, 5
MÊME MAISON A STRASBOURG

1869

SMITHSONIAN INSTITUTION
JUL 29 1925
SPECIAL COLLECTIONS

586
F 29
J.D.S.

INTRODUCTION.

Le Brésil, cette riche et magnifique contrée, forme à elle seule les deux cinquièmes de l'étendue totale de l'Amérique du Sud, dont elle est la partie la plus orientale. Malgré l'immense étendue de ce continent[1], le climat est en général tempéré, même au voisinage de l'équateur. Dans les terres basses, le thermomètre, qui ne s'élève que très-rarement au-dessus de 27 à 28 degrés centigrades, ne s'abaisse presque jamais au-dessous de 12 à 13. Dans la province de Saint-Paul, il gèle parfois en hiver, et dans quelques autres provinces, la chaleur est souvent très-vive; mais ce sont là des circonstances purement locales et exceptionnelles. Nulle part sur le globe les conditions ne sont plus favorables à la végétation; aussi est-elle d'une incomparable beauté. Outre la bénignité de la température, le sol est sillonné par d'innombrables cours d'eau, qui répandent dans l'air des vapeurs aqueuses sans cesse renouvelées, profitables aux plantes. Les terrains sont accidentés et de nature variée. Des montagnes, dont l'altitude ne dépasse pas 2,400 mètres, courent dans toutes les directions, et il en descend d'intarissables ruisseaux qui fertilisent les plaines et portent partout

1. Humboldt évalue la superficie totale du Brésil à 256,886 lieues carrées de 20 au degré, soit 1,412,873 kil. carrés. Il s'étend en latitude de 4°,33′ nord jusqu'à 33°,45′ latitude sud et en longitude ouest entre les 37°,45′ et 75°,4′ de longitude occidentale.

l'abondance et la vie. Ce climat merveilleux convient à toutes les flores et permet sans peine l'acclimatation des plantes de toutes les régions de la terre.

Le Brésil a été exploré depuis sa découverte, qui date déjà de plus de trois siècles, par une foule de naturalistes de tous les ordres, car s'il est, comme le dit Humboldt, le paradis des botanistes, il est aussi celui des zoologistes et des minéralogistes. Plusieurs d'entre eux ont su y conquérir par leurs travaux une solide et brillante renommée; conquérants pacifiques, ils ont agrandi le domaine de la science, et ce résultat glorieux s'est résumé tout entier dans des fatigues et des dangers personnels. Pour ne parler que des botanistes, dès 1684 Pison publiait une matière médicale des Brésiliens, particulièrement établie sur le règne végétal; Vandelli en 1788, Gomès en 1803, Raddi en 1820, et, dans la même année, Mikan se sont occupés avec succès des plantes brésiliennes; mais leurs investigations le cèdent en importance et en durée à celles auxquelles se sont livrés A. Saint-Hilaire et Martius, hommes de science et de conscience, dont il serait ici superflu de faire l'éloge.

Le voyage entrepris par A. Saint-Hilaire n'est qu'une longue et fructueuse herborisation qui n'a pas duré moins de six ans (1816-1822). Ce naturaliste a supporté avec un courage héroïque les fatigues d'une exploration entreprise à travers des contrées malsaines, difficiles à parcourir, parfois inhabitées, n'offrant aucune ressource pour les besoins ordinaires de la vie.

Près de 10,000 kilomètres, depuis le 13e degré de latitude sud jusqu'à Rio de la Plata, furent parcourus, et telle fut la persévérance dans cette grande chasse du naturaliste qu'elle produisit près de 50,000 échantillons d'objets divers appartenant aux trois règnes, parmi lesquels environ 24,000 plantes, et pourtant ce résultat gigantesque avait été obtenu par un homme d'une constitution faible et maladive. Les grands ouvrages destinés à mettre au jour tant de riches découvertes n'ont été que médiocrement favorisés par les circonstances, aussi n'ont-ils pas été tous terminés. La *Flora Brasiliensis*, publiée de 1825 à 1833, s'est arrêtée au premier tiers du troisième volume, et il devait y en avoir quatre ou même cinq. L'histoire des plantes les plus remarquables du Brésil et du Paraguay, commencée vers la même époque, n'a pu aller au delà du premier volume. Il en est souvent ainsi des publications de longue haleine et d'un prix élevé; les souscripteurs se

lassent ou meurent; les gouvernements changent, les fonds s'épuisent et tout s'arrête.

Martius, qu'une mort récente vient d'enlever à la science, a été plus heureux; membre actif de l'expédition brésilienne austro-bavaroise, il a passé près de quatre ans (1817-1820) livré tout entier à la recherche des plantes du Brésil. Il avait une prédilection toute particulière pour la belle famille des palmiers, et il a publié, de 1823 à 1845, le plus splendide ouvrage de botanique qui ait paru jusqu'à lui, véritable monument élevé à la science, dont l'exécution honore tout à la fois l'auteur et le pays qui a secondé ses efforts. Martius, occupé de ces plantes dans la jeunesse, forme l'espoir qu'il revivra par les palmiers: *In palmis semperparens juventus, in palmis resurgo,* a-t-il écrit au bas de son portrait. Il aimait aussi beaucoup les fougères; aidé dans la détermination de ces plantes par Kunze, et par Hugo Mohl dans l'analyse microscopique des stipes, il en a édité plusieurs espèces nouvelles, principalement parmi les espèces arborescentes[1], *Alsophila* et *Cyathea.* Ce botaniste évaluait approximativement la flore du Brésil à 60,000 espèces, dont 25,000 conservées dans les herbiers ou cultivées dans les jardins. Nous ne savons pas sur quelles données se fonde l'illustre voyageur pour fixer ce chiffre; mais s'il était réel, il renverserait cette loi de géographie botanique, qui établit que les rapports numériques existant entre les fougères et les plantes phanérogames s'élèvent au profit des premières au fur et à mesure qu'on s'approche de l'équateur. En France, elles sont aux plantes mono et dicotylédones comme 1 est à 78; au Brésil, elles en formeraient la 75e partie, produit de 60,000, chiffre total de la flore, donné par Martius, divisé par 800, nombre approximatif des espèces de fougères et de lycopodiacées brésiliennes; proportions bien voisines. Au reste, pour trouver cette prédominance numérique, ce n'est point aux continents qu'il faut s'adresser, mais aux îles. Là, les terrains sont plus uniformes, les conditions atmosphériques moins variables; la mer, qui les enceint, entretient une humidité constante, profitable surtout aux cryptogames vasculaires.

---

1. *Icones selectæ plantarum cryptogamicarum, quas in itinere annis* 1817-1820 *per Brasiliam instituto collegit et descripsit Martius.* Munich, 1828-1834, petit in-fol.

Le premier ouvrage uniquement consacré aux fougères du Brésil est dû au botaniste florentin Raddi, envoyé dans cette contrée, en 1817, par le grand-duc Ferdinand III de Toscane; il y fit de riches récoltes, surtout en cryptogames, et publia à Florence, en 1824, un livre accompagné d'une grande quantité de planches, médiocrement exécutées, mais très-fidèles. On était alors au début de la lithographie, et l'auteur[1] nous apprend que les dessins ont été exécutés par de jeunes personnes plus zélées qu'habiles, sans le concours desquelles l'ouvrage n'aurait pu paraître; rien ne dispose davantage à l'indulgence.

Après ces botanistes, auxquels doit être assigné le premier rang, il convient de citer très-honorablement deux de nos amis les plus regrettés : Gaudichaud (1818) et Guillemin (1827); puis viennent, par ordre alphabétique, pour avoir fourni des matériaux précieux d'étude, Blanchet, Claussen, Gardner (1836-1841), Pohl (1837-1841), Sellow et Spruce. Ces collecteurs et d'autres encore que nous pourrions nommer, infatigables dans leurs explorations, pouvaient faire croire que désormais rien ne serait plus rare dans ce pays que la découverte d'espèces nouvelles, lorsque M. le docteur Glaziou, de Rio-Janeiro[2], s'est livré avec ardeur à de nouvelles recherches faites avec une parfaite connaissance des lieux. Le résultat de ces herborisations a dépassé tout ce qu'il en pouvait attendre, et c'est à décrire ces fougères, qui nous ont été généreusement offertes, que cet ouvrage est consacré. Il est, à vrai dire, l'œuvre de M. Glaziou plutôt que la nôtre : les fatigues du collecteur dépassant outre mesure celles du botaniste sédentaire, qui étudie à loisir et comme il lui plaît les matériaux à lui communiqués, sans cesser de jouir un seul instant de son bien-être de tous les jours.

Les longues distances à parcourir, les hautes montagnes à escalader, les épaisses forêts à pénétrer, rien n'a pu un seul instant, chez M. Glaziou, ralentir une activité sans cesse renaissante. Les excursions les plus pénibles faites en Europe, à l'exception de celles qui ont pour but d'escalader les

---

1. *Plantarum Brasiliensium nova genera et species novæ vel minus cognitæ* (*filices*). Florentiæ, 1824, in-4°. 97 planches et 159 espèces décrites.

2. Docteur en philosophie, directeur des parcs et jardins particuliers de S. M. l'Empereur du Brésil, officier de l'ordre du Christ, etc.

hautes sommités des Alpes, entreprises dangereuses, dont l'issue, fût-elle heureuse, ne rapporte d'ordinaire rien à la science, ne sauraient donner la moindre idée de ces explorations à travers des régions encore sauvages, où rien ne vient en aide au voyageur. Il lui faut non-seulement du courage, mais aussi de la résignation : du courage, pour braver la piqûre des insectes, la morsure des serpents et la dent des animaux carnassiers; de la résignation, pour renoncer à la satisfaction des nécessités de la vie dans ce qu'elles ont de plus impérieux. En parcourant nos musées d'histoire naturelle, le visiteur émerveillé ne songe guère à ce qu'il a fallu de temps et de fatigue pour réunir ces trésors qui le mettent en rapport par les yeux avec les productions naturelles les plus rares, éparses sur toute la surface du globe et maintenant réunies.

Sans doute, l'aspect majestueux des grands cours d'eau, les vastes horizons, les forêts sans limites, une nature féconde pour laquelle la terre semble trop petite, ont un charme puissant pour le voyageur, mais peu à peu l'isolement que soutient l'amour des choses nouvelles vient peser sur lui. L'homme est éminemment social; c'est là son instinct; il ne saurait se passer de la vue de ses semblables et veut communiquer avec eux. Ce n'est pas assez de trouver une chose belle, il faut avoir quelqu'un près de soi pour le lui dire. Sans l'avoir goûté, nous nous associons volontiers par la pensée au plaisir que doit éprouver le naturaliste, lorsque, après de longs jours passés dans l'isolement, il entend, inopinément, le son de la voix humaine, et qu'il voit, à travers les arbres, s'élever la fumée de quelque foyer hospitalier, auprès duquel il va bientôt s'asseoir. Ce qui l'a soutenu, c'est la passion, et M. Glaziou est passionné. On ne fait rien de considérable à froid. Écoutons-le parler dans ses lettres et l'on pourra juger combien est grand son amour des recherches si elles peuvent servir la science : « Du village de Theresopolis au point culminant de la montagne des Orgues (Serra os Orgaos, 2,332 mètres), nous écrit-il, lettre d'octobre 1868, il faut marcher quatorze heures. La fatigue est extrême, et pendant les quatre dernières, l'escalade met souvent la vie en péril. Parvenu à cette hauteur, les yeux sont éblouis de la magnificence du tableau qui s'offre aux regards, digne chef-d'œuvre du Créateur. Dans ces régions élevées tout se tait; plus de bruissements d'insectes, de chants d'oiseaux, de coassements de grenouilles. La nuit,

dans ces lieux sauvages, a quelque chose de solennel et d'effrayant. Au loin, le terrible jaguar fait entendre ses rugissements, tandis que le vent qui souffle sur les aiguilles ou qui s'engouffre dans les anfractuosités de la montagne, tantôt entonne des airs d'une douceur infinie et tantôt produit des bruits comparables à ceux d'une mer en furie. Pendant le clair de lune, si ses rayons à demi voilés se dégagent des nuages, ils laissent voir dans toute leur majestueuse grandeur ces immenses peulvans et ces dolmens gigantesques, qui mériteraient d'être admirés de tous les peuples de la terre. »

Et ailleurs (23 décembre 1868) : «Depuis Vellozo et mon bon prédécesseur Louis Riedel, durant une période de quatre-vingts ans, une foule de botanistes distingués ont tour à tour exploré le territoire de Saint-Sébastien; mais tous se sont contentés du produit de ses limites extérieures qu'aucun d'eux n'a osé franchir. Si un seul de ces savants avait pénétré jusqu'aux escarpements de l'intérieur du pays, il m'aurait peut-être privé du bonheur de servir la science. Pour y parvenir, figurez-vous un homme qui, sans autre avantage que le plaisir d'herboriser, se lance seul à travers la forêt vierge, butinant depuis l'aube jusqu'au soir. La nuit venue, forcé de s'arrêter, il allume du feu, si le temps le permet, contemple son fardeau, et, après avoir pris un modeste repas, couché sur la terre ou sur la roche, en attendant qu'il puisse de nouveau saluer l'aurore et continuer sa marche, il confie son léger sommeil à la garde du ciel.»

C'est au moyen de ces courses multipliées dans la province de Rio-Janeiro que M. Glaziou a pu recueillir une foule de belles espèces de fougères, en partie nouvelles, merveilleusement préparées et souvent si rapidement transmises qu'un mois seul suffisait pour qu'elles nous parvinssent, récolte, dessiccation, envoi et arrivée compris. Les ressources qui nous ont été offertes par le collecteur sont telles que toutes les erreurs nous sont imputables, tant il a pris soin, avec une connaissance parfaite des plantes récoltées, de réunir toutes les formes capables de fournir à la diagnose des caractères solides. Ainsi, pour ne parler que des fougères en arbre, elles nous sont arrivées accompagnées de toutes les parties accessoires qui, d'ordinaire, manquent dans les herbiers.

De toutes les provinces du Brésil, celle qui est le mieux connue est sans

contredit Rio de Janeiro. C'est là qu'abordent les voyageurs naturalistes et le point de départ de leurs premières excursions. Bahia vient ensuite, puis Sainte-Catherine, où nous avons encore un correspondant zélé, M. H. Gauthier, vice-consul de la république de l'Uruguay à Desterro. Le Haut-Amazone n'a été que fort peu exploré, et les plantes que nous en possédons nous disposent à croire que la flore de cette région se rapproche de celle des Guyanes. Toutefois on doit reconnaître que la province de Rio résume à elle seule toute la végétation de l'empire.

Sans doute, on pourra découvrir encore dans quelques parties reculées du Brésil plusieurs espèces inédites de cryptogames vasculaires à joindre à celles décrites dans cet ouvrage, mais le nombre n'en saurait être considérable. On ne trouve nulle part ailleurs qu'à Rio des conditions aussi favorables au développement de ces plantes: terrain inégal, innombrables cours d'eau, rochers moussus, température s'éloignant toujours des extrêmes, montagnes boisées dont les versants s'abaissent dans toutes les directions, tout concourt à donner à la végétation une splendeur et une activité sans pareilles. Les plantes se touchent, se pressent, se servent d'appui mutuel, se donnent réciproquement de l'ombre, échangent la rosée qui les vivifie, et quand tout le terrain a été envahi, elles grimpent sur les troncs d'arbres, couvrent la nudité des rochers, et présentent au voyageur émerveillé tous les ports, toutes les formes, toutes les couleurs; parterre immense et toujours varié, auquel vient s'ajouter le charme d'un inimitable désordre et d'une complète indépendance.

Les lieux les plus riches en fougères, spécialement et soigneusement explorés par M. Glaziou, sont la Gavia et Tijuca, distantes l'une et l'autre d'environ 10-12 kilomètres de Rio; la Gavia, qui longe la mer au sud-ouest, avec ses montagnes qui dépendent du Corcovado et s'étendent jusqu'à la ville; Tijuca, un peu plus au nord, qui s'avance davantage dans les terres, avec un pic de 1,050 mètres pour plus grande altitude; Saint-Louis et Theresopolis, éloignés d'une trentaine de kilomètres de la capitale, et qui occupent les versants de la chaîne des Orgues, dont le point culminant s'élève à 2,115 mètres. Puis vient Petropolis, petite ville, le Versailles de l'empereur du Brésil, située à 1,800 mètres environ au-dessus du niveau de la mer; elle dépend de la chaîne des Orgues (Serra os Orgaos), et se

trouve dans la direction de la Serra d'Estrella. A ces localités dont les richesses botaniques ne sont acquises qu'au prix de fatigues et de dangers, s'ajoute encore la Serra do Couto, au nord-ouest de la baie, très-abrupte et de difficile escalade, distante de Rio de 35 à 36 kilomètres.

On voit par ce qui précède que le terrain sur lequel se sont étendues les recherches botaniques de M. Glaziou n'a guère moins de 30 à 40 kilomètres de rayon. Il a beaucoup demandé aux lieux déjà visités et il en a beaucoup obtenu.

Les fougères, de même que les familles à espèces nombreuses, comptent plus d'espèces décrites et déterminées par les auteurs que de types véritables. C'est là un grave inconvénient auquel il est bien difficile de remédier. Il y a souvent l'espèce suivant la nature et l'espèce suivant la botanique descriptive. Comme le genre, elle est une réunion d'individus qui ne sauraient être absolument pareils. Aucune des créations de la nature n'est le calque rigoureux d'aucune autre. Une foule de causes rendent cette parfaite similitude impossible. Pour ne parler que des plantes, ne sait-on pas que les graines semblables en apparence pour notre œil n'ont ni le même volume ni le même poids, et que l'embryon qu'elles renferment est différent de vigueur, recélant en lui, sous les enveloppes qui le retiennent captif, des qualités physiques qui lui rendront plus ou moins facile son évolution par la germination? Mises en terre, ces graines seront soumises à l'action d'agents modificateurs variables, qui favoriseront ou retarderont leur développement suivant les lieux où le hasard les aura portées. L'eau absorbée ne tiendra pas en dissolution les mêmes principes, la température différera, les variations atmosphériques se seront succédé autrement, de sorte que, sorties d'un même fruit, elles auront donné pour résultat des individus ayant chacun une physionomie spéciale et des aptitudes différentes.

Il n'en est pas autrement pour les animaux. Dans une famille, les frères ne se ressemblent pas tellement qu'il n'y en ait de plus petits et de plus grands, de plus faibles et de plus vigoureux, avec une intelligence qui n'est pas la même pour tous et des tendances souvent opposées.

Mais si l'espèce varie dans les individus qui la composent, si même il existe des races d'une durée pour nous indéterminée, ces changements ne

sont pas des métamorphoses et le type se conserve. Nous pouvons nous figurer l'espèce non comme une verge inflexible, mais comme le pendule qui décrit un segment de cercle pour revenir sur lui-même et s'en éloigner dans des termes qu'il ne saurait dépasser.

C'est dans l'appréciation de cet écart que réside l'une des plus grandes difficultés lorsqu'il s'agit de reconnaître une espèce et de la décrire. Quelque isolée qu'elle soit, il arrive dans certains cas qu'elle confine à une espèce voisine. Tous les organismes se lient les uns aux autres. Tout s'enchaîne, familles, genres, espèces, et c'est à le prouver que consiste le darwinisme.

Dans ce système l'espèce à titre permanent n'existerait pas, et ne serait qu'un passage vers d'autres formes. Ainsi la botanique descriptive donnerait l'histoire des formes actuelles et non de celles de l'avenir. Extinctions d'une part, modifications de l'autre, variétés devenant espèces, espèces devenant genres, tout serait mobile, tout serait transitoire.

Ces idées, présentées d'une manière aussi absolue, sont de nature à donner lieu à des controverses sans terme, vu la difficulté d'aller aux preuves, soit dans l'affirmation, soit dans la négation. Nous admettons les variations, mais dans des termes qui laissent immuables les caractères fondamentaux; l'homme lui-même, en opérant par la sélection, n'agit qu'à l'extérieur; quand il a créé un bœuf sans cornes, il lui a laissé la condition de ruminant; le chien est resté carnassier, le pigeon n'est devenu ni grimpeur, ni échassier; d'ailleurs, ce que fait l'art, la nature ne le fait pas d'une manière ostensible, et les moyens qu'elle emploierait sont des plus discutables, car si, d'une part, on peut admettre qu'elle s'écarte du type, on ne peut refuser qu'elle y ramène.

Mais, même en admettant que l'espèce fût mobile dans la suite des temps, il n'en faudrait pas moins agir comme si elle était permanente, car si elle ne l'est pas pour toute la durée des siècles, elle l'est du moins pour nous et pour une longue suite de générations. Un grand nombre de questions regardées encore aujourd'hui comme insolubles pourront être résolues. Nous sommes des précurseurs, agissant dans le présent, nous préparons l'avenir.

Les fougères du Brésil ont très-souvent le port des espèces européennes;

des 24 groupes qui réunissent les genres nombreux de la vaste famille de polypodiacées, il en existe 9 dont nous avons des congénères : lomariées, adiantées, leptogrammées, scolopendriées, chéilanthées, ptéridées, aspléniées, cyclodiées et aspidiées, représentées en général par très-peu d'espèces. En dehors de cette famille, l'Europe ne possède que deux ou trois hyménophyllacées à localités très-restreintes, une seule osmondacée, deux ophioglosses, et cinq à six *botrychium*, dont quelques-uns remontent très-haut vers le pôle nord. La plupart de ces fougères dissidentes semblent s'être égarées de leur centre de développement.

Ainsi, quoique l'Europe possède un certain nombre de fougères, elles y sont relativement aux espèces exotiques dans un véritable état d'infériorité sous le rapport de la variété des formes, des dimensions et des particularités organiques. Toutes sont herbacées, terrestres, à nervilles libres, sauf deux ou trois exceptions. Elles ne donnent jamais des témoignages de cette exubérance de vie, qui, sous les tropiques et l'équateur, les rend si fréquemment vivipares ou prolifères; les sécrétions résineuses qui dorent ou argentent la fronde des *ceropteris* ou des *trismeria* n'existent pas; il n'en est aucune qui grimpe sur les arbres pour en redescendre en guirlandes; elles sont gracieuses de port, mais ce n'est pas parmi elles qu'il faut chercher ces hauts stipes couronnés de frondes mobiles qui rivalisent avec les palmiers.

Les fougères brésiliennes dissidentes sont au nombre de 153 pour 637 polypodiacées. Les espèces arborescentes forment à elles seules la 11e partie du chiffre total; mais parmi elles il en est qui s'élèvent très-peu et qui arrêtent leur développement à quelques mètres seulement de terre. Pour rester dans la rigueur des termes, il faudrait les qualifier seulement de ligneuses.

Dans certaines régions de la terre, les familles dissidentes, hyménophyllacées, gleichéniacées, marattiacées, danæacées, etc., impriment à la flore ptéridoïque une physionomie toute spéciale. Il faut visiter les îles de la Sonde, Java, Sumatra, pour la voir dans toute sa singularité; mais le lieu de la terre où les formes sont le plus diversifiées et le plus étranges se trouve aux Philippines, où les polypodiacées égalent à peine le nombre des espèces dissidentes.

Certains genres très-vastes, et dont l'aire de développement est très-

étendue, renferment presque toujours des espèces dont la diagnose laisse des incertitudes, tant il est difficile de trouver des caractères différentiels saillants.

Spécifiquement distinctes pour un œil attentif, elles semblent défier les termes pour les décrire et la main du dessinateur pour les reproduire. Telles sont certaines espèces des genres *acrostichum, adiantum, pteris, asplenium, diplazium, polypodium, phegopteris, aspidium, alsophila, cyathea, trichomanes, hymenophyllum,* renfermant ensemble au moins 1,200 espèces, parmi lesquelles il en est qui sont chargées d'une très-lourde synonymie, indice certain que les botanistes ne s'accordent nullement sur la spécificité, hésitant même pour leur donner une place plutôt dans un genre que dans un autre.

Plusieurs auteurs, notamment M. Milde, l'un des hommes qui réunissent au plus haut degré la finesse des aperçus et la solidité du jugement, ont établi, pour une même plante, des races suivant les pays[1] : formes méridionales, boréales, européennes, australasiennes, asiatiques, etc. Ces rapprochements, avec indication des caractères qui les justifient, sont un moyen d'empêcher la multiplication des espèces, mais on doit en user avec réserve.

Lorsque deux formes en apparence issues d'un même type sont séparées l'une de l'autre par de très-grandes distances, il faut y regarder de très-près avant de conclure, car alors les différences observées empruntent une importance réelle de l'éloignement auquel se trouve l'habitat de chacune d'elles, car elles n'ont pas eu le même centre de développement. C'est alors qu'il faut étudier soigneusement la nervation, la nature du tissu, le rhizome et les écailles qui les recouvrent, le nombre des sporothèces sur un même segment fructifère, et même parfois les sporanges et les spores, lesquelles, quoique très-souvent pareilles, peuvent cependant donner des moyens précieux de confirmation dans les cas difficiles.

Plus les fougères sont nombreuses dans un pays, plus abondantes en espèces se trouvent aussi les lycopodiacées; elles en forment la 12e partie au Brésil, la 17e aux Antilles, la 18e au Mexique.

---

1. *Filices Europæ et Atlantidis, Asiæ minoris et Sibiriæ.* Lipsiæ, 1867.

Les circonstances atmosphériques et climatériques favorables au développement des fougères le sont également à celui des lycopodiacées; les unes et les autres se plaisent sur les rochers et les vieux troncs, ainsi que sur les terres humides, avec les mousses et les hyménophyllacées.

Quant aux hydroptérides, elles sont fort rares au Brésil, où peut-être elles n'ont pas été, en raison de leur habitat, l'objet de recherches suffisantes. Le genre *isoetes* n'y a point été trouvé, et c'est à peine si l'on peut y signaler quelques espèces d'équisétacées; encore y sont-elles fort rares.

Nous aurions bien voulu que le format de cet ouvrage fût en rapport de dimension avec la beauté des plantes auxquelles il est consacré. Les publications du genre de celui-ci, éditées par les auteurs, se ressentent toujours de l'exiguïté des ressources dont ils peuvent disposer. Toutefois certaines fougères ont des frondes qui atteignent des proportions telles que même les plus grands in-folio eussent été insuffisants pour les reproduire entières. Il a fallu souvent, après avoir donné un fragment de grandeur naturelle, se contenter d'une réduction au 6e ou au 10e, seul moyen de faire connaître l'ensemble de la plante avec le port et les dimensions.

Nous avons appliqué dans cet ouvrage, pour la nomenclature des espèces, les principes d'équité dont nous avons démontré l'importance, page XIII de notre introduction à l'*Histoire des fougères et des lycopodiacées des Antilles,* règle qui consiste à restituer aux auteurs qui les premiers ont décrit une plante, le nom donné par eux. Déjà cette réforme est adoptée par plusieurs botanistes, et l'on peut s'étonner qu'elle ne soit pas suivie d'une manière plus générale.

En terminant cet ouvrage, qui clôt une longue série de travaux entrepris sur les végétaux cryptogames vasculaires, nous pouvons dire de lui comme nous le dirions de ceux qui l'ont précédé, sans rien préjuger de leur valeur, que c'est un livre de *bonne foi,* et que c'est comme tel qu'il doit être accueilli.

A. F.

7 novembre 1869.

CRYPTOGAMES VASCULAIRES

DU BRÉSIL.

I. FOUGÈRES.

I. POLYPODIACÉES.

I. ACROSTICHÉES.

1. ACROSTICHUM, F., *Hist. des acrostich.*, p. 8 et 27, t. 1-24.

I. OLIGOLÉPIDÉES.

* *Frondes ovales-lancéolées ou lancéolées.*

1. LATIFOLIUM, Sw., *Fl. Ind. occid.*, III, 1589; F., *Hist. des foug. et des lycop. des Antilles*, p. 1. — Glaziou, Rio-Janeiro, n° 948. Serra do Couto, n° 3157, *sterilis* (1869). — Très-grande et très-belle espèce, pouvant atteindre ou même dépasser 75 centim. sur 8 centim. de largeur. La fronde est longuement atténuée en pointe à la base. C'est là l'*A. longifolium*, Sw., *Syn.*, p. 9, et notre *Aconiopteris longifolia*, F., *Hist. acrost.*, p. 80, t. 41.

2. MACROPODIUM, F., *l. c.*, p. 30, t. 6. — Forme brésilienne. Rio-Janeiro, Glaziou, n° 2151. — Très-belle et très-grande espèce, robuste et presque cartilagineuse; à frondes fertiles de moitié plus petites que les stériles.

3. ALISMÆFOLIUM, F., *l. c.*, p. 28, t. 28, fig. 3. — Serra os Orgaos, Vauthier, n° 665. — Grande espèce, à rhizome écailleux rampant; frondes fertiles

beaucoup plus étroites que les stériles; pétioles fort longs; elle est opaque, et les nervilles qui ouvrent avec le rachis un angle presque droit, atteignent la marge.

4. BREVIPES, Kze., *Ind. Fil. hort. Lips.*, 1845; F., *l. c.*, p. 29; Lowe, *Ferns*, VII, t. 55. — Brésil, *teste* Th. Moor., *in Indice.* — Frondes lancéolées, aiguës; quoique le pédicelle soit court, le nom spécifique exagère cette brièveté; la fronde fertile est plus longuement pédicellée et plus étroite de moitié; le rhizome est assez gros; elle atteint une vingtaine de centimètres de longueur sur 3 centim. de largeur; l'espèce précédente est du double plus grande. Nous ne l'avons pas vue provenant du Brésil.

5. CRASSINERVE, Kze., *l. c.*; F., *l. c.*, p. 29; *A. simplex*, Spr., *Syst.*, IV, p. 33. — Brésil, *teste* Kze., *l. c.*, et Raddi. — Espèce faiblement caractérisée. Nous ne la connaissons pas comme provenant du Brésil.

6. SCALPELLUM, Martius, *Icon. plantar. cryptog.*, p. 86; F., *l. c.*, p. 32, t. 10. — Martius, Minas-Geraes. — Espèce longuement pédicellée, figurée par nous d'après le spécimen 4079 de Gardner (Herb. Deless.). — Grande espèce, glabre, à frondes fertiles aussi longues, mais d'un tiers plus étroites que les stériles.

7. CONSOBRINUM, Kze., *Flor.*, 1839, 1 *biebl.*, 44; F., *l. c.*, p. 32. — *Herb. Brasil.*, Martii, n° 362; Glaziou, Rio-Janeiro, n° 947; Spruce, Rio-Negro, n°s 2245 et 2309, et Rio-Uapes, n° 2869. — Espèce assez mince; frondes elliptiques, acuminées aux deux extrémités; pétiole écailleux; écailles lancéolées, denticulées. Cette fougère est caractérisée, d'après nos spécimens, par une consistance presque papyracée; le rhizome est dressé, tandis qu'il est rampant dans l'espèce suivante.

8. LINGUA, Radd., *Fil. Brasil.*, p. 5, t. 15, f. 4; F., *l. c.*, p. 33. — Martius, Minas-Geraes; Serra os Orgaos, Gardner; Vauthier à Sabara, n° 621; Glaziou, Rio-Janeiro, n° 2150. — Frondes stériles tendant à la forme elliptique; le tissu est épais et opaque; rhizome rampant, assez délié, à radicules portant de longs poils étalés. Les frondes stériles obtuses, à lames étroitement oblongues et longuement pédicellées, n'ont aucun rapport de forme avec les stériles. Les auteurs rapportent les n°s 2245, 2309 et 2869 de Spruce à l'*A. Lingua*, Raddi; nous nous croyons plus près de la vérité en les attribuant à l'*A. consobrinum*, Kze.

† 9. OVALIFOLIUM, F.

Frondibus sterilibus ovatis, membranaceis, debilibus, basi acuminatis, apice subobtusis, mesonevro laminæ inferioris et petiolo gracili basi curvato, nigrescente, stramineis, squamas fuscas ferentibus; nervillis tenuibus, sæpe ad marginem dilatatis, nervillam marginalem, modo aconiopteridis, constituentibus; frondibus sterilibus lanceolatis, obtusiusculis, minoribus, petiolo longiori; sporangiis tabacinis ovatis, sessilibus, annulo 14 articulato; sporis ovatis, episporiatis.

Habitat in Brasilia fluminensi (*Serra do Couto*); Glaziou (1869).

Filix petiolis gracilibus, squamosis, planiusculis; rhizomate fibrillis capilliformibus onusto.

ICON. : *Tab. IV, fig. 1.*

(Longueur des frondes fertiles, 22-24 centim., dont le pétiole fait environ la moitié, sur 5 centim. de largeur au centre; frondes fertiles, 30 centim.; la lame mesure 4 centim. sur 16-18 millim. de largeur.)

Le caractère qui distingue cette espèce, consiste, indépendamment de la forme, dans cette particularité d'avoir une nervure marginale qui ne diffère de celle qui caractérise les *Aconiopteris*, genre du reste médiocrement solide, que parce qu'elle s'interrompt et qu'elle semble accidentelle. Les frondes sont attachées assez près les unes des autres sur un rhizome de la grosseur d'une petite plume d'oie.

†10. HYMENODIASTRUM, F.

Frondibus ovoideo-lanceolatis, crassis, obtusiusculis, rigidulis, glabris, basi acuminatis, membranula pellucida, angusta marginatis; mesonevro stipitibusque validis, supra canaliculatis; in fertilibus petiolo sulcato, multo longiori, laminis angustioribus; nervillis tenuibus, horizontalibus, sæpe, præcipue prope marginem, conniventibus; sporangiis tabacinis, crassis; annulo spisso, 12-14 articulato, sacculo pertuso; sporis ellipticis, episporiatis; episporio, sub lente, aspectu denticulato; surculo crasso, radiculis pilosis, pilis verticillatis, longis et flavis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2152).

Filix robusta, siccitate lutescens; frondibus membranula angusta, pellucida cinctis; nervillis passim conniventibus.

ICON. : *Tab. V.*

(Longueur des frondes stériles : 45-50 centim. sur 7 centim. de largeur, prise au centre; pétiole 18-20 centim., celui des frondes fertiles atteint jusqu'à 36 centim. et la lame mesure 18-20 centim. sur 3 centim. de largeur.)

Le nom spécifique que nous donnons à cette belle espèce exprime que la nervation se présente parfois anastomosée. Ce caractère devrait la faire placer parmi les *Hymenodium*, mais ici l'union des nervilles n'a lieu que par connivence et ne forme pas un réseau continu comme dans l'*Hymenodium crinitum*. Il suit de cette considération que l'*H. Kunzeanum* (*Hist. des acrostichées*, p. 90, t. 58) serait un *Acrostichum hymenodiastrum*, c'est-à-dire ne présentant pas une nervation véritablement réticulée, mais seulement confluente; cependant chez la plante péruvienne le fait est bien plus généralisé que chez l'espèce brésilienne.

L'*A. hymenodiastrum* est robuste, très-glabre, remarquable par une membranule qui margine les frondes. Les pétioles, qui atteignent la grosseur d'une plume d'oie à la base, sont un peu courbes, noirâtres et garnis d'écailles fauves, lancéolées; les radicelles portent des poils dorés assez longs, qui ont une certaine élégance et prennent une apparence plumeuse. Le pétiole des frondes fertiles est très-long. Le sacculus, vu au microscope, présente à sa surface et d'une manière irrégulière, de petits pores arrondis qui laissent passer la lumière, particularité que nous n'avons constatée nulle part ailleurs.

†11. PAPYRACEUM, F.

Frondibus lanceolatis, apice caudatis, cauda tenui, basi cuneatis, laminis leviter curvatis, glaberrimis, papyraceis, translucidis; petiolo tenui, canaliculato; nervillis tenuibus, marginem attingentibus; mesonevro superne anguste canaliculato; fronde fertili multo minori, lamina angusta, fuscescente; sporotheciis rotundis, annulo lato, 10-12 articulato, articulis remotis, latis; sporis ovoideis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2434).

Filix tenuis; textura papyracea, basi et apice attenuata; surculo erecto, squamoso, squamis fulvis, lanceolatis notata.

ICON. : *Tab. III, fig. 1.*

(Longueur: 50 centim. sur 4-5 de largeur avec un pétiole de 6-7 centim. La fronde fertile est beaucoup plus petite et plus longuement pétiolée; elle est recourbée dans notre spécimen. Ses marges sont repliées sur le mésonèvre, circonstance qui ne permet pas toujours d'en apprécier nettement la forme.)

Cette espèce est, de tout le genre, celle qui est la plus mince et qui justifie le mieux l'épithète de *papyracea*, que nous lui donnons. A l'état de dessiccation elle est d'une légèreté comparable à celle des *Hymenophyllum;* les nervilles, très-déliées, s'épaississent en se rendant à la marge; elles y deviennent translucides et se

divisent en deux branches divergentes ; cette marge est terminée par une membranule blanchâtre, comme il arrive dans plusieurs autres espèces. L'un de nos spécimens dépasse 80 centim. de longueur sur 9 de largeur.

† 12. AMPLISSIMUM, F.

Frondibus lanceolatis, membranaceis, pellucidis, subpapyraceis, apice acutis, basi late cordatis, margine, mesonevro stipiteque squamosis; squamis lanceolatis, integris, rubescentibus; surculo crasso, subrotundo, squamoso; mesonevro angusto, superne canaliculato; nervillis tenuibus, marginem leviter incrassatum attingentibus.

Habitat in Brasilia, Serra do Ariro (Glaziou, n° 2436, 1868).

Filix gigantea, flexibilis, pellucida, squamosa; squamis parvulis, ad margines imbricatis, patulis et ad mesonevron majoribus.

ICON. : *Tab. VI.*

(Longueur : 1 mètre et plus sur 9-10 centim. de largeur au centre, le pétiole mesure 22-24 centim.)

Nous n'avons cette espèce, sans contredit l'une des plus belles du genre, qu'à l'état stérile ; elle est gigantesque, écailleuse dans toutes ses parties et à squames entières. Le pétiole et le mésonèvre ont une couleur roussâtre très-prononcée ; les lames sont nues, sauf les marges bordées de petites écailles imbriquées et les mésonèvres chargés d'écailles plus grandes, étalées ; les pétioles prennent, de leur présence, un aspect hérissé.

Cette espèce diffère de l'*A. Glaziovi* par la base largement cordiforme des frondes, par leur dimension et leur consistance ; elle se rapproche de l'*A. scolopendrifolium* par la base légèrement cordiforme des frondes ; elle s'en sépare par la consistance et la dimension ; du reste, dans ces trois espèces la squamescence et la radication sont exactement pareilles, et il y aurait à voir s'il n'existe pas, dans leur lieu natal, des formes qui les unissent. Les *A. Glaziovi* et *scolopendrifolium* peuvent garder la station verticale, tandis que l'*A. amplissimum* suspend ses frondes aux arbres et aux rochers moussus. Quoique la taille ne puisse fournir un caractère spécifique, il en est autrement quand elle s'exagère et qu'elle donne lieu à un port différent.

13. LECHLERIANUM, Metten., *Filic. Lechl.*, p. 9. — Serra os Orgaos, Miers, n° 11 ; San-Gabriel, Spruce, n° 2187. (N. V.)

14. MINUTUM, Pohl, *Herb. Vindob.*; F., *Hist. acrost.*, p. 39, t. 10, f. 3. — Goyaz, par Pohl. — Raide, coriace, rhizome rampant, écailleux.

(Longueur, 9-11 centim. sur 10-11 millim. de largeur.)

15. ACROCARPON, Martius, *Icon. cryptog.*, p. 85, t. 23; F., *l. c.*, p. 39. — Martius, Minas-Geraes. — Cette espèce est nettement caractérisée par des frondes fertiles, beaucoup plus longues que les stériles; à lames plus courtes et plus étroites; la souche est dressée; nous ne la connaissons que par la planche citée, excellente d'ailleurs.

16. FIMBRIATUM, Cavan., *Ann. hist. nat.*, I, p. 1028. — Claussen, Brésil, sans autre désignation. (H. F.) — Spécimen incomplet; pétioles très-grêles, flexueux, naissant d'une grosse souche, chargée de radicelles noirâtres; les lames sont oblongues, arrondies à la base et à marge frangée. — On peut la regarder comme incomplétement connue.

17. SELLOWIANUM, Presl., *Tent. pterid.*, p. 234, *sub Olfersia.* Brésil, sans désignation précise. Non figurée et peu connue. (N. V.)

18. APODUM, Klfss., *Enum. filic.*, p. 59; *Olfersia,* Presl., *l. c.*, p. 233; Hook. et Gr., *Icon. fil.*, n° 99. — Brésil, Spruce, n°s 9*, 16 et par le même à San-Gabriel, n°s 2186 et 4639. — Grande espèce, sessile, à pétiole ailé; marges ciliées, frondes longuement acuminées, les fertiles beaucoup plus petites; celles-ci mesurant 25 centim. et les stériles 52 centim.

19. SCOLOPENDRIFOLIUM, Radd., *Filic. Bras.*, p. 4, t. 16. — Serra os Orgaos, Miers, n° 16; Glaziou, Rio-Janeiro, n° 950. — Très-belle espèce, courtement stipitée, chargée, assez abondamment, d'écailles brunâtres, particulièrement sur le mésonèvre; les lames sont ciliées; le stipe et le mésonèvre ont une teinte rosâtre très-prononcée. Notre spécimen mesure 42 centim. de longueur sur 5 à 5.5 de largeur; le pétiole atteint 8 centim. Le rhizome est globuleux. Il prend, après dessiccation, une teinte roussâtre très-prononcée.

† 20. GLAZIOVI, F.

Frondibus sterilibus lanceolatis, apice breve cuspidatis, basi rotundatis, marginibus mesonevroque rufidulis, squamosis; petiolis hirtis, flexuosis; fertilibus ellipticis utrinque acutis, basi attenuatis, nudis, petiolo multo longiori; rhizomate crasso; sporangiis rufis, ovoideis; annulo 12-14 articulato, articulis crassis; sporis ovoideis, episporiatis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2059, Tijuca).

Filix formosa, squamis ciliata; mesonevro rubescente; frondulis fertilibus longissime petiolatis.

ICON. : *Tab. I, fig. 1.*

(Longueur de la fronde stérile, 45 centim.; de la lame seule, 25-30 centim. sur 5.5 centim. dans sa plus grande largeur ; la fronde fertile, un peu moins grande, n'atteint que 10-11 centim. de hauteur sur 3.5 de largeur.)

Cette espèce est très-belle et remarquable par la grande dissimilitude des frondes fertiles et des frondes stériles ; celles-ci très-écailleuses et les autres parfaitement nues. Les frondes stériles ne sont pas cordées à la base comme dans l'*A. scolopendrifolium*, Radd. ; le mésonèvre est large, roussâtre, chargé d'écailles de même couleur, presque piliformes sur le pétiole, qui prend un aspect hérissé ; la fronde fertile est absolument nue et la lame à peu près elliptique ; elle se termine en pointe et est légèrement décurrente par le bas. La consistance de la plante est cartilagineuse ; elle est opaque. Les écailles qui marginent les frondes stériles sont imbriquées.

†21. MOLLISSIMUM, F.

Frondibus dissimilaribus, sterilibus utrinque attenuatis, lineari-lanceolatis, punctato-pellucidis, mollibus, margine sinuatis; mesonevro angusto; nervillis marginem non attingentibus, tenuibus, fere omnibus simplicibus, aliquando apice glandulosis; petiolis gracilibus et surculo repente squamosis; squamis auratis, piliformibus, basi tantum dilatatis; fertilibus multo minoribus; petiolo capilliformi, lamina lanceolata, pilos rigidos atros sparsim ferente; margine tenui, pellucido, eleganter crenato; nervillis atris; sporangiis crassis; annulo spississimo; articulis 12, dissepimentis ægre perspicuis; sporis ovoideis.

Habitat in Brasilia fluminensi ad rupes (Glaziou, nos 949 et 2432).

ICON. : *Tab. II, fig. 3.*

(Longueur des frondes, 22-25 centim. sur 2 de largeur. Le pétiole fait à peu près les 2/5 de la longueur totale.)

L'*A. mollissimum* a des rapports évidents avec l'*A. Plumieri*, F., *Hist. acrost.*, p. 50; le port est presque semblable, mais la plante brésilienne a des frondes plus molles, moins ondulées, avec des nervilles plus déliées et plus rapprochées ; elle est pourvue, en outre, d'un rhizome qui manque dans l'*A. Plumieri*, pourvu seulement d'une souche ; enfin les lames sont ici sensiblement acuminées et bien moins écailleuses. Cette plante vit suspendue aux arbres, sa consistance molle ne lui permettant pas la station verticale, tandis qu'elle est facile pour l'*A. Plumieri*, qui n'est que souple.

22. PLUMIERI, F., *l. c.*, p. 50; Plumier, *Filic.*, p. 110, t. 127. — Serra os Orgaos, Miers, no 13. — Frondes molles, sans consistance, villeuses, pellu-

cides, linéaires-lancéolées; nervilles n'atteignant pas la marge, écartées et renflées au sommet; les fertiles plus petites; les unes et les autres hérissées d'écailles roussâtres. Les frondes stériles ne dépassent pas 25-27 centim.; les fertiles sont plus petites de moitié.

† 23. SPISSUM, F.

Fronde sterili ovata, spissa, opaca, margine integerrimo; mesonevro valido, superne canaliculato; petiolo helveolo cylindrico; fronde fertili lanceolata, petiolo longiori; rhizomate repente, squamoso, squamis ovoideis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, nos 2431 et 2799, Serra os Orgaos).

Filix crassa, glabra, margine integro; petiolo articulato, basi nigricante.

ICON.: *Tab. II, fig. 2.*

(Longueur de la fronde stérile : 20-25 centim. sur 4.5 de largeur; le pétiole mesure 12 centim. La fronde fertile, de même longueur, a un pétiole de 10 centim. et une lame de 1 centim. à 1.5.)

Cette espèce est caractérisée par une lame stérile très-épaisse, très-raide, très-opaque, glabre, portée, ainsi que la lame fertile, sur des pétioles qui se désarticulent et laissent sur le rhizome une partie de leur base, qui est noirâtre. L'articulation est indiquée par un petit renflement noduleux.

24. ERINACEUM, F., *Hist. acrost.*, p. 41, *exclus. synon.*, *A. hybridum;* Hook. et Gr., *Icon.*, n° 21, non Bory. Brésil, Gaudichaud; commune à la Guadeloupe. — Toutes les parties de la plante sont couvertes d'écailles brunâtres, raides et étalées; elles donnent aux marges une apparence ciliée.

** *Frondes linéaires ou tendant à cette forme.*

25. MARTINICENSE, Desv., *Herb. Par.;* F., *Hist. acrost.*, p. 45, t. 16, f. 3.; *Elaphoglossum glabellum;* J. Sm. in *Lond. Journal*, I, 197. — Rio-Negro, Spruce, n° 1426, et par le même à Santa-Martha, n° 2308. (N'a pas encore été figurée.)

26. LEPTOPHYLLUM, F., *Hist. acrost.*, p. 45, t. 17, f. 1. — Blanchet, Serra Jacobina, n° 548 (Herb. Weeb.). — Les frondes fertiles et les frondes stériles sont linéaires-lancéolées, de même forme, obtuses au sommet et acuminées à la base des lames; les pétioles sont très-longs et assez raides; le rhizome est rampant.

27. DURUM, Kze., *Linn.*, XXII, p. 575, *A. pachyphyllum*, Mart., Herb., *Teste* Kze. — Regnell, Caldas et Minas-Geraes. — Fronde épaisse coriace, très-raide;

la stérile très-courtement stipitée, linéaire-lancéolée, obtuse, longuement atténuée au sommet; la fertile plus longuement stipitée, lancéolée, aiguë, à marge réfléchie; rhizome rampant.

28. PACHYDERMUM, F., *l. c.*, p. 47. — Minas-Geraes (Herb. A. Richard). — Plante dure, épaisse, coriace, opaque, raide, à marge convolutée et à base décurrente. Les deux lames sont couvertes d'écailles piliformes, éparses, noirâtres et étoilées. Elle a 34-36 centim. de longueur et le pétiole fait le tiers environ de cette dimension. M. Klotzsch, Linn., XX, p. 428, rattache à cette espèce notre *Hymenodium Kunzeanum, Hist. acrost.*, p. 90, t. 58; mais ici les nervilles sont libres.

29. LINEARE, F., *l. c.*, p. 47, t. 15, f. 2. — Gardner, n° 98, Herb. Moricand. — — Petite espèce à rhizome rampant très-écailleux; les lames stériles, obtuses au sommet, sont atténuées à la base; elles sont linéaires et plus longues que les stériles, dont la lame, assez courte, est lancéolée.

30. RUBIGINOSUM, F., *l. c.*, p. 47, t. 5, f. 1, *A. Schiedei*, Kze., *Analect. pterid.*, p. 10. Rio-Janeiro, Gardner, n° 5928; Vauthier, n°s 662 et 664. — Cette espèce porte sur les rhizomes des écailles fort dures, imbriquées, luisantes et très-noires (*ustulatæ*), fort différentes de celles qui se trouvent sur les pétioles.

31. VISCOSUM, Sw., *Fl. Ind. occid.*, III, p. 1588; F., *l. c.*, p. 45; Hook. et Gr., *Icon.*, n° 61; Plum., *Filic.*, t. 129 (*rudis*). — Brésil, Gardner, n° 99; Claussen, n° 96; Regnell, II, p. 336. Rio-Negro, Spruce, n° 2187, et Brésil austr., à San-Gabriel, n° 2308. — Cette plante n'est pas visqueuse, ainsi que son nom spécifique semble l'indiquer.

32. PRÆLONGUM, F.

Frondibus lanceolatis, glabris, apice acuminatis, basi acutis, membranaceis, nervillis apice turgidis; petiolis rubiginosis, longis, tenuibus, canaliculatis; sterilibus subpapyraceis, lanceolatis; fertilibus linearibus, petiolo longiori; sporangiis crassiusculis, annulo lato 12 articulato, articulis remotis; sporis ovoideis, episporiatis, nigris, rotundatis, episporio crasso vestitis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n°s 952, 2433 et 2800, hauts sommets de la Serra os Orgaos, et 2855 *sterilis*).

Filix elongata, nuda, membranacea; rhizomate repente, squamis rigidis, lanceolatis, succineo colore obsitis.

Icon. : *Tab. III, fig. 2.*

(Longueur prise sur le spécimen n° 952 : frondes stériles, 55 centim. sur 3 centim. de largeur, frondes fertiles, 85 centim., dont le pétiole fait la moitié ; largeur, 12 millim.)

Cette espèce se rapproche de l'*A. rubiginosum*, mais les frondes sont nues et les fertiles linéaires ont une longueur considérable. Les pétioles, qui sont très-grêles, nous paraissent légèrement visqueux. Sur les lames du n° 952 se trouvaient en abondance des anguillules parfaitement conformés, mesurant environ 1 millimètre.

II. POLYLÉPIDÉES.

† 33. chrysolepis, F.

Frondibus linearibus aut lanceolato-linearibus, utrinque attenuatis, petiolo satis parvo; laminis translucidis, flexibilibus, squamis, pilos stellatos simulantibus, tectis; in mesonevro fulvis, super petiolos aureis, fimbriatis; fertilibus anguste linearibus, petiolo longiori; surculo crasso repente, squamoso.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2435).

Filix elegans, flexibilis, squamis forma varia abunde vestitis.

Icon. : *Tab. II, fig. 1.*

(Longueur : 42-45 centim., 2-2.5 centim. de largeur, le pétiole mesure 6-7 centim.)

Cette plante ouvre la section des polylépidées, remarquables par l'abondance des écailles qui les envahissent, écailles très-souvent différentes sur les diverses parties qu'elles recouvrent. Ici, par exemple, celles du pétiole et du mésonèvre sont lancéolées, avec des marges très-déchiquetées ; étalées sur le pétiole, auquel elles donnent un aspect hérissé, et couchées, au contraire, sur le mésonèvre ; les unes et les autres de couleur dorée un peu brunâtre ; tandis que les lames portent des écailles jaunâtres, divisées au point de paraître piliformes, et prenant l'apparence de poils bifurqués ou trifurqués sur la lame des frondes fertiles. Nous pouvons faire remarquer que les espèces à frondes linéaires changent bien moins leurs dimensions que les espèces à frondes lancéolées, lesquelles sont, en outre, beaucoup plus polymorphes.

34. Lindenii, Bory ; F., *l. c.*, p. 48, t. 18, f. 3. — Brésil, Gardner, n° 5925. — Pétiole grêle, flexueux, couleur de paille, chargé, ainsi que les lames, d'écailles roussâtres, très-caduques. La fronde est ovale, mince, transparente, avec des nervilles assez grosses, ponctiformes au sommet. La souche est couverte de fibrilles qui la cachent à l'œil.

35. BRACHYNEVRON, F., *l. c.*, p. 49, t. 22, f. 1. — Gardner, Minas-Geraes, n° 5928 (Herb. Weeb.). — Grande espèce, voisine de l'*A. rubiginosum* par la forme et le port. Les frondes sont presque sessiles.

36. STRICTUM, Radd., *Fil. Bras.*, p. 3, t. 15, f. 3; Martius, *Fl. Bras.*, p. 84, t. 22. Mandiocca, Martius. — Espèce à frondes longuement lancéolées, presque sessiles, fasciculées sur le rhizome et atténuées à la base. Les stériles et les fertiles d'égale dimension. (N. V.)

37. ACTINOTRICHUM, Mart., *Fl. Bras.*, p. 86; F., *Hist. acrost.*, p. 62. — Brésil, par Martius. — Cette espèce, qui demande à être mieux connue, n'a été décrite que sur un spécimen stérile. Elle rentre vraisemblablement dans quelques-unes des espèces connues.

38. PLUMOSUM, F., *l. c.*, p. 54, t. 20, f. 1. — Brésil sept., San-Gabriel, Spruce, n° 2397, Schomburgh, n° 446. — Rio-Negro, par le même, n°s 1770 et 2185. — Belle et curieuse espèce, couverte de squames minces, fortement ciliées, lâchement appliquées sur les lames et étalées sur les pétioles; elles sont fauves et donnent à la plante un aspect plumeux.

39. PERELEGANS, F., *l. c.*, p. 55, t. 23. — *A. paleaceum*, Pohl, *Herb. Vindob.* — Vauthier, à Sabera (1833). Goyaz, Pohl, 1844. — Frondes stériles allongées, lancéolées, aiguës, acuminées, squames épaisses, peu abondantes sur les deux lames, consistance membraneuse, papyracée. Les frondes stériles et fertiles mesurent de 40 à 50 centim.

40. GARDNERIANUM, Kze., *Herb.*; F., *l. c.*, p. 55, t. 15, f. 3; *Elaphoglossum intermedium*, Brack, *U. S. Expl. Exped.*, XVI, 69. Brésil, Gardner, n° 93. Rio-Janeiro, Glaziou, n° 2493 (stérile). Brackenridge, Serra os Orgaos. — Frondes stériles obtuses, épaisses, opaques, couvertes d'écailles roussâtres, portées sur une souche dressée, écailleuse, chargée à la base des pétioles provenant des végétations antérieures.

41. LANGSDORFFII, Hook. et Gr., *Icon. fil.*, t. 164; Mart., *Fil. Bras.*, t. 21. — Gardn., n°s 94 et 5929; Vauthier, 661; Miers, Serra os Orgaos, n° 15. Même localité, Glaziou, 1763 (*sterilis*). — Les figures de cette plante, données par Hooker et Grev., et plus tard par Martius, ne semblent pas reproduire la même plante. La fougère figurée par Martius, plus petite dans ses propor-

tions, est moins robuste; ses frondes, médiocrement écailleuses, ont des écailles plus petites et moins profondément frangées.

42. MERIDENSE, Klotz., *Linn.*, XX, p. 427; F., *Gen. filic.*, p. 43, t. 1, fig. 3 (fragm.); Para, Spruce, n° 16. — La souche est dressée; les frondes stériles sont oblongues-lancéolées, acuminées, un peu luisantes; les fertiles linéaires-lancéolées, aiguës, longuement pétiolées, plus courtes. Elle est de médiocre grandeur.

43. CUSPIDATUM, Willd., *Fil.*, p. 106; F., *l. c.*, p. 57, t. 14, f. 2. Sierra Carassa, Langsdorff. — Belle espèce, toute couverte d'écailles rousses, lancéolées, à marge ciliée. Elle prend, par la dessiccation, une teinte rougeâtre très-prononcée.

44. LEPIDOTUM, Willd., *Filic.*, p. 102, *A. tectum*, H. et B. in *Willd.*, *l. c.* Brésil, Vauthier, n° 663 et 664. Blanchet, n° 550, et Gardner, n° 5928. — Espèce très-écailleuse; lames obtuses au sommet, arrondies à la base; très-gros rhizome, chargé d'écailles raides et rougeâtres.

† 45. ACUMINANS, F.

Frondibus linearibus, curvatis, rufidulis, apice longissime acuminatis, basi attenuatis; mesonevro superne canaliculato, supra squamis rufis onusto, nervillis fere horizontalibus, circa mesonevron late furcatis; petiolo brevi, squamas lineares longe ciliatas ferente; fertilibus minoribus angustioribusque; sporangiis tabacinis, crassiusculis; annulo lato, 12 articulato; sporis ovoideis, episporiatis.

Habitat in Brasilia fluminensi, Serra d'Estrella (H. F.) (Glaziou, n°s 951, 2437, 2438, petite forme, et 2469, Alto-Macahe, Nouv.-Fribourg).

Affine cum A. laminarioide, *forma, et cum* A. erythrolepide, *squamescentia.*

Filix rigida, longe acuminata, petiolo brevi, squamoso.

ICON.: *Tab. I, fig. 2.*

(Longueur des frondes stériles, 32-36 centim. sur 2 centim. de largeur. La fronde fertile est de moitié plus étroite; le pétiole est à la fronde :: 1 : 6.)

Cet *acrostichum* est raide et remarquable par des frondes très-longuement acuminées et par un pétiole couvert d'écailles roussâtres, étalées et profondément découpées; les lames sont velues et les poils qui les recouvrent sont assez longs. La nervation consiste en un mésonèvre étroit où viennent se rendre des nervilles bifurquées vers la base, lesquelles s'étalent à angle droit; elles atteignent la marge.

Les frondes fertiles sont assez étroites et moins grandes que les stériles; le rhizome est couvert d'écailles roussâtres, lancéolées et ciliées.

**** *Piloselloïdes.*

46. PILOSELLOIDES, Presl., *Reliq. Haenk.*, p. 14, t. 11. — Olfersia, Presl., *Tent. pterid.*, p. 233. Brésil, Claussen, n° 317. — Espèce très-répandue dans les herbiers, assez mobile dans ses formes. Les lames fertiles sont planes et arrondies.

47. OVATUM, Jameson; F., *Hist. acrost.*, p. 54, t. 14, f. 7. Gardner, n° 5923. — Elle est rampante et comme rameuse. Les frondes fertiles et stériles diffèrent à peine; elles sont ovales, obtuses, avec un assez long pétiole; toute la plante est écailleuse.

48. HORRIDULUM, Klfss., *Enum. filic.*, p. 58; F., *Acrost.*, p. 52, t. 14, f. 1, *A. spathulinum*, Radd., *Fil. Bras.*, p. 3, t. 15, f. 2. Glaziou, Rio-Janeiro, n° 946. M. Th. Moore en fait une simple variété de l'*A. piloselloides*, Presl.; elle est plus grande. — Écailles assez longues, roussâtres, appliquées sur les lames et les bordant en manière de cils; les pétioles en sont chargés. Les frondes stériles, groupées sur une petite souche fibreuse, sont longuement lancéolées; les fertiles ont une forme elliptique et sont au pétiole :: 1 : 3 ou même à 4; elles mesurent de 9 à 12 millim. Les unes et les autres, très-différentes de forme, atteignent une même hauteur. C'est par erreur que M. Fournier (*Bulletin Soc. bot. de France*, t. XIV, p. 161) dit que cette espèce se distingue de toutes les autres par ses frondes stériles et fertiles de même forme.

APPENDIX.

49. ALPESTRE, Gardn., *in Field.* et *Gardn.*, *Sert. pl.*, t. 25. — Gardner, n° 5924. (N. V.)

NB. C'est à tort que, dans la distribution des espèces d'*acrostichum* (*Hist. acrost.*, p. 65), nous avons indiqué l'*A. vestitum*, Schlecht., comme une espèce brésilienne; elle n'a été, jusqu'ici, trouvée qu'au Mexique.

A la seule exception du *nevroplatyceros*, divisé en longs segments, et du *rhipidopteris*, dont la fronde fertile est flabelliforme, le groupe des acrostichées ne renferme aucune espèce pinnatifide.

2. LOMARIOPSIS, F., *Hist. des acrost.*, p. 10 et 66, t. 25-33.

1. PHLEBODES, Kze., *Syn. pl. Pœpp. in Linn.*, IX, p. 33, *sub acrosticho.* F., *l. c.*, p. 66. *Acrostichum Japurense*, Mart., *Flor. Bras.*, p. 86, t. 24. Brésil, Blanchet,

n° 2517; Gardn., n° 99; Schott, n° 3 (Herb. Vindob.). — Cette espèce est l'une des plus grandes du genre.

2. ERYTHRODES, Kze., *Herb. Bras.*, n° 366, *sub acrosticho; Lomariopsis,* F., *l. c.*, p. 67. Brésil, Salzmann, à Bahia; Martius, *H. Brasil.*, n° 366; Blanchet, n° 2517. Rio-Janeiro, Glaziou, n° 371. — Cette espèce n'a point encore été figurée; les frondes sont assez souples, acuminées, à nervilles en relief; elles portent des frondules sessiles sur un rachis mince et flexible. Les pétioles, les rachis et les mésonèvres prennent, par la dessiccation, une teinte rougeâtre très-prononcée, *inde nomen.*

3. ELONGATA, F., *l. c.*, p. 67. Luschnath, Bahia, n° 19; n'a point été figurée. — Frondes très-développées, à frondules très-longues, terminées en une pointe effilée; les spores sont pileuses et les nervilles en relief.

3. POLYBOTRYA, H. et Bonpl., *Nov. gener.*, I, p. 23.

1. OSMUNDACEA, H. B. Kth., *l. c.*, p. 23, t. 2; Willd., *Filic.*, p. 99. — Cette plante, trouvée d'abord dans la Nouvelle-Andalousie par Humboldt et Bonpland, est indiquée au Brésil par M. Hooker, *Spec. filic.*, V, p. 246, où elle aurait été récoltée par Moricand et distribuée par Gardner sous les n°s 91 et 92; MM. Hooker et Bauer en ont donné l'analyse dans la planche 88 de leur *Genera.*

2. CAUDATA, Kze., Linn., IX, p. 23; F., *Hist. acrost.*, p. 72, t. 34. San-Gabriel, Rio-Negro, n° 2116, Spruce. — Espèce remarquable par des frondes fertiles dont les frondules pédicellées ont une marge fortement ondulée, presque pinnatifide, avec une très-longue pointe obtusiuscule, presque entière.

3. PUBENS, Mart., *Icon. pl. crypt. Brasil.*, p. 87, t. 25. Serpa, par Martius. — Nous ne la connaissons que par l'excellente figure de cette plante, donnée par Martius. Elle paraît voisine du *P. caudata,* Kze.

4. ACUMINATA, Lk., *Filic. sp. filic.*, p. 148; F., *Hist. acrost.*, p. 73. — Brésil, Raddi (Herb. Hooker). — Vue seulement cultivée, provenant de Kunze; elle est robuste, opaque et presque cartilagineuse.

5. INCISA, Lk., *l. c.*, p. 148; F., *l. c.*, p. 73, t. 35. Brésil, Vauthier et Claussen. — Dans cette espèce, les frondes sont assez souvent mixtes. Les derniers segments stériles sont oblongs et fortement crénelés; les derniers segments fertiles, linéaires, tendent à la forme pinnatifide.

6. CYLINDRICA, Klfss., *Enum.*, p. 56; *P. speciosa*, Schott, *Gen. fil.*, 2; F., *Hist. acrost.*, p. 74, t. 36; Martius à Ilheos, n° 374; Rio-Janeiro, Schott et Glaziou, au Corcovado, n° 373 (stérile); par le même, fructifère, à Rio-Janeiro, n° 2429, et à Itajahy, n°s 955 et 1652, île Sainte-Catherine, par H. Gauthier. — Très-belle et très-grande espèce, à rachis stramineux, avec des écailles éparses. La souche est très-grosse et couverte d'écailles rougeâtres, linéaires et piliformes.

7. FRONDOSA, F.

Frondibus sterilibus quadripinnatis, oblongis, amplis; petiolo crasso, squamoso, rigido, lutescente; rachi trisulcato; frondulis primariis alternis, remotis, acutis, rachi depresso villosulo; frondulis secundariis breve petiolatis, oblongis, approximatis, apice pinnatifidis; frondulis tertiariis ovatis, obtusissimis; dentatis; frondibus fertilibus tripinnatis, rachi helveolo, squamoso; frondulis tertiariis pinnatis, petiolatis, lanceolatis, segmentis fructiferis turgidis, subpinnatis lobatisve; sporangiis ovoideis, magnis, laminam inferiorem reflexam et margines invadientibus; annulo, 20-24 articulato; sporis crassis, margine lato, nigrescente involutis, sæpe polyedricis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2428).

Filix magna, scandens, surculo crassissimo, squamoso, fasciculis vasorum in frondibus sterilibus, 9-12, circulatim dispositis.

(Longueur, 1 mètre; frondules primaires, 30 centim.; secondaires, 9 centim. sur 3 centim. d'envergure; la souche est de la grosseur du pouce.)

Cette espèce ressemble par ses frondes à certaines feuilles ombellifères du genre *Chærophyllum* et, comme elles, garde, après dessiccation, une teinte d'un vert très-foncé; les frondules de 2e ordre s'imbriquent par les bords de leurs frondules de 3e ordre, qui sont obtuses, très-rapprochées et dentées en leur pourtour; les écailles qui couvrent la souche sont lancéolées, très-longuement acuminées, à marge entière et brunâtres. La plante a un aspect feuillu qu'elle doit à ses derniers segments très-rapprochés et très-dilatés.

Faisons observer que si la diagnose des grandes fougères, plusieurs fois pinnées, à segments nombreux et très-divisés, est facile pour l'œil qui en saisit l'ensemble, elle est très-difficile dans les termes à employer pour en décrire les particularités. Le *facies* d'une plante résulte d'une foule de nuances que les mots ne sauraient toujours rendre d'une manière complétement satisfaisante.

† 8. SEMI-PINNATA, F.

Frondibus oblongis, bipinnatis, glaberrimis, crassiusculis, petiolo trisulcato, squamoso; frondulis primariis oblongis, acutis, semi-pinnatis, petiolatis, rachi tenui; frondulis secundariis oblongis, acutis, basi sursum gibbosis, dentatis; surculo crasso, squamoso, squamis angustis, acuminatis, rufis; fasciculis vasorum 8-9; frondibus fertilibus....

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2427).

Filix glaberrima, partitionibus dilatatis.

(Longueur, 1 mètre; frondules primaires, 32-35 centim.; secondaires, 10-11 sur 4 centim. de largeur.)

Quoique nous n'ayons sous les yeux que les frondes stériles, il nous semble que cette espèce est très-distincte de ses congénères. On la reconnaîtra à ses frondules de 1er ordre pinnées seulement dans leur moitié inférieure; les frondules de 2e ordre, libres, sont dentées ou crénelées en leur pourtour, avec un lobe gibbeux dans leur partie supérieure. La partie supérieure de la fronde est acuminée et pinnatifide. L'aspect général des frondules de 2e ordre rappelle certaines espèces du genre *Spiræa*.

4. RHIPIDOPTERIS, Schott, F., *Hist. des acrost.*, p. 14 et 78, et *Gener. filic.*, t. II.

1. PELTATA, Sw., *Syn. filic.*, p. 11. *Ejusd. Fl. Ind. occid.*, III, p. 1593, *sub acrosticho; Rhipidopteris;* F., *Hist. acrost.*, p. 78. Schkh. *Crypt. Gew.*, t. 12.— *Olfersia,* Presl., *Tent. pterid.*, p. 234. — L'*Ac. fœniculaceum,* Hook et Gr., *Icon.*, n° 119, est une variété à segments très-allongés et très-étroits. Les spécimens brésiliens que nous avons sous les yeux (Glaziou, Rio-Janeiro, n° 2441), ont des segments bifides, assez courts; tous sont stériles. Nous avons figuré cette plante *Mémoire sur les bases de la classification des fougères,* p. 14, t. 15.

5. OLFERSIA, Radd. *Op. scienz. di Bolonia,* VIII, 1819, p. 283, t. 11.

1. CERVINA, Kze., *Flor.*, 1824, I, p. 312. — *Polybotrya*, Klfss., *Enum. filic.*, p. 55. — Hook. et Gr., *Icon.*, 81. — Pohl à Goyaz, n° 3871; Martius, *Fl. Bras.*, n° 375. — Frondes fertiles bipinnées. C'est là l'espèce de la Guadeloupe et de la Martinique; la seule qui ait été trouvée dans les Antilles, contrairement à ce que nous avons dit ailleurs (*Foug. des Antill.*, p. 7).

2. CORCOVADENSIS, Radd., *Syn. filic. Bras.*, n° 28, et *Filic. Bras.*, p. 7, t. 14. — *Polybotrya,* Spreng. au Corcovado, Langsdorff; Glaziou, nos 450 et 452; Pohl

à Goyaz. — Frondes fertiles simplement pinnées; il existe entre cette espèce et la précédente des analogies si nombreuses qu'il est probable que cette forme n'est qu'une simple variété de l'espèce précédente, à frondes fertiles, simplement pinnées; elle est plus délicate, plus petite et plus rare. Nous avons reçu (1868) de M. Glaziou (n° 2426) un spécimen qui indique le passage de l'une à l'autre forme, ce qui semble décider la question.

6. SOROMANES, *Hist. des acrost.*, p. 16 et 82, t. 42.

INTEGRIFOLIUM, F., *l. c.* — Brésil (sans autre indication) (Herb. A. Braun). — Organisation des frondes fertiles, pareille à celle de l'*O. cervina*. Les frondes stériles ont des nervilles anastomosées.

Var. β *salicifolium*, Hook., *Sp. filic.*, V, p. 257. — Serra do Araripe, Gardner. (N. V.)

7. GYMNOPTERIS, Bern., *Emend.*, F., *Hist. des acrost.*, p. 18 et 83, t. 40, 44-46.

1. NICOTIANÆFOLIA, Sw., *Syn. filic. sub acrosticho; Gymnopteris*, Presl., *Tentam. pterid.*, p. 244. — Indiquée par Hooker (*Spec. filic.*, V, p. 275) comme se trouvant au Brésil; nous ne l'avons pas vue provenant de cette localité. La synonymie donnée (ouvr. cit.) se rapporte à deux plantes différentes et laisse douter que cette plante existe vraiment au Brésil.

2. SEMI-PINNATIFIDA, F., *Hist. des acrost.*, p. 83, t. 44.

Var. β *subsimplex*, F., *Hist. acrost.*, p. 83, t. 40? Spruce, San-Gabriel, Rio-Negro, n° 2121. — Si ce spécimen était dans son état normal, il reproduirait exactement la plante des Philippines distribuée par Cuming sous le n° 225; nous en faisons une variété pour consacrer cette analogie.

8. HETERONEVRON, F., *Hist. des acrost.*, p. 20 et 91, tab. 25, 39, 54-57.

? 1. MENISCIOIDES, F., *l. c.*, p. 93, t. 55 (frondule fructifère); — Blanchet, Bahia. — La fronde stérile nous est inconnue; il faudrait revoir cette plante complète pour décider de sa valeur spécifique.

2. SERRATIFOLIUM, F., *l. c.*, p. 94, t. 55, f. 4. — *Pœcilopteris fraxinifolia*, Presl. *Tentam. pter.*, p. 242. *Bolbitis*, Schott. *Acrostichum*, Mertens *in* Klfss. *Enum.*, p. 66, non Willd. — Martius, Pohl (Herb. Vindob.); Glaziou, Rio-Janeiro,

n° 1671. — Cette plante a été grossièrement figurée par Arrabida, *Flor. fluminensis.*

Var.: *Undulatum. Frondibus latioribus, marginibus undulatis, vix apice serratis.* — Martius, Rio-Janeiro (H. F. sans numéro); Glaziou, n° 953 et n° 2422, à Yacuacunga, 1868. — Cette variété est plus rarement prolifère que le type.

3. RADDIANUM, F., *l. c.*, p. 94. — *Acrostichum scandens*, Radd. *Fil. Bras.*, p. 6, t. 18. — Gaudichaud, Rio-Janeiro, et Glaziou au Corcovado, n°s 372 et 956; île Sainte-Catherine, H. Gauthier, à Desterro. — Plante grimpante ayant le *facies* des *lomariopsis* avec des nervilles anastomosées; la marge des frondules est simplement ondulée et non dentée; les rhizomes sont radicants.

9. ANETIUM, Splitgerb. F., *Hist. des acrost.*, p. 21 et 97.

1. CITRIFOLIUM, Splitg., *Nat.-Gesch.*, VII, p. 395. F., *l. c.*, *Antrophyum citrifolium*, F., *Hist. antroph.*, p. 51. *Hemionitis parasitica*, Linn., *Sp. pl.*, 1535. Plum., *Filic.*, t. 116. — Herb. Brésil, Martius, n° 369, § 1; Spruce, à San-Gabriel, Rio-Negro, n° 2368. — Cette plante est très-paradoxale. La nervation, les sporangiastres, les radicelles tomenteuses, les écailles cancellaires de la souche qui semblent caractériser les *antrophyum*, se retrouvent ici, avec des sporanges sporadiques et émergés. C'est là un des cas assez nombreux qui démontrent la faiblesse de nos moyens de classification.

M. Th. Moore, *Index*, p. 72, a établi sur une plante de Spruce, récoltée à Para (n° 52), un *Anetium Sprucii* (Herb. Hook.), qui ne paraît pas très-distinct de l'*A. citrifolium.*

10. CHRYSODIUM, F., *Hist. des acrost.*, p. 97 et p. 22, t. 59-63.

1. VULGARE, F., *l. c.*, p. 97. — *Acrostichum aureum*, L., *Sp. pl.*, 1525; Plum., *Filic.*, t. 104. — Bahia. Glaziou, Rio-Janeiro, n° 449. Ile Sainte-Catherine, H. Gauthier. — Plante très-robuste, cosmopolite, aquatique.

2. HIRSUTUM, F., *l. c.*, p. 99; Martius, *Herb. Brasil.*, n° 365; Pohl, var. β *marginatum*, Schkh., *Crypt. Gew.*, p. 185, t. 1, f. 3; *Acrostichum juglandifolium*, Klfss., *Enum.*, p. 66. — Nouv.-Fribourg, Claussen; Saint-Sébastien, Martius. — Ces deux espèces, étroitement liées, ne sont, comme quelques botanistes l'ont

décidé, que des variétés l'une de l'autre; ce genre renferme les espèces les plus robustes de toutes les fougères herbacées et en même temps les plus fécondes; la quantité de sporanges qui couvrent les frondules se compte par centaines de mille, et les spores par millions. Un spécimen complet de la Guadeloupe desséché pesait plus de 150 grammes. Les vaisseaux vasculaires sont ponctiformes et noirâtres. M. H. Gauthier, de Desterro, île Sainte-Catherine, Brésil méridional, nous écrit que le *Ch. vulgare* vit dans la vase, que les frondes, hautes souvent de plus de 2 mètres, et qui ne sont feuillées que vers leur moitié supérieure, naissent d'une souche énorme, lacuneuse, mollasse, noirâtre, passant au violet quand on l'écrase. Le pétiole est gros comme le doigt.

NB. Les Acrostichées sont des plantes herbacées, dressées, quelquefois grimpantes, arboricoles ou terrestres; le genre *Chrysodium* est exceptionnellement une plante paludéenne. Elles sont régulières dans leurs formes, sauf le genre *Nevroplatyceros,* qui n'appartient pas au Nouveau-Monde et qui a des frondes laciniées. Ces fougères ont des frondes souvent diplotaxiques, c'est-à-dire différentes de forme suivant qu'elles sont stériles ou fructifères; la quantité de spores que porte une seule lame est prodigieuse et se compte par centaines de mille. Beaucoup d'entre elles se chargent d'écailles de manière à en revêtir complétement l'épiderme. Les frondes simples ne se sont jamais présentées à nous à l'état vivipare; les genres seuls qui se sont montrés tels sont principalement les genres *Gymnopteris* et *Heteronevron.* Leurs dimensions parcourent une très-grande échelle, quelques centimètres, *Acrostichum piloselloides,* Presl., et 2 mètres, *Chrysodium vulgare,* F. Le *Lomariopsis sorbifolia*, F., est une des plantes les plus polymorphes que l'on connaisse. Ce groupe manque entièrement à l'Europe. Toute la terre tropicale et équatoriale, surtout dans les parties boisées, est riche en acrostichées. On peut en évaluer le nombre à 250 environ, sur lesquelles le Brésil en possède plus du quart (72 espèces réparties en 10 genres). Les Antilles, dont la surface est loin d'égaler l'étendue de ce grand empire, a 53 espèces et 10 genres, le Mexique seulement 8 genres et 38 espèces. L'étude de ces plantes est difficile; le genre *Acrostichum*, qui a tant d'uniformité dans la disposition des frondes, toujours simples, a plusieurs espèces paradoxales; il en est de même du *Polybotrya.* Le genre *Anetium* est un véritable *acrostichum* par ses sporanges superficiels et sporadiques, et un *antrophyum* par la nervation, les sporangiastres et la radication. Dans les Acrostichées, contrairement à ce qui arrive dans les autres groupes, les sporanges naissent sur toute l'étendue de la cuticule, sans suivre les nervilles, ou s'appliquer contre

elles. Ces organes reproducteurs sont sporadiques. Toutefois, ce caractère est moins marqué dans les *Nevroplatyceros*, où les sporanges sont parfois disposés en longues séries longitudinales qui s'accordent assez avec la direction des nervilles.

II. LOMARIÉES.

11. LOMARIA, Willd. *in Mag. d. Ges. naturf.*, F. z., Berl. 1809, p. 160.

* *Frondes pinnatifides.*

1. PLUMIERI, Desv., *in Berol. mag.*, V, p. 325; *L. Martinicensis*, Spreng., *Neu. Ent.*, III, 5. — Glaziou, Rio-Janeiro et Tijuca, n°s 1762 et 2060; île Sainte-Catherine, à Desterro, Alburquerque. — Espèce glaucescente par dessiccation; semble devoir grimper sur les troncs; le rhizome, intérieurement rougeâtre, a une consistance plus délicate que celle des spécimens de la Guadeloupe.

NB. Presl (*Epim. bot.*, p. 154) fait du *Lomaria Plumieri* le type d'un genre *Lomaridium*, caractérisé par l'absence d'indusium. L'observation est de toute justesse; mais ici le port est si bien celui des *Lomaria*, qu'on ne peut séparer cette fougère du genre auquel elle a été rattachée. L'indusium des *Lomaria* n'est, d'ailleurs, qu'un simple repli de la marge, lequel est tantôt scarieux et tantôt membraneux, conservant alors la consistance de la fronde d'où il provient.

2. PTEROPUS, Kze., *Die Farr.*, t. 46, *Acrostichum heterophyllum*, Radd., *Fil. Bras.*, p. 5, t. 17. — Glaziou, au Corcovado, n° 1226. — Très-distincte par les folioles inférieures, arrêtées brusquement dans leur développement et de forme semi-lunaire.

† 3. MUCRONATA, F.

Frondibus sterilibus oblongo-lanceolatis, cum segmentis horizontalibus oblongis, basi latioribus, approximatis, apice mucronatis, marginibus inæqualiter serrulatis, ultimis minoribus obtusis; nervillis dichotomis; petiolo depresso, rachi canaliculato; fertilibus lanceolatis, petiolo longiori; segmentis linearibus mucronatis, ultimis in petiolo desinentibus; sporangiis ovoideis, annulo 16-20 articulato; sporis ovoideis, episporiatis, episporio plicato.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2423).

Filix siccitate nigrescens, surculo erecto, fibras crassas emittente, squamis atris, parvulis, rigidis lanceolatis, ad apicem sedentibus.

ICON. : *Tab. VIII, fig. 3.*

(Longueur : frondes stériles, 50 centim.; le pétiole, 15 centim.; les segments du centre, 5-6 centimètres sur un peu moins de 2 de largeur; les sinus n'ont que quelques millimètres d'ouverture. Les frondes fertiles de même longueur sont chargées de segments linéaires, dressés, séparés par un intervalle de 7-9 millim.)

On reconnaîtra facilement cette espèce au mucron qui termine tous les segments, ainsi qu'à leur horizontalité dans les frondes stériles.

** *Frondes pinnées.*

4. BRASILIENSIS, Radd., *Fil. Bras.*, p. 50, t. 72 et 72². — *L. procera*, Spreng., *Syst. veg.*, IV, p. 65. — Glaziou, Rio-Janeiro, nos 368, 954 et 1642. — Belle et grande espèce, très-répandue. M. Hooker, *Sp. filic.*, III, p. 22, a donné de cette plante une synonymie fort embrouillée. Les frondules fertiles atteignent parfois jusqu'à 22-24 centim. de longueur; elles sont alors très-flexueuses. — Nous avons reçu (septembre 1868) un spécimen de cette plante sous le n° 2424, qui présente un phénomène extraordinaire, la dissociation des deux côtés de la fronde fertile, formée de deux parties isolées, celle de droite et celle de gauche. Cette séparation a eu lieu dès la base, car on ne trouve, du côté de la partie privée de frondules, aucune trace de séparation. Les pétioles, les rachis et les frondes des fougères sont symétriques, formées de deux groupes de vaisseaux unis entre eux par du tissu cellulaire. Cette union est démontrée par l'existence d'un canal longitudinal et central, véritable ligne médiane apparente sur les stipes et les divisions du rachis, ainsi que sur les mésonèvres. C'est par la séparation de ces faisceaux vasculaires qui s'écartent du parallélisme que l'on se rend compte des partitions auxquelles sont si fréquemment soumises les fougères. Dans le cas cité la ligne médiane s'est dissociée.

5. STRIATA, Sw., *Syn. filic.*, p. 304 et 422 *sub Onoclea*, Weddell, n° 863; Rio-Janeiro à Petropolis, Glaziou, n° 2425. — Très-belle et très-grande espèce, portant un petit corps glanduleux noirâtre à la base des frondules stériles, on les retrouve aussi dans le *L. Brasiliensis*, Radd., mais à la base des frondules fertiles.

6. REGNELLIANA, Kze., *Linn.*, XXII, p. 576. — Regnell, Brésil, Minas-Geraes; Martius, Rio das Contas; *teste* Kze., *l. c.* (N. V.)

7. IMPERIALIS, F. et Glaz.

Frondibus coriaceis, pinnatis, longe oblongis, abrupte caudatis; petiolo crasso, spinis brevibus, sparsis armato, basi squamis longis, angustissimis, aureis,

apice tortilis, circumdato; rachi rigido, cum squamis seu pilis pallidis gossypinis; frondulis sterilibus lanceolatis, sessilibus, approximatis, imbricatis, obtusiusculis, erectis, supra glabris, subtus pilis longissimis flexuosis, linearibus, succineo colore, perfacile solutis, abunde vestitis; marginibus integerrimis, leviter revolutis, nervillis tenuibus, apice turgidis, puncto turgido, versus marginem indicatis; frondulis fertilibus linearibus, supra glabris, apice dilatato-spatulatis; indusiis laceratis, scariosis; sporangiis magnis, cum pitis elongatis, vittatis immixtis; annulo 20-24 articulato; sporis rotundis, episporio vestitis, nigrescentibus, nudis lutescentibus.

Habitat in Brasilia, ad cacumina montium vulgo dictorum ab incolis Serra os Orgaos (Glaziou, n° 2801).

Filix formosa, squamosa; trunco cycadoideo; squamis secundum partes frondium diversis.

Icon. : *Tab. VII.*

(Longueur : 50 centim.; frondules, 8 centim. sur 1 de largeur. Nous comptons au delà de 30 paires de frondules.)

Cette espèce, la plus belle du genre, rappelle par son stipe celui des cycadées; les frondes elles-mêmes, avec leurs frondules dressées et coriaces, ont quelques rapports avec les feuilles de diverses espèces de cycas. Le pétiole est chargé à la base d'un beau coussinet d'écailles linéaires, luisantes et dressées, ayant au delà de 4 centim. de long; au-dessus de ce coussinet et sur le rachis se trouvent des écailles, de couleur et d'apparence cotonneuses; enfin, la lame inférieure des frondules est chargée d'un épais tomentum, roussâtre, formé d'écailles rubanées que l'on retrouve mêlées aux sporanges sur la fronde fertile; les nervilles sont si rapprochées qu'elles semblent se toucher; au point de leur terminaison, elles se renflent et donnent à la marge un aspect ponctué. Il nous a paru convenable de dédier cette curieuse espèce, trouvée sur le sommet le plus élevé des chaînes qui sillonnent le territoire de Rio-Janeiro, au prince qui gouverne constitutionnellement le Brésil, beau pays en voie de prospérité.

12. BLECHNUM, L. *Spec. pl.*, p. 1534 et auct.

* *Eublechnum.*

1. Lanceola, Sw., *Vet. Acad. Handl. Stockh.*, 1817, p. 71, t. 3, f. 2; *B. lanceolatum*, Radd., *Fil. Bras.*, p. 52, t. 60, f. 3. — Brésil, Gardner, n° 50; Weddell; Glaziou, n° 427. — Lorsqu'elle est accidentellement divisée, elle constitue

le *B. trifoliatum* de Presl., *Epim. bot.*, p. 104, aussi trouvé au Brésil. (Voy. plus loin *B. plantagineum*, Presl., *sub Mesothemate.*)

2. GRACILE, Klfss., *Enum.*, p. 158; Lowe, *Ferns*, IV, t. 36. — Glaziou, à Saint-Louis, n° 1760. — Très-bien caractérisée par la pinnule terminale, deux fois plus longue que les latérales et ondulée à la base; les frondules, assez écartées, sont peu nombreuses. Elle peut atteindre jusqu'à 45 centim.

3. UNILATERALE, Willd., *Berol. mag.*, IV, p. 79, t. 3, f. 1. *B. glandulosum*, Lk.; *B. polypodioides*, Radd., *Filic. Bras.*, t. 60, f. 2. — Gardner, Brésil, n° 49; Martius, n° 373; Claussen (H. F.). — Pourquoi ce nom spécifique? L'indusium, qui parfois semble n'occuper qu'un seul côté de la lame, ne présente ce caractère que très-accidentellement. — Plante grêle, à segments élargis à la base et gibbeux du côté supérieur. La forme générale est lancéolée et parfois presque linéaire.

4. ASPLENIOIDES, Sw., *Veter. Acad. Handl. Stockh.*, 1817, p. 72, t. 3, f. 3. *B. ceteracinum*, Radd., *Fil. Bras.*, p. 52, t. 60, f. 1. Claussen, Brésil (H.F.); Rio-Janeiro et Minas-Geraes, Gardn., n° 5304; Rio-Janeiro, Glaziou, n° 2454; elle est également indiquée à Goyaz. — C'est l'une des espèces les mieux caractérisées; elle se rapproche beaucoup du *B. angustifrons*, F., 7e *Mém.*, p. 25, t. 9, f. 2, du Mexique; mais nous croyons qu'elle en diffère spécifiquement. Dans le *B. asplenioides*, Sw., les segments inférieurs des frondes sont à peu près orbiculaires et prennent un aspect moniliforme; les deux indusiums sont très-rapprochés du mésonèvre; les écailles du rhizome, étroitement lancéolées, se terminent en une longue pointe. Dans le *B. angustifrons* les derniers segments conservent la forme des segments supérieurs; les deux indusiums sont très-distants et les écailles élargies du bas n'ont pas de pointe sétacée. C'est, du reste, le même type.

5. TRIANGULARE, Lk., *Sp. filic.*, p. 78; *B. triangulatum*, J. Sm., *Catal. Ferns*, 38. Lowe, *Filic.*, IV, t. 35. — Gardn., n° 19, et Martius, n° 373.

6. HETEROCARPON, F., *Gen. filic.*, p. 74. — Brésil par Claussen. — Cette espèce n'est pas établie sur des caractères suffisants. La diversité de forme des sporothèces est probablement accidentelle. Les frondes sont sessiles, avec des segments décroissants à la base; elles se terminent en pointe anguleuse et sont portées sur une petite souche dressée. Cette espèce est souple et transparente.

7. OCCIDENTALE, L., *Sp. pl.*, 1534 et auct. Martius, *Herb. Bras.*, n° 371; Blanchet, n°s 56 et 3296 (H. F.). Ile Sainte-Catherine, H. Gauthier. — Cette espèce est très-mobile dans ses formes et pourrait se prêter à l'établissement de nombreuses variétés; nous nous contenterons d'indiquer les deux suivantes :

β. *Caudatum*, Cavan., *Prælect.*, 1803. *Bl. cartilagineum*, Schkh., *Crypt. Gewæchse*, p. 101, t. 108 *b*; non Swartz; Gardner, n° 1903. Bahia, Lutschnath, n° 20 (H. F.).

γ. *Minor*, Th. Moor., *Ind.*, p. 201. *Bl. falciculatum*, Presl., *Epim. bot.*, p. 106. *Lomaria campylotis*, Kze., *Linn.*, XVII, p. 567. *Bl. acuminatum*, F., *Gen. filic.*, p. 75. *Bl. glandulosum*, var. *elongatum*, Kze., *Linn.*, XXIII, p. 306; Martius, *Herb. Bras.*, n° 373. Rio-Janeiro, Glaziou, n° 426.

8. HELVEOLUM, F., *Gen. fil.*, p. 73 et 75. — Brésil, Blanchet, n° 2243. — Frondules inférieures réfléchies; les supérieures arquées. Elle est fort distincte.

9. INTERMEDIUM, Link., *Hort. Berol.*, II, p. 71; Kze., *Die Farr.*, I, p. 128, t. 57, f. 2. — Brésil (*test.* Link et Th. Moor., *Nomencl.*, p. 198). V. C. — Espèce portant seulement deux ou trois paires de frondules, oblongues, obtuses, la terminale assez longue. Cette espèce est faiblement caractérisée.

? 10. INTEGERRIMUM, Spreng., *Syst.*, IV, 93. — Brésil. — Il faudrait revoir cette espèce recueillie par Sellow. La description donnée ne la fait pas nettement reconnaître pour un *Blechnum*. (N. V.)

11. LECHLERI, Metten., *Fil. Lechl.*, fascic. 2, n° 17. Brésil, sans autre désignation. (N. V.)

** *Mesothema* (sporothèces médians).

? 12. PLANTAGINEUM, Presl., *Epim.*, p. 111, *sub Mesothemate* (cultivée comme originaire du Brésil). — S'il est bien vrai que le sporothèce soit médian, elle devient une espèce distincte; autrement il faudrait la réunir au *B. Lanceola*, dont elle a le port. Il ne semble pas qu'elle ait été revue.

13. HASTATUM, Klfss., *Enum.*, p. 161. — *Lomaria hastata*, Kze., *Die Farr.*, p. 119, t. 55, f. 1. *Mesothema*, Presl., *Epim.*, p. 111. — Brésil. (N. V.) — Nous la possédons du Chili. Les frondes, qui sont sensiblement hastées, avec des auricules mucronées et des sporothèces interrompus, caractérisent nettement cette espèce.

† 14. DIPLOTAXICUM, F.

Frondibus semi-pinnatis, oblongis, glaberrimis, petiolis filiformibus helveolis; frondula terminali, longiori; sterilibus brevioribus, frondulis lanceolatis, acutis, inferioribus sessilibus, supremis coadunatis; fertilibus longioribus, frondulis angustioribus, basi contractis, terminali longissima, sporotheciis marginem non attingentibus; sporangiis ovoideis; annulo 14-16 articulato; sporis reniformibus, lævibus, aureis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2303).

Filix diplotaxica, id est frondibus sterilibus et fertilibus diversis, surculo erecto.

ICON. : *Tab. VIII, fig. 1.*

(Longueur des frondes stériles, 25-30 centim.; frondules de la base, 5 centim. sur 11-13 millim. de largeur; frondes fertiles, 43-45 centim.; largeur des frondules inférieures, 4 millim.; la terminale, 8-10 centim. de longueur; le pétiole atteint 30 centim.)

Le nom spécifique attribué à cette espèce exprime que les frondes fertiles et stériles diffèrent, sinon précisément de forme, du moins de dimensions, de manière à donner une taille plus élevée à celles qui portent les sporothèces. Les marges portent quelques poils courts; les rhizomes de très-longues radicelles.

*** *Blechnopsis.*

15. BRASILIENSE, Desv., *Berol. mag.*, V, p. 330, *B. fluminense*, Arrab. *Fl. flumin.*, XI, t. 106. Brésil, Martius, n° 372; Claussen, n° 2116; Gardner, n° 47; Blanchet, n°s 82 et 83; Serra os Orgaos; Glaziou, n°s 428 et 1679. Sainte-Catherine, etc. — Le n° 1679 de M. Glaziou est remarquable par des frondules très-étroites, formant des courbes de dedans en dehors (var. β *arcuatum*). M. Th. Moore admet une variété *B. Corcovadense* et il y rattache la figure donnée par Raddi (*Fil. Bras.*, p. 54, t. 61 et 61 [2]). C'est une espèce arborescente, bien connue et cultivée dans presque tous les jardins botaniques.

16. SERRULATUM, C. Rich., *Act. soc. hist. nat. Par.*, I, 114 (1792). — *B. angustatum*, Schrad., *B. angustifolium*, Willd., etc. — Martius, *Herb. Bras.*, n° 370; Blanchet, n°s 72 et 251; Claussen (H. F.), Gardn., n° 183. Para, Sainte-Catherine, H. Gauthier; Rio-Janeiro, Glaziou, Moyé, n° 1761. — Plante très-répandue, à synonymie très-chargée; elle est fort grande et fort belle; les frondes sont portées sur un rhizome rampant de la grosseur du petit doigt.

17. EXTENSUM, F., *Gen. filic.*, p. 72 et 73; Hook., *Sp. fil.*, III, p. 62; Claussen, Brésil. — Espèce très-longuement pétiolée, à pétiole grêle; à frondules courtes, très-obtuses, distantes, et chargées de deux très-larges sporothèces; la souche est dressée et très-fibrilleuse.

13. SALPICHLÆNA, J. Sm. *In Journ. bot. Hook.*, IV, p. 168.

1. VOLUBILIS, Klfss., *Enum.*, p. 159, *sub blechno. Salpichlæna,* J. Sm., *l. c. Salpichlæna scandens,* Presl., *Epimel. bot.*, p. 122. — Sellow, Blanchet, la Jacobine; Gardner, n°s 185 et 5306; île Sainte-Catherine, H. Gauthier, Rio-Janeiro, route de Juiz de Fora à Uba, Glaziou, n° 2302, etc. — Plante très-répandue; dans les spécimens brésiliens l'indusium du sporothèce et le sporothèce lui-même sont épais et très-bombés. Cette fougère prend de très-grandes dimensions; elle se projette sur les arbres qu'elle escalade.

NB. Les Lomariées sont des plantes herbacées, sauf deux exceptions, le *Blech. Brasiliense,* Desv., et le *Lomaria imperialis,* F., lequel porte ses frondes sur une sorte de tronc court. Une seule espèce a des frondes simples, *B. Lanceola;* chez tous les autres elles sont pinnatifides ou pinnées, dressées ou volubiles, ce qui est plus rare. Les espèces du genre *Blechnum* sont très-rapprochées les unes des autres et d'une détermination assez difficile en l'absence de caractères tranchés aussi peut-on regarder comme très-probable la réduction des espèces. Le genre *Lomaria* a, dans ses formes, des caractères mieux arrêtés. Les frondes sont vigoureuses, raides, diplotaxiques, souvent écailleuses. Le genre *Salpichlæna* est une sorte de petite liane qui se projette sur les buissons ou court sur les troncs. Le Brésil est plus riche en *Blechnum* que le Mexique et les Antilles, où le genre *Lomaria* est prédominant.

III. VITTARIÉES.

14. VITTARIA, Smith., *Mém. acad. de Turin,* V, p. 413, t. IX, f. 5.

* *Tæniopsis*, J. Sm., F., *Hist. des Vittariées*, 3e mém., p. 14.

1. GARDNERIANA, F., *l. c.*, p. 15, t. 3, f. 1; Gardner, n° 147, et Glaziou, n°s 1736 et 2802; Serra os Orgaos (var. β *delicatula*), F., Rio-Janeiro, n°s 453 et 1689. — Sporothèces intra-marginaux, assez larges; le type et la variété, très-souples, terminés en pointe et de courte durée.

2. STIPITATA, Kze., *Anal. pterid.*, p. 28, t. 18, f. 1; Martius, *Herb. Bras.*, n° 386; Blanchet, à Bahia, n° 2488. — A l'état de dessiccation elle est très-fragile. Par l'épithète *stipitata*, on doit entendre seulement qu'elle est plus amincie vers le bas que les autres espèces.

3. LINEATA, L., *Spec. pl.*, n° 1530, *sub pteride; Pteris*, Sw., *Syn. filic*, p. 109; Martius, *Herb. Bras.*, n° 385. Glaziou, au Corcovado, n°s 924 et 1737; Serra os Orgaos, n° 2802; Rio-Janeiro, Picade Trannin, n° 2421; Gloker, Bahia, n° 182; île Sainte-Catherine, à Desterro. — Varie par des frondes plus larges, *graminifolia*, et plus étroites, *angustifrons*.

** *Euvittaria.*

4. SCABRIDA, Klotz in F., *l. c.*, p. 20; Sellow, Brésil. — Petite espèce à frondes courtes, presque obtuses, sporothèces continus; sporangiastres cuculliformes. Cette espèce demande à être mieux connue. Longueur, 90 centim., sur 1 millim. de largeur.

15. PTEROPSIS, Desv., *Prodr. filic.*, p. 218. F., *Hist. des Vittar.*, p. 7.

1. ANGUSTIFOLIA, Sw., *Syn. filic.*, p. 95, *sub pteride; Pteropsis*, Desv., *l. c.*; Mart., *Herb. Bras.*, n° 329. Para, Spruce, n° 10. — Très-répandue dans les Antilles et le continent de l'Amérique tropicale et équatoriale.

16. CUSPIDARIA, F., *Hist. des Vittar.*, p. 9.

1. FURCATA, F., *l. c.*, p. 25, et *Gen. fil.*, p. 88, t. 8, A; Mart., *Herb. Bras.*, n° 330; Spruce, n° 2370, San-Gabriel da Cachoeira, Rio-Negro, Brésil bor. — Le genre *Cuspidaria*, très-distinct, a un port tout spécial dans les espèces qui le composent et mérite d'être adopté. Il n'a aucun rapport avec les *Tæniopsis* (*Vittariæ spec.*), ni avec les *Pteropsis*.

NB. Le groupe des Vittariées renferme de petites fougères herbacées presque toutes arboricoles, souvent linéaires, pendantes, à sporothèces continus et très-étroits. Des 10 genres qui le composent, l'Amérique tropicale et équatoriale en possède 4, dont un, le genre *Nevrodium*, n'a été, jusqu'à présent, observé que dans les Antilles. Le nombre des Vittariées américaines se réduit à 7. Les genres sont parfaitement tranchés; le plus nombreux en espèces, le genre *Vittaria*, présente d'assez grandes difficultés de diagnose. Les sporothèces sont endophylles, c'est-à-dire

situés entre les deux lames, ou bien confinant avec la marge; il faut y regarder de près pour bien constater cette situation. Le genre *Cuspidaria* partage ses frondes en 2 ou 3 segments pointus; il s'éloigne grandement, par le port, des autres genres du groupe. M. J. Smith en a fait un genre *Dicranoglossum*. Nous maintenons notre nom générique. Il est digne de remarque de constater que dans tous les genres on trouve des sporangiastres mêlés aux sporanges, des écailles cancellaires sur le rhizome et des radicelles abondamment couvertes d'un tomentum ferrugineux très-épais. Ces particularités organiques démontrent que ce groupe est des plus naturels.

IV. PLEUROGRAMMÉES.

17. XIPHOPTERIS, Klfss., *Enum. filic.*, p. 85.

1. SERRULATA, Klfss., *l. c.;* Schkh., *Crypt. Gew.*, p. 9, t. 7; F., *Gen. filic.*, p. 100, t. X, B. Langsdorff, de Gestas, Weddell, n° 660. Glaziou, Rio-Janeiro, n°s 1719 et 2384. — Plante très-répandue et très-distincte.

18. PLEUROGRAMME, Presl., *Tentam. pterid.*, p. 223.

1. LINEARIS, Klfss., *Enum. pl.*, p. 131, *sub tænitide; Pleurogramme*, Presl., *Tent. pterid.*, p. 223, Gardn., n°s 105 et 5286; Glaziou, n°s 1738 et 2385, Rio-Janeiro.

2. GRAMINIFOLIA, Hook. in Spreng., *Syst. veget.*, IV, p. 42? *sub tænitide; Pleurogramme;* F., *Hist. pleurogr.*, p. 37, t. IV, f. 8; Claussen, Brésil, n° 254.

3. GRAMINOIDES, Klfss., *Enum.*, p. 86, *sub cochlidio; Grammitis graminoides*, Sw., *Syn. filic.*, p. 22, t. 1, f. 5; *Pleurogramme*, F., *l. c.*, p. 37; Langsd., Brésil (H. F.); Villa-Rica, Vauthier, n° 653. — Petite plante qui croît en touffes serrées; frondes linéaires, obtuses, élargies au sommet dans la partie fructifère, qui est spatulée.

4? PUMILA, Klfss., *Enum.*, p. 132, *sub tænitide; Pleurogramme*, F., *l. c.*, p. 38. Claussen, Brésil, n° 254? — Frondes linéaires, très-entières, raides, épaisses; sporothèces terminaux, sur un sommet non élargi; a été décrite primitivement sur une fougère de Guinée; elle est très-douteuse comme croissant au Brésil.

NB. Petites plantes qui, pour la plupart, vivent en touffes ou parmi les mousses; les frondes sont simples, étroites, à marge tantôt entière et tantôt denticulée, pinnatifides même dans le genre *Adenophorus* des îles Sandwich, remarquable entre tous par les glandes pyriformes dorées qui recouvrent les lames. L'Amérique ne possède que les genres *Xiphopteris* et *Pleurogramme*, très-peu nombreux en espèces; le premier est peut-être une Polypodiée; le second a ses sporothèces costaux comme dans les Lomariées.

V. LINDSAYÉES.

19. LINDSAYA. Dryand., *Act. societ. Linn. Lond.*, III, p. 40.

1. RIGESCENS, Willd., *Filic.*, p. 421. Brésil, Spruce, n° 3064, près San-Carlos. — Frondes simples, assez longuement pétiolées; pétiole grêle; frondules lunulées, à marge entière, atténuées vers le sommet; souche déliée rampante.

2. QUADRANGULARIS, Radd., *Filic. Bras.*, p. 55, t. 74. Radd., Rio-Janeiro; Brésil, Gardn., n°s 158, 1225 et 2987. — C'est le *L. pallida* de Klotszch, *in Linn.*, 1844, p. 547.

3. TRAPEZIFORMIS, Dryand., *in Linn. Transact.*, III, p. 42, t. 9; *L. nitidissima*, Willd., *Filic.*, p. 423. Brésil, Jacobine, Blanchet; Sainte-Catherine, H. Gauthier. — C'est la plus grande et la plus belle des espèces du genre; les frondules primaires sont au nombre de 4-5; les frondules secondaires au nombre de 20 environ, toutes assez fortement arquées, très-entières, très-obtuses, et souvent imbriquées; la terminale grande et anguleuse. Les pétioles et les rachis sont gramineux, presque quadrangulaires, canaliculés et assez grêles.

4. HORIZONTALIS, Hook., *Sp. filic.*, I, p. 214, t. 62 B. Os Orgaos, Gardner, n° 157; Glaziou, Rio-Janeiro, n° 2323. — Espèce voisine de la précédente, remarquable, dans notre spécimen, par des frondules de deux formes; les unes, plus longues, terminées en pointe, les autres, plus courtes, très-obtuses. Le pétiole est plus long que la fronde du double; elle mesure, en moyenne, de 50 à 60 centim. Le rhizome est rampant, fort délié et rougeâtre.

5. GARDNERI, Hook., *Sp. filic.*, I, p. 213, t. 65 *c*. Gardner, Serra os Orgaos, n° 156. — Cette espèce, d'après la figure donnée, se rapproche, par le port, des

Stenoloma; les sporothèces sont réniformes, au nombre de 2-3 sur chaque segment; celui-ci est dimidié, cunéiforme, avec un petit indusium semi-orbiculaire, à marge denticulée.

6. CURVANS, F., *Gen. filic.*, p. 106. Rio-Janeiro, Glaziou, n° 1653. — Semble se rapprocher du *L. horizontalis*, Hook. Longueur, 80 centim. et plus, dont le pétiole fait la moitié; il est rouge purpurescent, ainsi que le rachis; la frondule terminale mesure de 15 à 18 centim.

7. STRICTA, Dryand., *in Linn. Transact.*, III, p. 42; Willd., *Filic.*, p. 425; Schkh., *Crypt. Gew.*, p. 105, t. 114; Radd., *Fil. Bras.*, p. 55. Rio-Janeiro, Martius; la Jacobine, Blanchet. — Frondes très-raides, prenant, par la dessiccation, une couleur jaune, légèrement dorée; les frondules primaires sont dressées, pinnées, et portent une quarantaine de frondules secondaires trapéziformes, sessiles, coriaces, dimidiées, fructifères dans toute leur partie supérieure.

8. RADDIANA, Kl., *in Linnæa*, 1844, p. 549. *L. Javitensis*, H. et Bonpl., *in* Willd., *Filic.*, p. 424; Radd., *Filic. Bras.*, p. 56, t. 75, f. 1; Martius, Serra d'Estrella, Weddell. — Frondes bipinnées, à frondes primaires étalées, à frondules secondaires, obtuses, raides, opaques, lunulées, décroissant au sommet, de manière à n'être plus représentées que par des expansions presque ponctiformes. Nous limitons à dessein la synonymie de cette espèce et de la précédente, pour ne pas ajouter à la confusion qui règne chez les auteurs qui l'ont étendue et faussée.

9. CATHARINÆ, Hook., *Sp. filic.*, I, p. 212, t. 65, B. *L. virescens*, Martius (H. F.); F., *Gen. filic.*, p. 106 (*nomen tantum*). Sainte-Catherine, H. Gauthier; Rio-Janeiro, Vauthier, Serra os Orgaos, n° 668; Glaziou, n°s 1644 et 2324. — Cette espèce a des frondules divisées et cunéiformes, qui lui donnent l'aspect d'un *Stenoloma*.

10. CONSANGUINEA, *Hist. des foug. et des lycop. des Antill.*, p. 16, t. VI, f. 3 (*pinnula*). Para, Martius (H. F.), sous le nom de *L. Guyanensis*. Luschnath, n° 22. Bahia, Sainte-Catherine, H. Gauthier. — Elle diffère de la *L. Guyanensis*, Dryand., par des frondes secondaires plus grandes, moins serrées et bien moins nombreuses; nous en comptons environ 60 dans le *L. Guyanensis* et à peine 30 dans le *L. consanguinea*, F. (var. β *rigida*, F.); Glaziou, Serra os Orgaos, n° 2805. — Frondes raides, à long pétiole rougeâtre; frondules

primaires dressées, 2-4, quelquefois même une seule, très-rapprochées; frondules secondaires assez courtes, légèrement recourbées, décroissantes au sommet; elles ne sont pas imbriquées. Cette variété se rapproche du *L. Guyanensis*, Dryand.

11. GUYANENSIS, Dryand., *Act. soc. Linn. Lond.*, III, p. 42; Hook., *Sp. filic.*, I, p. 216, t. 72. Aubl. *Pl. Guyan.*, t. 365. Spruce, Rio-Negro, près de Barra, sans numéro. — Frondules secondaires nombreuses, très-arquées, parfois imbriquées et au nombre d'une soixantaine.

NB. Le groupe des Lindsayées renferme cinq genres, dont un seul est américain; c'est mal à propos qu'il est dit, *Genera filicum*, n° 109, que le genre *Isoloma* a des espèces dans le Nouveau-Monde : il n'a que des *Lindsaya;* 11 espèces pour le Brésil, 7 pour les Antilles et 4 seulement pour le Mexique. Ces plantes ont le port des *Adiantum*, quoique plus uniforme. Elles n'en diffèrent que par la déhiscence de l'indusium, qui, au lieu de s'ouvrir de dedans en dehors, s'ouvre de dehors en dedans; ce sont, sous ce rapport, des *Adiantum* renversés. Toutes les espèces pinnées ou bipinnées ont des frondules dimidiées, à marge entière ou crénelée; elles sont presque universellement glabres, à nervilles apparentes et peu chargées de chlorophylle.

VI. ADIANTÉES.

20. ADIANTUM, L., *Spec. pl.*, p. 1556.

* *Synechia* (sporothèces continus).

1. MACROPHYLLUM, Sw., *Fl. Ind. occid.*, III, p. 1707; Hook., *Icon. filic.*, n° 132; Martius, *Herb. Bras.*, n° 354; Gardner, n° 5932; Blanchet, n° 2482. Rio-Janeiro, Glaziou, n° 2317. — Très-belle espèce, bien caractérisée et très-répandue. Les spécimens brésiliens à frondules opposées, légèrement cunéiformes, coupées nettement inférieurement, à sporothèces toujours continus, semblent constituer une variété distincte.

2. PLATYPHYLLUM, Sw., *Kon. Vet. Ac. Stock.*, 1817, 74, t. 3, f. 6. Villa-Rica, Pohl (*Herb. Vindob.*). Entre Indio-Grande et Piguero. — Nous ne l'avons vu que stérile. Les frondules du haut de la fronde sont ovoïdes et cordiformes dans la partie inférieure. Elles mesurent 10 centim. de hauteur sur 7 de largeur. Il n'en existe pas d'aussi grandes dans tout le genre.

3. LUCIDUM, Sw., *Syn. filic.*, p. 121; Hook., *Sp. filic.*, II, p. 4, t. 79 *c*. Para, R. Spruce, n° 39. — Frondules portées sur un très-large pétiole, fortement échancrées à la base inférieure et terminées par un long acumen denté.

4. JACOBINÆ, F., *Gen. filic.*, p. 115. Blanchet, Brésil. — Dans cette espèce, les frondules secondaires stériles sont oblongues, obtuses, très-finement dentées au sommet et à la marge supérieure; les fertiles ont une même forme et sont à peine échancrées à la base; les sporothèces, de couleur rougeâtre, en occupent le sommet et toute la marge supérieure; ils ne sont continus que par connivence; les indusiums se fractionnent en nombreux segments.

5. PULVERULENTUM, L., *Sp. pl.*, 1559; Sw. et *auct.* Brésil, Martius, *Herb. Bras.*, n° 350; Gardn., n°s 56 et 1226, et par le même à Pernambouc; Rio-Janeiro et Serra os Orgaos, Glaziou, n°s 436 et 1755. — Les frondules ne sont fertiles que sur une partie de la marge supérieure, qui est très-fortement échancrée, le sommet est stérile et fortement denté; les sporothèces sont absolument continus. Le pétiole et le rachis sont couverts de très-petites écailles piliformes, couleur de rouille, d'apparence pulvérulente, d'où le nom spécifique, lequel, rigoureusement parlant, est impropre. L'espèce précédente porte les mêmes écailles piliformes aussi ferrugineuses; dans l'une et l'autre espèce, les pétioles et les rachis sont adiantins, nigrescents et luisants.

6. CLAUSSENII, F., *Gen. filic.*, p. 115. Nouv.-Fribourg, Claussen, n° 124. — Frondes bipinnées; frondules fertiles à sporothèces tantôt unis et tantôt séparés; indusium très-épais; rhizome sur lequel naissent les frondes très-rapprochées et qui conserve la base des anciennes frondes persistantes. Elle est voisine de l'*A. pulverulentum* et intermédiaire entre les *Synechia* et les *Apotomia*.

** *Apotomia* (sporothèces interrompus).

A. *Frondes simplement pinnées.*

7. OBLIQUUM, Willd., *Filic.*, p. 429. — Espèce très-répandue, à frondes pinnées, à frondules ovales lancéolées, obtusiuscules; rachis villeux; sporothèces courbes (var. β *majus*). Hook., *Spec. filic.*, 11, p. 8, t. 79 *a*. Para, Spruce, n° 39 *.

8. MACRODON, Klfss., *Herb.* Kze., *Flora*, 1839; Mart., *Herb. Bras.*, à Ilheos, n° 355. — Fronde oblongue, pinnée; quelquefois, mais rarement, bipinnée inférieurement; frondules ovales, obliques, lancéolées, atténuées au sommet, tronquées à la base et coriaces; la terminale presque triangulaire; rhizome, por-

tant de longues radicelles. Il ressemble à l'*A. intermedium*, Sw., qui est bipinné. — Longueur, 50 centim.; frondules, 6 centim. sur 12-13 millim. de largeur.

9. FLAGELLUM, F., *Gen. filic.*, p. 117. *Iconogr. nouv.*, p. 4, t. 2, f. 1. Brésil (Herb. Moug.). — Port tout spécial; elle est simplement pinnée, à frondules cunéiformes, ovoïdes, incisées-dentées, pétiolées; pétiole articulé; indusium pellucide, élégamment nervé.

10. RHIZOPHYTUM, Schrad., *Gœtt. gel. Anz.*, 1824, p. 872; Mart., *Icon. crypt.*, p. 92, t. 62. — Cette espèce est fort élégante; les frondes, simplement pinnées, sont rassemblées en assez grand nombre sur une petite souche fibreuse; elles sont souvent radicantes; les frondules sont glabres, sous-triangulaires, flabelliformes, terminées en coin; pétioles légèrement poilus. (N. V.)

11. DELICATULUM, Martius, *Icon. pl. crypt.*, p. 94, t. 56, f. 2; *A. filiforme*, Hook., *Icon. pl.*, t. 503; Gardn., n° 2391; Spruce, n° 879. — Petite espèce simplement pinnée, dont les frondes sont portées sur une petite souche fibreuse; pétiole filiforme, à frondules écartées, ovales rhomboïdales, à marges incisées; sporothèces orbiculaires, oblongs, au nombre de 1 à 2. Le rachis s'allonge en une longue pointe nue.

† 12. SUBARISTATUM, F.; Blanchet, Bahia, n° 2373. — Espèce à frondes simplement pinnées, longuement pétiolées; frondules pétiolées, dimidiées, tronquées, marges des stériles dentées, aristées, 3-4 sporothèces assez gros, rougeâtres et arrondis. — Longueur, 14-16 centim.; frondules, 11-12 millim. de largeur. Les frondes sont fasciculées sur une petite souche dressée.

ICON. : *Tab. VIII, fig. 3.*

B. *Frondes bi ou pluripinnées.*

13. SUBCORDATUM, Sw., *Vet. Acad. Handl. Stockh.*, 1817, 75; *A. betulinum*, Klfss., *Enum.*, p. 207. Glaziou, Rio-Janeiro, n° 2319. — Le nom spécifique de *betulinum* rappelle très-bien la forme des frondules.

β *latior*, Pohl, Serra do Chumbo et Minas-Geraes, n° 3012.
γ *obtusum*, Kze., *Linn.*, XXII, p. 577; Regnell, I, 490.
δ *lobatum*, Gardner, n° 5299.

La variété β a une tige flexueuse, des frondules longuement pédicellées, assez épaisses, obliques et glauques; la marge, moins la base, est garnie d'indusiums épais, en fer à cheval.

14. TRUNCATUM, Radd., *Fil. Bras.*, p. 50, t. 78, f. 1. Rio-Janeiro, Glaziou, nº 2320. — La figure citée de Raddi est très-exacte; la plante a des frondules acuminées, assez longuement pédicellées; la base est tronquée, cunéiforme ou sous-cordiforme, la consistance assez délicate. Petits sporothèces rapprochés sur une marge qui n'est ni ondulée, ni lobée; elle est très-différente de la plante de Pohl, nº 3012, rapportée à l'*A. subcordatum*, Sw., par quelques auteurs.

15. TRAPEZIFORME, L., *Sp. pl.*, 1559. *A. rhomboideum*, Schkh., *Crypt.*, p. 114, t. 122. — Cette espèce, commune au Brésil, est assez mobile dans ses formes.

β *pentadactylon*, Langsd. et Fisch., *Icon. fil.*, p. 22, t. 25. Rio-Janeiro, Glaziou, nºs 2318 et 4387; Sainte-Catherine, H. Gauthier. — Rhizome rampant, de la grosseur d'une plume d'oie; les frondes y sont rapprochées les unes des autres.

16. CULTRATUM, Hook., *Sp. filic.*, II, p. 34? Glaziou, Rio-Janeiro, nº 1754, et Sainte-Catherine, par Armstrong, *teste* Hook., *l. c.* — Cette espèce est vigoureuse. Les frondules mesurent 6 centim. sur 2 centim. dans leur plus grande largeur; elles sont terminées en une longue pointe obtuse, crénelée et largement échancrée à la base. Le stipe est triangulaire, forme qui ne se retrouve pas chez l'*A. trapeziforme*. — Est-ce bien là l'*A. cultratum* de Hooker? Il est, du reste, différent de l'espèce précédente.

17. CURVATUM, Klfss., *Enum.*, p. 202; Hook., *Sp. filic.*, I, p. 28, t. 84 *c*. Brésil, Klfss.; Goyaz, Serra do Santa-Brida, Gardner, nº 4074. Rio-Janeiro, Glaziou, nº 437. — Frondes pédiaires, à frondules primaires, très-longues et pouvant dépasser 30 centim.; frondules secondaires au nombre de plus de 30 paires, dimidiées, courbes, presque semi-lunaires, imbriquées, portant sur la marge supérieure et au sommet 6-8 sporothèces également distants et séparés; ces frondules mesurent 3 centim. sur 1 centim. de largeur; le pétiole est assez court.

18. DEFLECTENS, Mart., *Icon. pl. crypt.*, p. 194. Martius, à Para. — Rhizome simple, court; frondes pinnées, souvent radicantes et gemmifères, pétioles paléacés

à la base, noirs et glabres, ainsi que les rachis; frondules transversalement oblongues ou trapéziformes; 1-5 sporothèces orbiculaires oblongs. (N. V.)

19. SINUOSUM, Hook. et Gardn., *Sp. filic.*, II, p. 35; Hook., *Icon. pl.*, t. 504. Gardner, Goyaz, n° 3552. Serra do Natividade. — Frondes élégantes, souvent tripartites, à frondules pinnées, dont les partitions sont pétiolées, rhomboïdes, cunéiformes, incisées inégalement à la marge; sporothèces en fer à cheval, dont les branches sont obtuses et courbées en hameçon. M. Hooker constate que cette espèce a des rapports d'ensemble avec l'*A. trapeziforme*, L.

20. TETRAGONUM, Schrad., *Gœtt. gel. Anz.*, 1824, 872. Mart., *Icon. cryptogamic.*, p. 93, t. 63, Brésil. — Rhizome rampant; fronde pédiaire tripinnée; pétiole tétragone, légèrement furfuracé; frondules de 3e ordre ovales, acuminées; base supérieure arrondie, l'inférieure en coin; elles mesurent jusqu'à 9 centim. sur 2.2 centim. de largeur.

Le nom spécifique pourrait se rapporter à plusieurs espèces.

21. PENSILE, Kze., *Herb. Vindob.*, F., *Gen. filic.*, p. 114. Pohl, Goyaz, Serra dourada (var. *Alchemillæfolia*, Brésil, F., *l. c.*). — Espèce très-distincte, qui se rattache au groupe de l'*A. trapeziforme*, avec des proportions plus petites; la marge des frondules secondaires rappelle, par ses découpures, les folioles de l'*Alchemilla arvensis*, Scop.

22. INTERMEDIUM, Sw., *Vet. Acad. Handl. Stockh.*, 1817, 76. *A. fovearum*, Radd., *Fil. Bras.*, p. 58, t. 77; Mart., *Herb. Bras.*, nos 349 et 352? Gardn., nos 58, 1228, 2758; Spruce, Para, nos 48 et 578 (*partim*); Blanchet, à la Jacobine; Rio-Janeiro, Glaziou, n° 2322. — Le rhizome est rampant, délié, fort long, et les frondes qui s'y attachent et qui ont une légère teinte glauque, laissent entre elles d'assez grands intervalles.

23. BRASILIENSE, Radd., *Filic. Bras.*, p. 56, t. 76. Raddi, Rio-Janeiro; Gardner, n° 59; Burchell, *Herb.*, n° 1816. — Frondes bipinnées; frondules inférieures divisées en 4-5 rameaux. Le rhizome est rampant, le pétiole, pubescent et tétragone; les sporothèces en fer à cheval, assez petits, sont portés sur des frondules de 3e ordre, dimidiées, obtuses et cunéiformes à la base, qui se termine en un court pétiole.

† 24. SUBRAMOSUM, F.

Frondibus basi subramosis, intense viridibus, petiolo elongato, nudo, flaccido, brunneo; frondulis primariis lanceolatis, abrupte caudatis, cauda longa, lineari, crenata; frondulis secundariis oblongis, curvatis, dimidiatis, acutis, basi superne rotundis, inferne cuneatis, margine superiori crenatis, omnibus approximatis, aliquando imbricatis, inferioribus minoribus, plus minusve rotundatis; sporotheciis linearibus, leviter hippocrepidibus.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2377).

Filix frondosa, intense viridis, basi subramosa, seu bipinnatifida.

ICON. : *Tab. IX, fig. 1.*

(Longueur, 50 centim., prise du sommet de la frondule terminale; frondules de la base, les plus grandes, 20-25 centim. sur 5 d'envergure. La fronde, qui s'étale en éventail et qui est plus large que haute, mesure 30 centim. La foliole qui termine les frondules primaires n'a pas moins de 2.5 à 3 centim.)

Cette belle fougère a un port spécial, qui la montre rameuse à la base; le rachis est flexueux et porte un assez grand nombre de frondules primaires terminées en un long appendice en queue et courtement pétiolées; les frondules secondaires sont en grand nombre, très-rapprochées, parfois même imbriquées; elles sont oblongues, échancrées vers la marge inférieure, crénelées supérieurement et pointues; elles décroissent en s'approchant de leur point d'insertion et deviennent très-obtuses. Les sporothèces sont épais, séparés par une fente assez profonde et en forme de fer à cheval.

25. PRIONOPHYLLUM, H. B., Kth., *Nov. gen.*, I, 20. *A. tetraphyllum*, Willd., *Filic.*, p. 441. Mart., *Herb. Bras.*, n° 351. Bahia, *in sylvis umbrosis*, Luschnath, n° 28 (H. F.). — Frondes bipinnées, pétiole très-long. Le nom spécifique, *tetraphyllum*, ne doit pas être pris dans un sens rigoureux.

26. RHOMBOIDEUM, H. B. et Kth., *Nov. gen. Amer.*, I, p. 20. *A. serrato-dentatum*, Willd., *Filic.*, p. 445. — Frondes bipinnées; frondules fructifères dentées en scie; le rachis est courtement paléacé et le rhizome rampant.

27. FRUCTUOSUM, Kze., *Linn.*, IX, 81. Brésil, Gardn., n° 3549. — Frondes tripartites et rameuses; frondules primaires terminées en coin; dernières frondules dimidiées, oblongues, doublement dentées, pétiole et rachis squamuleux, à squames piliformes, ferrugineux. Les sporothèces sont parfois continus; nous ne l'avons pas vue, non plus que les trois espèces suivantes, provenant du Brésil.

28. GLAUCESCENS, Kl., *Linn.*, XVIII, 552. Spruce, Para, n° 1156. — Frondes bipinnées, à frondules glaucescentes, glabres en dessous; sporothèces petits, noirâtres, semi-orbiculaires, glabres; frondules secondaires oblongues, la supérieure trapéziforme, l'inférieure presque ronde. (N. V.)

29. PROXIMUM, Gaudich., *Voy. Freyc.*, 403. Gaudichaud, Rio-Janeiro. (N. V.)

30. TOMENTELLUM, F., Minas-Geraes; Claussen, *Herb. Delessert.* — Espèce voisine de l'*A. gracile;* elle est bipinnée et couverte très-abondamment, dans toutes ses parties, d'un tomentum roussâtre; les frondules sont dressées, courtement pétiolées, opaques, glabres, fortement dentées au sommet, assez facilement caduques; elles portent 1-3 sporothèces ayant de la tendance à se réunir (*synechia*). Cette espèce atteint une trentaine de centimètres de longueur et se charge de 4-6 frondules, qui se recourbent d'une manière irrégulière. Elle n'a aucun rapport avec l'*A. tomentosum,* Kl., *Linn.*, XVIII, p. 553, récolté à Para par Spruce, n° 51.

ICON.: *Tab. IX, fig. 2.*

31. ANGUSTATUM, Klfss., *Enum.*, p. 202. Brésil, Klfss. — Fronde pédiaire, à frondules de 2e ordre délicates, linéaires-lancéolées, à marge supérieure incisée-dentée; le stipe est pubescent. — Cette espèce laisse du doute sur sa spécification. (N. V.)

32. GRACILE, F., *Gen. filic.*, p. 116. Brésil, Claussen (H. F.). — Pétioles grêles avec poils courts, écailleux et ferrugineux; frondules primaires flexibles, atténuées, s'allongeant en queue ovoïde; frondules secondaires dimidiées, étroites, terminées en pointe, portant sur la marge supérieure trois sporothèces; le rhizome, très-délié, est rampant.

33. HIRTUM, Kl., *Linn.*, XVIII, 563. Spruce, Para, n° 14. — Espèce bien voisine de la précédente.

34. CALCAREUM, Gardn. in Hook., *Spec. filic.*, 2, p. 15, et *Icon. plantar.*, V, t. 467; Goyaz, Gardn., n° 3551. Rochers calcaires, Goyaz. — Stipes et rachis capilliformes, glabres; frondes très-délicates, portées sur une petite souche dressée et souvent prolifères au sommet; frondules dimidiées, sous-triangulaires, légèrement flabelliformes, écartées; sporothèces réniformes. Elle mesure environ 5 centim.

35. INCISUM, Presl., *Reliq. Haenk.*, I, 61, t. 10, f. 3. Brésil, *teste* Th. Moore, *Ind.* — Il est fort douteux que cette plante soit brésilienne. (N. V.)

36. OBTUSUM, Desv., *Berol. mag.*, V. 327. Hook. et Grev., *Icon. filic.*, n° 188. *A. cassioides*, Desv., *Prodr.*, p. 309; Gardner, n° 71; Spruce, Para, n° 748, et Rio-Negro, 1323; Glaziou, Rio-Janeiro, n°s 943 et 1756. M. Hooker, *Sp. filic.*, II, p. 19, indique une var. β *majus*, récoltée au Brésil par Gardner, n° 3550.

Var. β *microphylla*, F. Frondes dressées, raides, à long pétiole; frondules primaires pétiolées, linéaires; à frondules secondaires ovales, très-rapprochées, petites et nombreuses; sporothèces confluents, occupant le sommet et la marge supérieure. — Nouvelle-Fribourg, par Claussen.

† Type *A. Capillus-Veneris.*

37. EXTENSUM, F., *Gen. filic.*, 114. Claussen, Brésil, n° 264 (Herb. F.). — Espèce bipinnée; frondules secondaires denticulées, étalées en éventail, souvent plus larges que hautes, se désarticulant avec la plus grande facilité.

38. LUNULATUM, Burm., *Fl. Ind.*, 235; Sw., *Syn. filic.*, p. 121; Hook. et Grev., *Icon.*, n° 104. Gardn., Brésil, n°s 2019, 2392, 3553. Blanchet, à Bahia. — La forme brésilienne que nous avons sous les yeux, est parfaitement semblable à la figure citée de Hooker et Greville.

39. DOLABRIFORME, Hook., *Icon.pl.*, II, t. 191. Brésil, Natividade, Gardner, n° 3553, et à Aracipe, n° 2019. — Simplement pinnée, pétioles rougeâtres; le rachis, de même couleur, se prolonge et devient parfois prolifère; les frondules sont écartées les unes des autres, assez longuement pétiolées et semblables, avec de petites proportions, à celles de l'*A. lunulatum*, Burm., auquel le réunit à tort M. Th. Moore dans son *Index.*

40. CUNEATUM, Langsd. et Fisch., *Icon. filic.*, p. 23, t. 26. Brésil, Regnell, I, 488, Serra os Orgaos, Gardn., n° 186. Santa-Barbara, Martius; Rio-Janeiro, Pohl; Claussen, n° 105; Glaziou, n° 439, et par le même à Tijuca, n° 2054; île Sainte-Catherine, H. Gauthier. — Frondes quadripinnées, dernières frondules cunéiformes, portant au sommet deux ou trois incisions; sporothèces, 3-4, réniformes orbiculaires.

41. CAPILLUS-VENERIS, L. *Spec. pl.*, 1558. Brésil à Desterro, île Sainte-Catherine, H. Gauthier. — Forme d'une espèce cosmopolite très-variable.

21. HEWARDIA, J. Sm., *in Hook. Journ.*, III, 432, t. 16 et 17.

1. DOLOSA, Kze., *Linnæa,* XXI, p. 219; Hook., *Sp. filic.*, II, p. 6, t. 79 B; *Hewardia serrata*, F., *Gen. filic.*, p. 2122. *Lindsaya macrophylla,* Kze., *Anal. pterid.*, p. 37 (t. 25, exclus.). Bahia, Blanchet, 1851, *sine numero.* Luschnath (*in Schedula Adiantum serratum,* Schlech.). — Frondes pinnées, pétioles longs, luisants, rouge brun; pinnules lancéolées, courtement pétiolées, acuminées, souvent appendiculées à la base; les stériles à marges dentées; sporothèces continus; nervation connivente, à longues mailles.

2. DIPHYLLA, F.

Frondibus glabris, repentibus, petiolo longo, atro-brunneo, lucente; frondulis duabus magnis; frondula terminali oblique ovoidea, frondula laterali minore, breve petiolata; nervatione areolata; areolis magnis; tela cellularia tenui, cellulis magnis; sporotheciis continuis, angustis; marginem totam invadientibus, indusio crasso; sporangiarum annulo 18-20 articulato; sporis atris, irregulariter trigonis, opacis.

Habitat in Bahia (Blanchet, *sine numero*).

Filix amplitudine frondulæ geminatæ notata.

ICON. : *Tab. IX, fig. 3.*

(Longueur, 25 centim.; mesure prise à la base de la frondule terminale, celle-ci ayant seule 14-16 centim. sur 6-7 de largeur; la foliole latérale est d'un tiers plus petite.)

Cette plante est des plus remarquables et des plus distinctes. Les deux spécimens que nous avons sous les yeux sont diphylles; en est-il toujours ainsi?

NB. Nous avons dit ailleurs que le genre *Hewardia* ne différait des *Adiantum* que par la nervation, libre chez ceux-ci et anastomosée chez les *Hewardia;* le port est absolument le même, ainsi que l'appareil reproducteur, indusium, sporanges et spores.

22. CASSEBEERA, Klfss., *Enum. filic.*, p. 216.

1. TRIPHYLLA, Lmrk., *Encyc.*, I, p. 41, *sub adianto;* Sw., *Syn. filic.*, p. 120. *Cassebeera,* Klfss., *Enum. l. c.*, t. I, f. 11 (*fragmenta*), F., 7e *Mém.*, p. 30, t. 12, f. 5 (*fragm.*); Hook. et Bauer, *Gen. filic.*, t. 66 A. Brésil mérid., Sellow; Tweedie. — Cette espèce est facile à distinguer de la suivante, dont elle diffère par ses frondes tripartites; elles sont courtement pétiolées et élégamment crénelées.

2. PINNATA, Klfss., *l. c.*, p. 217, t. 1, f. 11; Mart., *Icon. pl. crypt. Bras.*, p. 91, t. 61; Kze., *Analect. pteridogr.*, p. 37, t. 24; Hook., *Sp. filic.*, II, p. 119. Minas-Geraes, Langsdorff; Serra do Natividade, Gardner, n° 3556; Sainte-Catherine, Chamisso. — Frondes pinnées, à frondules presque opposées; crénelées-obtuses; le rhizome est rampant.

3. GLEICHENIOIDES, Hook., *Icon. pl.*, VI, t. 507, et *Spec. filic.*, II, p. 119. District des Diamants, Gardner, n° 5295. — Frondes bipinnées, à pinnules linéaires, allongées, doublement ou simplement pinnées; elle diffère beaucoup, par le port, des deux précédentes.

NB. Les Adiantées sont très-richement représentées au Brésil, tandis que le Mexique en compte à peine une vingtaine d'espèces; nous en décrivons ici plus du double. Parmi les quatre genres que renferme ce groupe, il en est un, le *Cassebeera*, qui semble avoir son centre de développement au Brésil et qui manque aux Antilles. Les rapports qui existent entre les Adiantées et les Lindsayées, sont des plus singuliers; c'est le même port et la même organisation des frondes. Le mode de déhiscence des indusiums diffère seul, et l'on peut dire du *Lindsaya* que c'est un *Adiantum* retourné.

VII. PTÉRIDÉES.

23. PTERIS, L., *Emend.*, *Hort. Cliffortian*, p. 473.

* *Fronde pinnée; pinnules entières.*

1. CRETICA, L., *Mantiss.*, p. 130.

Var. γ *Americana*, Agardh, *Monogr.*, p. 9. Brésil, Freyreis. Glaziou, Rio-Janeiro, n° 2308. — Les frondules sont opposées; les stériles assez courtes, oblongues lancéolées, obtusiuscules, dentées en scie; les fertiles tendent à la forme linéaire.

** *Fronde bi-, tri- ou quadripinnée; pinnules entières ou simplement dentées.*

2. HETEROPHYLLA, L., *Sp. pl.*, p. 1534. Agardh, *Monogr.*, p. 15; Plum., *Filic.*, t. 37. Rio-Janeiro, lady Calcott. — Frondes deux ou trois fois pinnées, à frondules pétiolées, terminées en coin à la base, linéaires oblongues; les stériles profondément dentées en scie, à nervilles simples ou bifurquées.

3. GRACILIS, F., *Gen. filic.*, p. 128. Hook., *Sp. filic.*, II, p. 172, t. 128 *a*. Claussen; Forbes; Glaziou, n° 430. — Fougère élancée, à pétiole rougeâtre à la base, très-long et flexueux; fronde tripinnée, segments étroits à dents anguleuses, très-longuement sétacées. (Longueur, 40-50 centim.)

4. QUADRIAURITA, Willd., *Filic.*, p. 385. Brésil, Gardner, n° 5302. (*Teste* Hook., *Spec. filic.*, II, p. 179.) — Fronde à frondules nombreuses, très-courtement pétiolées et pinnatiséquées; les inférieures au nombre de 3-4, bipartites. Elle ne dépasse guère 60 centim. (N. V.)

5. DEFLEXA, Lk., *Hort. Berol.*, II, p. 30; Agardh, *Monogr.*, p. 41; Sellow, Brésil (*Herb. Berol.*), Gardn., n° 101. — Frondes 3-4 pinnées, dont les frondules sous-triangulaires sont longuement acuminées et profondément pinnatifides; les derniers segments, aussi sous-triangulaires, sont mucronés et dentés en scie. Elle est très-ample. (N. V.)

6. GAUDICHAUDII, Agardh, *Monogr.*, p. 42. *P. palustris*, Gaudich., *in* Freyc., *Voy.*, p. 391 (*syn. exclus.*). Rio-Janeiro. — Le stipe est un peu rude au toucher et triparti; les frondules sont au nombre de 14-16; leur consistance est coriace; les derniers segments sont lancéolés, un peu courbés en faux et dentés en scie.

7. PILOSIUSCULA, Desv., *Prodr.*, p. 296. Brésil (Agardh, *Monogr.*, p. 43). — Frondes à pinnules presque pétiolées, pinnatifides, à segments écartés, poilus sur le rachis et les nervures; les derniers segments en faux, aigus, portant des dents écartées au sommet; sinus arrondis; ce serait la plante décrite par Raddi, sous le nom de *P. palustris*, d'après Agardh, *l. c.*

8. ROSTRATA, F., 10e *Mém.*, p. 16, t. 23, f. 1. Glaziou, Rio-Janeiro, n° 1743. — Pinnules et segments pinnulaires plus nombreux et plus rapprochés que dans la plante citée, récoltée par Spruce, au Pérou, en 1856.

*** *Aquilinaires.*

9. ESCULENTA, Forst., *Prodr.*, 418; Agardh, *Monogr.*, p. 45. Brésil, Gaudichaud; Sellow; Gardn., n° 2988. Para, Spruce, nos 32 et 381. Santa-Rosa et Minas-Geraes, Gardn., n° 5303. — Pétiole sous-tétragone, canaliculé, roussâtre, glabre; tous les segments linéaires, de 6-7 millim. jusqu'à 2 centim.; les fertiles ont à peine 2 millim. de largeur. Plante cosmopolite, très-voisine des

espèces suivantes. La racine, qui est pivotante, renferme une substance amylacée. Elle est alimentaire pour les pauvres peuplades du cap de Van-Diemen.

10. ARACHNOIDEA, Klfss., *Enum.*, p. 190; Agardh, *Monogr.*, p. 46. Gaudichaud, Rio-Janeiro; Blanchet, la Jacobine; Sellow. — Elle est voisine de la précédente; les segments pinnulaires sont du double plus larges, les rachis noueux et comme articulés. Les poils qui recouvrent la lame inférieure imitent de petits fils d'araignée et ne sont que faiblement adhérents.

11. CAUDATA, L., *Sp. pl.*, 1533; Agardh, *Monogr.*, p. 48. Glaziou, Rio-Janeiro, n° 431. Ile Sainte-Catherine, H. Gauthier. — Les segments pinnulaires sont écartés et le terminal s'allonge en une pointe caudiforme; elle est fort grande, ainsi que les précédentes, et mesure jusqu'à 3 mètres et plus.

12. PSITTACINA, Presl., *Delic.*, Prag., 1822, p. 185; Agardh, *Monogr.*, p. 47; Presl, Rio-Janeiro. — Frondes ovales, tripinnées, à frondules opposées, écartées. Les rachis sont pubescents, avec des poils roux. Presl ne l'a vue que stérile. C'est une espèce douteuse. Les pteris aquilinaires exotiques se rapprochent grandement du *P. aquilina*, L., d'Europe, dont elles ne semblent être que des formes.

24. PELLÆA, Lk., *Spec. filic.*, p. 59.

A. *Doryopteridastrum.*

† 1. QUINQUE LOBATA, F.

Frondibus tri-quinque lobatis, basi cordatis, novellis hepaticæformibus, pellucidis; mesonevro nervillisque concoloribus; petiolo longissimo, adiantino; lobis acutis, intermedio longiori; indusio latiusculo, tenui; sporotheciis ovatis, annulo 18-20 articulato; sporis rotundis, atris, leviter papillatis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2055).

(Longueur totale, 25-28 centim., avec une lame de 9 centim. de hauteur sur 6 de largeur.)

ICON.: *Tab. X, fig. 1.*

Espèce curieuse et fort distincte; ses frondes sont trilobées dans la jeunesse et quinquelobées à l'état fructifère. Dans le premier état elles ressemblent tout à fait aux feuilles de l'*Hepatica triloba* de nos jardins; les deux lobes inférieurs prennent une disposition pédiaire; le lobe médian a le double de longueur des lobes latéraux; tous se terminent en pointe, mais dans l'état trilobé les lobes sont arrondis et diffèrent peu dans leurs dimensions; la souche est petite; elle porte plusieurs

frondes rapprochées les unes des autres; les écailles, de couleur dorée, ont une forme linéaire et se terminent en une longue pointe.

2. GERANIÆFOLIA, Radd., *Fil. Bras.*, p. 46, t. 67, *sub pteride. Pellæa*, F., *Gen. filic.*, p. 130; Rio-Janeiro, Raddi; Claussen, n° 156; Gardner, Goyaz; Glaziou, n° 1687. — Cette fougère a une géographie très-étendue; on la trouve au Cap, à Port-Natal, à l'île de France et aux Philippines.

3. LOMARIACEA, Kze., *Herb. Monac. et Vinbon.*, *sub pteride; Doryopteris lomariacea*, Klotz., *Linn.*, XX, p. 343. Brésil, Gardner, n° 5930; à l'Infecionado, district des Diamants. Glaziou, Rio-Janeiro, n° 2471. — Frondes dissimilaires, les frondes stériles largement lobées, à 7 lobes pointus; les frondes stériles plus longues, à stipe plus vigoureux; lobes linéaires. La longueur totale pour les premières est d'environ 30 centim. jusqu'à la base de la fronde, et pour les secondes de 50 centim. M. Hooker, *Spec. filic.*, II, p. 133, t. 112 *a*, indique une variété *colombina*, qui aurait été trouvée au sommet de la Serra os Orgaos par Gardner, n° 5297. Le nom spécifique *lomariacea* est fort peu convenable.

† 4. MICROPHYLLA, F.

Frondibus parvulis, palmatis aut trifoliatis, viridibus, glabris; petiolo nudo, adiantino; mesonevris aterrimis, lateralibus tenuibus, furcatis; sporotheciis continuis, indusio membranaceo, pellucido, ad maturitatem aliquando interrupto; sporangiis subrotundis, annulo lato 20-24 articulato; sporis subtrigonis, nigrescentibus.

Habitat in Brasilia fluminensi (Serra do Couto); Glaziou, n°s 3158 et 3159. (1869.)

Filix humilis, surculo plurifrondifero; segmentis obtusissimis; petiolo glabro, tenui, curvato.

ICON.: *Tab. IV, fig. 2.*

(Longueur: 3-5 centim., dont le pétiole fait le tiers; envergure de la fronde, 2 centim. au plus; segments, 6-9 millim.)

Très-curieuse espèce; elle ressemble très en petit aux *Pellæa* pédiaires et palmés; elle est délicate et les frondes s'attachent sur une petite souche dressée; nous la croyons terricole.

5. PARADOXA, F., 7e *Mém.*, p. 30, t. 20, f. 2, *sub cassebeeria;* Gardner, Serra os Orgaos, n° 5930, et Glaziou, même localité, n° 2807. — Il existe, entre cette

plante et la précédente, une évidente analogie, et nous n'hésitons plus à en faire un *Pellæa*. Elle est beaucoup plus robuste, opaque, à pétioles rougeâtres, portant de longs poils espacés et couverts de petites éminences qui les rendent rudes au toucher; les lames portent de 5 à 6 segments de chaque côté du mésonèvre; l'indusium est sensiblement froncé et se soulève tout d'une pièce.

B. *Eupellæa.*

† 6. FLAVESCENS, F.

Frondibus bipinnatis, glaberrimis, siccitate flavidulis; petiolis rotundis, adiantinis; frondulis primariis basi frondium oppositis, dein alternis, lanceolatis; frondulis secundariis ovatis, sessilibus, cordatis, spissis, opacis, supra rugosis, terminali oblonga, majori.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2473).

Filix elegans, petiolis rachibusque atro-fuscis; rhizoma repens.

ICON. : *Tab. XXII, fig. 2.*

(Longueur variable entre 25 et 40 centim., avec des frondules primaires de 2-4 centim.; le pétiole fait environ la moitié de la longueur totale; les frondules secondaires ont à peine 3, et la terminale 6 millim.)

Cette fougère est très-distincte de ses congénères; nous ne l'avons pas vue à l'état de maturité; la marge des frondules fructifères est réfléchie, un peu plissée et disposée pour recevoir les sporanges; le rhizome est rampant et les frondes y sont réunies en faisceau.

† 7. SUBSIMPLEX, F.

Frondibus subsimplicibus, longe petiolatis aut ternatis, linearibus, basi subcordatis, apice obtusissimis, petiolis fuscis, tenuibus, pilosis; sporotheciis continuis, marginem et apicem invadientibus; indusio spisso; sporangiis pyriformibus, annulo 44-48 articulato; sporis trigonis, nigrescentibus.

Habitat in Brasilia fluminensi (Serra do Couto); Glaziou, n° 3160 (1869).

Filix parva, radice fibrosa, frondibus opacis, lutescentibus.

ICON. : *Tab. IV, fig. 3.*

Cette fougère est des plus distinctes; nous n'avons rien à ajouter à ce que nous venons d'en dire; mais nous croyons devoir faire remarquer que le nombre des anneaux des sporanges, quand il s'élève aussi haut (44-48), peut fournir un caractère important pour la distinction des espèces, et c'en est ici un exemple remarquable.

25. DORYOPTERIS, J. Sm., *in Hook. Journ. bot.*, IV, p. 162.

1. SAGITTIFOLIA, Radd., *Fil. Bras.*, p. 43, *sub pteride*, t. 63, f. 1. *Doryopteris*, J. Sm., *Cat. Kew. ferns*, p. 4. Mandiocca, Radd.; Rio-Janeiro, Burchell, n° 2051; Gardner, n° 36, et Glaziou, n°s 940, 1739, 2305, 2306 et 2307. — Parmi ces derniers spécimens, recueillis à Pétropolis, il en est qui mesurent jusqu'à 48 centim.

2. HASTATA, Radd., *Filic. Bras.*, p. 43, t. 63 f. 2, *sub pteride. Doryopteris*, J. Sm., *l. c. Doryopteris sagittata*, Hook., *Sp. filic.*, p. 207, var. *hastata*. — La figure donnée par Raddi reproduit certainement une espèce distincte de la précédente. Serra os Orgaos, Gardner, n°s 150 et 151. (N. V.)

3. RADDIANA, F., *Gen. filic.*, p. 133. *Pteris varians*, Raddi, *Filic. Bras.*, p. 44, t. 64, f. 1 et 2, et *P. collina*, *ejusd.*, *l. c.*, p. 44, t. 65, fig. 1 et 2. *Pteris pedata*, Langsd. et Fisch., *Filic.*, p. 17, t. 20. Rio-Janeiro, Gardner, n°s 37 et 5030; Guillot (Herb. F.).

Var. β *patula*. Très-grandes frondes, pouvant s'élever à plus d'un demi-mètre, avec des lames ayant près de 60 centim. de pourtour. Le pétiole est cylindrique, lisse, luisant, rougeâtre; les segments sont entiers, digités, acuminés, très-étalés et fructifiés dans toute l'étendue de leurs marges. Rio-Janeiro, Glaziou, n° 1740, et à Desterro, île Sainte-Catherine, par Alburquerque. — Peut-être est-ce une espèce distincte?

Var. γ *multipartita*. Elle est remarquable par le grand nombre de ses segments, qui sont pinnatifides et terminés par une longue pointe; elle est comme étagée, avec des marges entièrement bordées de sporothèces. Cette variété est fort belle. La figure 3 de la planche 65 de Raddi, *l. c.*, à proportions un peu plus petites, donne une idée assez exacte de cette plante, récoltée à Rio-Janeiro par M. Glaziou, sous le n° 1741. M. H. Gauthier nous l'a envoyée de Desterro, île Sainte-Catherine.

NB. Le *Doryopteris pedata* (*Pteris pedata* des auteurs) se perd au milieu des formes de l'espèce précédente.

26. LITOBROCHIA, Presl., *Tentam. pterid.*, p. 118, *Emendat.*

1. SPLENDENS, Klfss., *Enum.*, p. 186, *sub pteride; Litobrochia*, Presl., *l. c.*, p. 149; Brésil, dans les bois. Chamisso; Freyreis; Beyrich; Sellow, Os Orgaos, n° 144,

et Arrial, Minas-Geraes, par Gardner, n° 5300. Glaziou, Rio-Janeiro, à Saint-Louis, n° 1744. Pedra do Couto (1869), n° 3161. — Cette fougère est fort belle, très-glabre, luisante, de consistance sèche et comme papyracée. Les frondules se terminent par une pointe dentée en scie; les nervilles, qui sont en relief, forment des mailles à 4, 5 ou 6 pans; celles de la marge ne diffèrent pas sensiblement des autres, de sorte que la nervation rappelle bien plutôt celle du *Nevrocallis* ou de l'*Hymenium crinitum* que celle des *Litobrochia*. La physionomie de cette plante est très-spéciale et nulle description ne saurait en donner une idée exacte. La base des grandes pinnules subit un temps d'arrêt de développement dans la moitié inférieure, qui se termine à 2 centim. de son point d'attache; tandis que la moitié supérieure s'en rapproche de 7-8 millim. C'est bien là le *Pteris splendens* de Kaulfuss. M. Agardh, qui l'accepte, semble avoir eu sous les yeux une autre plante et peut-être un *Heteronevron*. Les mots *pinnis patentibus; venæ in costa fere verticales; basales fere æque longæ, singulas vel non ultra binas areas secundanas sustinentes,* ne peuvent, en aucune manière, se rapporter à notre plante.

† 2. PRÆALTA, F.

Fronde elongata, pinnata, basi bipartita; petiolo rachique purpurascentibus; frondulis lanceolatis, glaberrimis, basi cuneatis, vix petiolatis; apice longe acuminato, serrato; areolis hexagonoideis, æqualibus; mesonevro purpureo; fertilibus angustioribus et longioribus; marginibus ad exclusionem apicis, omnino fructiferis; indusio fusco, crassiusculo; sporangiis pyriformibus; annulo lato, 20-24 articulato; sporis trigonis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2304).

Filix gigantea, pinnulis extensis, petiolo, rachi et mesonevris kermesinis.

ICON.: *Tab. XI, fig. 2.*

(Longueur totale, 1.50 à 2 mètres. Nous avons un pétiole qui seul mesure 1.20 et qui atteint la grosseur du doigt d'un enfant; la base, un peu recourbée, est rude au toucher; les frondules inférieures, bipartites, mesurent 25 centim., sur un peu moins de 3 centim. de largeur; les autres vont jusqu'à 30, sur 2 seulement; nous en comptons huit paires, y compris la frondule bifide, séparées par un entre-nœud de 3 centim.)

Très-belle espèce, très-distincte par son port, ses dimensions, la longueur des frondules et la couleur pourpre de toutes les parties fondamentales, pétiole, rachis et mésonèvre; le rhizome est rampant; le pétiole rude à la base et sillonné; les grands spécimens de cette fougère doivent dépasser 2 mètres.

3. BRASILIENSIS, Radd., *Filic. Bras.*, p. 47, t. 68 et 68², *sub pteride; Litobrochia*, Presl., *l. c. Pteris serrata, Fl. flumin.*, XI, t. 82. Rio-Janeiro; Gardn., nos 34 et 35; Martius, *H. Bras.*, no 332. Bahia, Blanchet. — Très-commune et très-répandue dans les herbiers. Frondes bipinnées, à frondules inférieures longuement pétiolées. Le pétiole est olivâtre, très-lisse; les derniers segments sont lancéolés et mucronés-dentés.

4. DENTICULATA, Sw., *Syn. filic.*, p. 97, *sub pteride; Pteris tristicula;* Radd., *Filic. Bras.*, p. 46, t. 69; *Litobrochia*, Presl., *l. c.* Rio-Janeiro (Herb. Vindob.); Blanchet (H. F.); Glaziou, nos 432 et 433. Ile Sainte-Catherine, H. Gauthier.
Var. β *pinnato-pinnatifida.* Glaziou, no 2315.

Cette espèce varie par des frondules plus ou moins larges, tendant soit à la forme linéaire, soit à la forme lancéolée.

5. LEPTOPHYLLA, F., *Gen. filic.*, p. 135; Sw., *Act. Holm.*, 1817, p. 70!! *sub pteride, teste* Agardh, *Monog.*, p. 57; *P. spinulosa*, Radd., *Fil. Bras.*, p. 47, t. 70 et 70². Brésil, Claussen; Raddi; Gardner, no 32; Sellow; Glaziou, nos 429 et 2057. — Les nervilles forment des anastomoses, mais elles ne sont pas universelles. La plante a un facies agréable; elle est élégamment découpée.

6. GIGANTEA, Willd., *Filic.*, p. 381; Kze., *Fil. Pœpp.*, p. 75. Glaziou, Serra os Orgaos, no 2806? — Grande espèce, bi ou tripinnée, à frondules primaires glabriuscules, bifides, très-grandes, terminées en une longue pointe; rachis proéminents, gramineux, parfois rougeâtres; segments, les uns obtus et les autres aigus, séparés par de larges sinus; les segments fructifères sont acuminés.

7. DECURRENS, Radd., *Fil. Brasil.*, p. 48, t. 69²; *sub pteride, Litobrochia*, Presl., *l. c.*, p. 149. Brésil, Rio-Janeiro, Raddi; Gardner, no 153; Gaudichaud; Claussen, nos 106 et 2106; Glaziou, nos 434, 2056 et 2311; île Sainte-Catherine, H. Gauthier. — Espèce très-distincte, très-commune et très-répandue dans les herbiers; elle atteint jusqu'à un mètre avec des frondules dressées qui ne dépassent pas 20 centim.

8. BIFORMIS, Splitg. Kze., *Linn.*, t. XXI, p. 217; *Campteria Luschnathiana*, Klotz., *Filic. Luschn.*, no 9 (H. F.); Bahia, Luschnath; Blanchet, à la Jacobine. — Port de l'espèce précédente, dont elle diffère par une décurrence peu marquée des

segments plus arqués et des frondules portées sur un assez long pédicelle, très-délié.

† 9. HORIZONTALIS, F.

Fronde magna, glaberrima, tenera, basi bipartita; frondulis oblongo-lanceolatis, apice longissimo et obtusiusculo; segmentis horizontalibus, lanceolatis, alternis, sinubus latis, marginibus eleganter crenulatis; rachibus helveolis, lævibus, flavescentibus; sporotheciis interruptis; indusio tenui.

Habitat in Brasilia fluminensi; (Glaziou, n° 2314).

Filix magna, tenera, segmentis horizontalibus, superne crenatis, inferne integris.

ICON.: *Tab. XII, fig. 1.*

(Longueur de la plus grande frondule, divisée à la base, 50 centim.; les segments au centre, 9-10 centim. sur 12-13 millim.; les sinus, 9-10 millim.)

Nous ne possédons pas cette plante entière, mais les fragments que nous en avons la caractérisent suffisamment; les marges sont élégamment crénelées, un peu obtuses; le sommet très-allongé est caudiforme. Elle doit prendre place parmi les très-grandes espèces.

† 10. SERICEA, F.

Frondibus pinnato-pinnatifidis, basi divisis; rachi debili, supra bicanaliculato, piloso; frondulis lanceolatis, caudatis, basi decurrentibus; segmentis obtusissimis, ciliatis, sericeis, inæqualibus, margine usque ad dimidiam partem dentatis; areolis costalibus elongatis, angustis, intermediis parvulis; nervillis apice liberis; frondulis fertilibus sessilibus, decurrentibus, pectinatis, in cauda fertili terminatis; segmentis oblongis, aliquando inferne pinnatifidis, inæqualibus; sporotheciis apicem et marginem omnino cingentibus; sporangiis ovatis, annulo lato; sporis trigonis.

ICON.: *Tab. XI, fig. 3.*

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n°s 1745 et 2312. 1868).

(Longueur totale : 1 mètre; frondules intermédiaires, 22-25 centim. de longueur sur 8 centim. d'envergure; les segments sont inégaux, ceux de la partie supérieure de la frondule sensiblement plus petits; ils mesurent en moyenne 5-7 centim. sur 9-11 millim. de largeur.)

C'est une grande espèce, pédiaire à la base, de laquelle se détache un long appendice qui semble naître de la frondule inférieure. Des poils soyeux, strigilleux et un peu luisants la recouvrent dans toutes ses parties, aussi bien en dessus qu'en dessous; la côte moyenne des frondules en montre de bien plus longs. Cette

espèce est remarquable par la souplesse de toutes ses parties et l'inégalité de ses segments, les supérieurs étant sensiblement plus petits.

†11. ANGUSTATA, F.

Frondibus bipinnatis, glaberrimis, petiolis flaccidis, rachibus et mesonevris glabris, stramineis, siccitate brunneis; frondulis pinnatifidis, in ambitu oblongis, segmentis fertilibus angustioribus, acuminatis, remotis, basi decurrentibus, sinubus latis; segmentis sterilibus, magis approximatis, lanceolatis, basi contractis, margine repandis, apice denticulatis; nervillis scalpturatis; sporotheciis angustis, universalibus; indusio tenui; sporangiis ellipticis, annulo 20 articulato; sporis vitreis, satis magnis et triedricis.

Habitat in Rio-Janeiro (Glaziou, nos 2149 et 2310).

Filix ampla, glaberrima, segmentis remotis, decurrentibus, acuminatissimis.

ICON. : *Tab. XI, fig. 1.*

(Longueur totale, 1 m., dont le pétiole fait la moitié. Pinnules latérales, 40 centim., portant 10-12 paires de segments linéaires, mesurant 12-13 centim. sur 9-11 millim. de largeur; les sinus ont environ 2 centim. d'ouverture.)

C'est une grande espèce, ayant le port du *L. Mexicana;* elle est dressée, souple, lisse; les segments s'unissent les uns aux autres par des décurrences qui se terminent en pointe; les nervilles, très-déliées dans les segments fructifères, sont plus en relief et plus grosses dans les frondes stériles.

†12. VARIANS, F.

Frondibus basi subpedatis, apice abrupte pinnatis; frondulis pinnato-pinnatifidis, segmentis fere usque ad costam liberis, patulis, apice leviter contractis, dentatis, basi decurrentibus; sterilibus oblongis, obtusis aut acutis, inferne contractis, sinubus amplis; sporotheciis fulvis, apice sterili; sporangiis oblongis, sporangiastris (glandulis?) mastoideis, flavidulis intermixtis, annulo lato, 24-28 articulato; sporis trigonis, in centro depressis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, no 2472).

Filix variabilis, pedata, marginibus cartilagineis, apice serrata.

ICON. : *Tab. XII, fig. 2.*

(Longueur de la plus grande pinnule : 40 centim., avec des segments qui atteignent presque la marge pour former de larges sinus; ces segments varient de longueur, sans excéder 7-8 centim. sur 8 millim. de largeur.)

Cette plante est polymorphe et varie par la dimension des frondes et celle des frondules qui s'y attachent; elle se termine brusquement par 7-8 segments entiers assez courts et à nervilles libres. C'est la seule espèce qui présente, à notre su, des sporangiastres, sortes de glandes mastoïdes, jaunâtres, mêlées aux sporanges; les spores, déprimées au centre, ont une surface comme plissée.

13. ACULEATA, Sw., *Syn. filic.*, p. 100, *sub pteride. Polypodium spinosum,* L., *Sp. pl.,* 1554; Plumier, *Filic.*, p. 6, t. 5 et 11; Brésil, Sellow. — Fougère arborescente, stipe court de la grosseur de la cuisse, haut d'un mètre et aiguillonné. Les frondes sont très-robustes; les frondules se terminent en une longue pointe. Nous ne l'avons pas vue provenant du Brésil.

14. POLITA, Lk., *Hort. Berol.*, p. 30? *sub pteride;* Agardh, *Monogr.*, p. 65; Brésil, Rio-Janeiro, Glaziou, n° 2309. — La fronde stérile est ample, à frondules presque opposées, se recouvrant par leurs extrémités; segments légèrement arqués, dentés en scie au sommet, à pointe très-large, anguleuse; consistance flexible.

15. BIAURITA, L., *Sp. pl.*, p. 1534, *sub pteride; Pt. nemoralis,* Willd., *Filic.*, 386; *Litobrochia,* F.; *Campteria Rottleriana,* Presl., *Tentam. pterid.*, p. 14, t. 5; Plumier, *Filic.*, tab. 15; Brésil, Arayos, Gardner, n° 4076; Glaziou, n° 435; Rio-Janeiro. — Frondes très-amples. Les nervilles de la base sont les seules qui soient anastomosées. Le stipe est lisse et stramineux.

16. ELEGANS, Sw., *Act. Holm.*, 1817, p. 70, *sub pteride.* Var. α *Brasiliensis,* Ag., *l. c.*, p. 76; *Litobrochia,* F.; Brésil, Freyreis; Rio-Janeiro, Glaziou, n° 2316. — Rachis purpurescents; frondules secondaires exactement opposées, ayant à la base une sorte de collerette formée de frondules courtes et sessiles.

17. PALLIDA, Presl., *Tent. pterid.*, 149; Radd., *Filic. Brasil.*, p. 49, t. 71; Brésil, Raddi, Minas-Geraes, Rio-Janeiro, Glaziou, n° 1742; île Sainte-Catherine, H. Gauthier. — Frondes tripinnées, à segments arrondis; indusium et sporothèces fort étroits.

NB. Le *L. papyracea,* F., *Gen. fil.*, p. 136, indiqué seulement comme espèce américaine, serait très-probablement brésilienne, M. Gardner, qui l'a récolté, n'ayant exploré que le Brésil. (*Voy.* Hook., *Spec. filic.*, II, p. 212.)

27. LONCHITIS, L., *Gen. pl.*, n° 1177. *Emend.*

1. MACROCHLAMYS, F., *Gen. filic.*, p. 142; Blanchet, Brésil, sans autre indication. — Grande espèce, de couleur cendrée, tomenteuse; l'indusium est extrêmement épais et comme crépu.

2. LINDENIANA, Hook., *Sp. filic.*, II, p. 56, t. 89 A. Rio-Janeiro, Glaziou, n° 2313? — Grande espèce velue, à poils strigilleux; le pétiole est couvert d'assez longs poils qui le rendent rude au toucher; nous n'avons cette plante que stérile.

NB. Ce groupe a des espèces dans toutes les régions de la terre. Ce sont, en général, de grandes plantes, robustes, presque toujours pluripinnées. Le Brésil a 41 ptéridées, réparties en 5 genres, les Antilles 34 et 7 genres, le Mexique 33 et 5 genres. Les genres *Heterophlebium* et *Onychium* ne se trouvent qu'aux Antilles et l'*Amphiblestra* est seul mexicain. Sauf ces courtes remarques il est facile de voir que dans ces trois grandes régions le type ptéridoïque n'est nulle part prédominant. Ce groupe n'est représenté en Europe que par deux espèces, les *P. Cretica*, L., et *P. aquilina*, L.

VIII. CHEILANTHÉES.

28. ADIANTOPSIS, F., *Gen. filic.*, p. 145.

1. DICHOTOMA, Poir., *Encyc. meth. supp.*, I, 143, *sub adianto. Adiantopsis*, Th. Moor., *Ind.*, p. 17. Brésil, in Th. Moor., *l. c.* — Frondes pluripinnées, rachis flexueux, glabre; frondules tantôt opposées, tantôt alternes; segments légèrement incisés, sous-trilobés, très-légèrement crénelés, convexes; sporothèces très-petits, recouverts par la marge.

2. RADIATA, L., *Sp. pl.*, 1556, *sub adianto;* Sw., Willd., Klfss., etc., *Adiantopsis*, F., *l. c.*, *Hypolepis radiata*, Hook., *Sp. filic.*, II, p. 72, t. 91 A. Martius, *Herb. Bras.*, n° 356; Pohl, Minas-Geraes et Rio-Janeiro (*Herb. Vind.*); même localité, Glaziou, n° 942; H. Gauthier, île Sainte-Catherine. — Très-répandue dans les Antilles et dans toute l'Amérique tropicale.

3. MONTICOLA, Gardn., in Hook., *Icon. pl.*, t. 487, *sub cheilanthe; Adiantopsis*, Th. Moor., *Ind.*, p. 18; *Hypolepis Gardneri;* Hook., *Sp. filic.*, II, p. 74; t. 92 B. Brésil, Gardner, n° 3557. — Petite plante simplement pinnée, frondes

portées sur une petite souche; elles y sont presque sessiles; les frondules sont auriculées vers le haut, obtusiuscules au sommet; les sporothèces ont un indusium en forme de fer à cheval.

4. SPECTABILIS, F., *Gen. filic.*, p. 145. *Cheilanthes chlorophylla*, Kze., *Linn.*, XXIII, p. 243, *C. Brasiliensis*, Radd., *Fil. Bras.*, p. 60, t. 75, f. 2. Brésil, Gardner, n° 5296, et par le même, Serra os Orgaos, n° 198; Rio-Janeiro, Glaziou, n° 1758. — Ce spécimen est au moins une variété. Il est plus rude, et ses frondes, d'un vert sombre, ne sauraient lui mériter l'épithète de *chlorophylla;* nous en faisons une variété *fluminensis.*

5. OBTUSISSIMA, F.

Frondibus extensis, bipinnatis, oblongis, petiolo longo rachibusque ferrugineis, pilosis; frondulis primariis lanceolatis, pinnatis, breve petiolatis, alternis, curvatis; frondulis secundariis ovatis, superne gibbosis, obtusissimis, margine superiori undulato et inferne integerrimo, basi leviter cuneato; frondula terminali angulata; sporotheciis marginem et apicem frondularum circumdantibus, rubris, conniventibus; indusio tenuissimo; sporangiis oblongis, annulo 14-16 articulato, sporis trigonis, seu obscure triedricis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 2321).

Filix extensa, surculo erecto, fibrilloso; sporangiis rubris, marginatis.

ICON. : *Tab. XIII, fig. 1.*

(Longueur totale, 50 centim.; des frondules, 8-10 centim. sur 2 centim. d'envergure; le pétiole mesure 20-22 centim.; l'entre-nœud est de 4 centim.)

Cette espèce est nettement caractérisée; elle a le port d'un *Adiantum* et le pétiole est couvert de poils courts d'apparence pulvérulente, comme dans l'*A. pulverulentum* et espèces voisines; la bordure que forment les sporothèces, qui sont rubescents, lui donne un aspect agréable.

29. HYPOLEPIS, Bernh., Presl., *Tentam. pterid.*, p. 161.

1. REPENS, L., *Spec. pl.*, 1536, *sub lonchitide; Hypolepis*, Bernh., Presl., *l. c.;* Hook., *Spec. filic.*, p. 64, t. 90 B, et *auct. plur.*, Ilheos, Moricand, n° 2460; Serra os Orgaos, Gardn., n° 199; Martius, *Herb. Bras.*, n° 382; Rio-Janeiro, Glaziou, n° 2154. — Espèce très-répandue sous l'équateur et les tropiques.

2. PARVILOBA, F.

Frondibus tripinnatis, glaberrimis; rachibus armatis, spinis sparsis, brevibus; frondulis primariis extensis, dilatatis, oblongis; secundariis lanceolatis, in acumine longo crenato terminatis; tertiariis patentibus, linearibus, pinnatifidis, lobis ellipsoideis, oppositis; sporotheciis marginantibus, nudis, 3-4 seriatis; sporangiis rotundis, annulo 14-16 articulato; sporis ellipsoideo-reniformibus, leviter papillosis.

Habitat in Brasilia, prope San-Gabriel, Rio-Negro (Spruce, n° 2119).

Filix diffusa, spinis brevibus armata.

ICON. : *Tab. XX, fig. 1.*

(Longueur, 1 mètre et plus.)

Cette espèce se rapproche de l'*H. repens*, L.; elle est plus délicate, et ses lobes fructifères, quoique beaucoup plus petits, sont chargés d'un plus grand nombre de sporothèces.

3. DICKSONIOIDES, F., *Hist. foug. et lycop. des Antill.*, p. 28, t. 21, f. 1, *in textu H. delicatula.* Rio-Janeiro, Glaziou, n° 2380. — Fougère délicate, flexueuse, à pétioles et à rachis âpres au toucher; les frondes sont très-amples et surdécomposées.

† 4. SERRATA, F.

Parva; frondibus glabris, fasciculatis, in ambitu oblongis; frondulis primariis pinnatifidis, segmentis linearibus, argute serratis, apice aristatis; petiolo lævi, rubescente, surculo erecto; sporotheciis marginantibus; indusio ovoideo, tenui; sporangiis rotundis, annulo crasso, 12-14 articulato; sporis rotundis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n°s 929 et 2336).

Filix delicatula, siccitate fragilis, glabra; surculo fibrilloso.

ICON. : *Tab. XIII, fig. 3.*

(Longueur, 7-8 centim. sur 2 d'envergure.)

Cette plante diffère par le port de toutes ses congénères; elle est délicate, inerme, glabre; les frondes sont en assez grand nombre et se développent au sommet d'une petite souche dressée, ayant 6-8 millim. de hauteur. Nous la mettons avec doute parmi les *Hypolepis;* elle en a tous les caractères par les organes de la reproduction: indusium marginal, membraneux, ovoïde, spores arrondies, etc. Les segments sont dentés et terminés par une pointe aristée.

30. MYRIOPTERIS, F., *Gen. filic.*, p. 148.

1. PALEACEA, F., *l. c.*, p. 149. *Cheilanthes elegans*, Desv., *Berol. mag.*, V, 328. *C. lentigera*, Presl., *Reliq. Haenk.*, I, 65. *C. paleacea*, Mart. et Gal., *Foug. mexic.*, t. 21, f. 2. Le *Myriopteris marsupianthes*, F., est, contrairement à l'avis de M. Th. Moore, *Ind.*, p. 239, absolument différent. Brésil, Blanchet, n° 512.

31. CHEILANTHES, Sw., *Syn. filic.*, t. III, fig. 5-7.

1. FLEXUOSA, Kze., *Linn.*, XXII, p. 578; Hook., *Spec. filic.*, II, p. 104. Brésil, Cap Goyan, Pohl, Ried. — Frondes tri- et quadripinnées, raides, coriaces, pubescentes, ovales-oblongues, acuminées.

   Var. β *minor*. Hook., *l. c.* Minas-Geraes, Regnell, II, 320. (N. V.)

† 2. GLABERRIMA, F.

Frondibus lanceolatis, glaberrimis, petiolo longo, rachibusque nudis, rubescentibus; frondulis pyramidatis, acutis, sessilibus, inferioribus bipinnatis, intermediis pinnatis, apicilaribus simplicibus, subrotundis, segmentis oblongo-rotundis, obtusissimis, fertilibus marginibus anguste revolutis; sporotheciis 1-2, indusiatis, indusio lato, hippocrepidiformi, tenuissimo, persistente; sporangiis magnis, oblongis, annulo 24-28 articulato; sporis globulosis, crassis, papillosis.

Habitat ad urbem Desterro *in insula* Santa-Catharina (H. Gauthier).

ICON. : *Tab. XIII, fig. 2.*

(Longueur totale, 55 centim., dont le pétiole fait les 2 cinquièmes; frondules centrales, 5-6 centim. sur 2 centim. d'envergure à la base; le pétiole a le diamètre d'un gros fil.)

Cette plante a quelque analogie avec les *C. microphylla* et *micromera;* mais notre espèce est complétement glabre; les frondules primaires sont dressées, alternes, sessiles, séparées les unes des autres par un entre-nœud d'environ 2 centim.; elles portent un grand nombre de frondules de second ordre (24 et plus), qui s'élargissent du sommet à la base et se terminent par un segment ovoïde un peu plus grand que les autres.

3. MICROPTERIS, Sw., *Syn. filic.*, p. 126 et 324, t. 3, f. 5. *Adiantum micropteris*, Poir., *Encyc. supp.*, t. 1, p. 141. Brésil, Gardner, Goyaz, n° 3554. — Petite espèce bipinnée à la base, simplement pinnée au sommet; couverte de longs poils blanchâtres; les sporothèces sont marginaux et à demi recouverts par un étroit repli de la marge.

4. TWEEDIANA, Hook., *Spec. filic.*, II, p. 84, t. 96 *b*. Brésil méridional, près du Parana, par Tweedie. — Rhizome rampant, long pétiole, fronde lancéolée, à frondules de second ordre oblongues, élégamment crénelées.

5. GLANDULIFERA, F., *Gen. filic.*, p. 158 (*sub nomine specifico, glandulosa*). *Paesia viscosa*, A. Saint-Hilaire, *Voy. distr. Diam.*, I, p. 381. *Cat.*, B. 2, n° 2260. — M. Thomas Moore fait de cette plante une Dicksoniée; M. Mettenius un *Pteris;* c'est un véritable *Cheilanthes*. Les frondes sont tripinnées, abondamment couvertes de glandules. Les segments fertiles sont lobés; les sporothèces, cachés en partie par un repli de la marge, s'étendent sur toute la surface du lobe fructifère; l'anneau des sporanges porte de 16 à 18 articulations. Les spores sont trigones et non réniformes, ainsi que les représente M. Th. Moore (*Gen. filic.*, tab. 78 A). Elle est délicate et mesure jusqu'à 80 centim., dont le pétiole fait environ la moitié. Nous l'avons vue pour la première fois provenant de Claussen. Le nom spécifique de *glandulosa* ayant été déjà employé par Swartz, nous le modifions, sans changer le sens, en *glandulifera*, proposé par M. Th. Moore.

32. NOTHOCHLÆNA, R. Br., *Prodr.*, p. 145.

1. POHLIANA, Kze., *Herb.;* Hook., *Spec. filic.*, V, p. 118, t. 286. Brésil, Pohl, Serra do Natividade, Gardner, n° 3551. — Frondes bipinnées à la base et simplement pinnées au sommet. Les poils sont articulés.

2. RUFA, Presl., *Reliq. Haenk.*, I, p. 19; *N. ferruginea*, Hook., *2d Centur. of ferns*, t. 52; *Cheilanthes*, Willd. in Klfss., *Enum.*, p. 209; Brésil par Blanchet. — Frondes linéaires, pinnées, à frondules oblongues, obtuses, tomenteuses en dessous et à poils roux; le pétiole est pileux. La plante est raide de port et coriace.

3. ERIOPHORA, F., *Gen. filic.*, p. 159, t. XIII B, f. 3; Hook., *Centur. of the ferns*, n° 991; *N. palmatifida*, Kze., *Suites à Schkh.*, I, p. 148; Gardner, Brésil, Piohang, n° 2390. — Petite espèce, laineuse, à pétioles grêles, flexueux, assez longs; lames triangulaires, palmées. (Longueur totale, 6 centim.; lames, 1.5.)

33. JAMESONIA, Hook. et Grev., *Icon. filic.*, n° 178.

1. SCALARIS, Kze., in *Bot. Zeit.*, 1844, p. 738, et *Suites à Schkh.*, I, p. 167, t. 71 A; Brésil, Blanchet. — M. Hooker a réuni en une seule (*Sp. filic.*, V, p. 106)

toutes les espèces de *Jamesonia*, malgré les différences considérables qui les séparent. — Les frondes sont, avec le *Platyzoma*, de la famille des Gleichéniacées, les plus étroites de toutes les espèces pinnées connues. Les frondules orbiculaires et sessiles s'élèvent au nombre de plus de cent. Le rhizome est rampant.

NB. Ce groupe, composé de fougères délicates, divisées en lobes ténus, souvent villeuses et même laineuses, pourvues presque toujours d'un indusium spécial ou formé par un repli du lobe fructifère, semble avoir son centre de développement au Mexique, où 45 espèces ont été découvertes; elles sont réparties en 7 genres, parmi lesquels le seul genre *Cheilanthes* figure pour moitié. Le Brésil n'a que 19 espèces et les Antilles 12 seulement. L'Europe ne possède que 3 espèces de ce groupe, le *Cheilanthes fragrans*, Weeb. et Bert., de la région méditerranéenne, et les *Nothochlæna Marantæ*, R. Br., et *Plukenetii*, F.

IX. HÉMIONITIDÉES.

34. TRISMERIA, F., *Gen. filic.*, p. 164, t. 14 A.

1. ARGENTEA, F., *l. c.; Acrostichum trifoliatum*, L.; *Spec. pl.*, p. 1527 (*partim*). Brésil, Minas-Geraes, Pohl; Rio-Janeiro, chez M. Mariano, Glaziou, n° 2430. — Le *T. argentea* du Brésil et du Mexique, et le *T. aurea*, F., de Saint-Domingue, ne diffèrent que par la couleur de la matière céreuse pulvérulente qui recouvre la lame inférieure des frondules, et comme cette couleur peut être le résultat de circonstances accidentelles, âge, exposition, nature du terrain, on peut sans inconvénient les réunir. Malgré le nom de *trismeria* et de *trifoliatum*, les frondules sont bien plus fréquemment bifides que trifides.

35. NEVROGRAMME, Lk., *Spec. filic.*, p. 138.

1. TOMENTOSA, Lk., *l. c.*, p. 139; *Hemionitis tomentosa*, Radd.; *Filic. Bras.*, p. 8, t. 19; Brésil, Commerson (Herb. Labillard); Claussen, n° 242.
   α. Frondes simplement pinnées. Rio-Janeiro, Glaziou, n° 447, et île Sainte-Catherine, H. Gauthier, à Desterro.
   β. Frondes bipinnées. Brésil, Mart., *Herb. Bras.*, n° 358, Rio-Janeiro, Pohl, Gardner, n°s 14 et 4077, à Goyaz et à Rio-Janeiro.

2. RUFA, Lk., *Filic. sp.*, 138; *Gymnogramme rufa*, Desv.; *Berol. mag.*, 5, 304; *Hemionitis rufa*, Schkh.; *Crypt. Gew.*, p. 8, t. 17 et 21; Brésil, Spruce, n° 401. — Frondes pinnées, à frondes presque sessiles, ovales, cordiformes, obtusiuscules, peu nombreuses, étalées et distantes, couvertes de poils roux, ainsi que le stipe et les rachis.

NB. Ce petit groupe est fondé sur l'*Hemionitis palmata*, L., qui manque au Brésil. Quant au genre *Antrophyum*, type des Antrophyées, il se réduit à trois ou quatre espèces communes à presque toute l'Amérique tropicale.

X. ANTROPHYÉES.

36. ANTROPHYUM, Klfss., *Enum. filic.*, p. 198.

1. CAYENNENSE, Desv., Klfss., *l. c.*, p. 199 *in nota.* Kze., *Anal. pterid.*, p. 30, t. 19, f. 2: Spruce, Para, n° 31. — Frondes légèrement obliques, oblongues, lancéolées, aiguës, avec nervure médiane, glabre, terminée par un court pétiole; la marge est réfléchie et un peu ondulée; les sporothèces ne sont qu'à demi immergés.

2. LINEATUM, Klfss., *Enum. filic.*, p. 199; F., *Hist. des antrophyées*, p. 47; *Polytænium*, Desv., *Prodr.*, p. 218; Brésil, Gardner, n° 145; Rio-Janeiro, Glaziou, n°s 455, 1688 et 2803; Goyaz, dans les forêts de Matto-Grosso (*Herb. Vindob.*). — Frondes linéaires, avec une nervure médiane; sporothèces parfois interrompus.

3. SUBSESSILE, Kze., *Anal. pterid.*, p. 29, t. 19, f. 1; F., *Hist. des antroph.*, p. 47; *Herb. Bras.*, Martius, n° 369. — Frondes presque sessiles, lancéolées, munies d'une nervure médiane, acuminées au sommet et un peu obtuses; sporothèces à demi immergés, écartés, interrompus; elle est un peu opaque.

XI. LEPTOGRAMMÉES.

37. PTEROZONIUM, F., *Gen. filic.*, p. 178.

1. RENIFORME, F., *l. c.*, t. 16 A; *Gymnogramme reniformis*, Mart.; *Icon. crypt. Brasil.*, p. 88, t. 26; Martius, au mont Cupati, près la rivière de Japura. — Plante d'un port tout à fait spécial et très-bien caractérisée comme genre.

38. HECISTOPTERIS, J. Sm., *in Hook. Lond. Journ. botan.*, I, p. 139.

1. PUMILA, J. Sm., *l. c.* F., *Gen. filic.*, p. 179, t. 16 B. *Gymnogramme pumila;* Spreng., *Tent. supp. ad Syst. veg.*, p. 31; Kze., *Analect. pterid.*, p. 11, t. 8, f. 1. Para, Spruce, n° 5758. — Très-petite plante, à frondes simples, élargies au sommet, qui est déchiqueté; le rhizome filiforme est rampant; elle a un port tout spécial.

39. GYMNOGRAMME, Desv., *in Berol. mag.*, V, p. 505, *reductum et emend.*

1. ASPLENIOIDES, Sw.; Klfss., *Enum. filic.*, p. 80. *Ceterach aspidioides*, Radd., *Fil. Bras.*, p. 10, t. 21, f. 1. *Phegopteris,* Metten.; commune au Brésil. Raddi, Serra d'Estrella, dans les forêts; Rio-Janeiro, Glaziou, n° 930. — Plante assez délicate, à petite souche dressée, portant de 3 à 4 frondes longuement acuminées, à pétiole grêle, écailleux, à frondules inférieures écartées, lancéolées, étroites, profondément dentées, courtement pétiolées, souvent terminées par un petit mucron mousse.

2. POLYPODIOIDES, Spreng., *Syst. veg.*, IV, p. 40; Link, *Filic. sp.*, p. 136; *G. Linkiana,* Kze., Linn., XVIII, p. 310. *Phegopteris,* Metten. *Ceterach polypodioides;* Radd., *Filic. Bras.*, p. 10, t. 22. Au Corcovado, par Raddi; Gardner, n° 119. — Longues pinnules acuminées, amincies vers le bas en pétiole ailé; sporothèces linéaires, occupant la presque totalité du trajet des nervilles; les segments, un peu recourbés en faux, sont finement ciliés.

† 3. OPPOSITANS, F.

Frondibus pinnato-pinnatifidis, lanceolatis, pilis sericeis vestitis, apice et basi decrescentibus; frondulis sessilibus, oppositis, breve lanceolatis, patulis; inferioribus deflexis; ultimis remotis deformibus, parvis; sporotheciis laxissimis; sporangiis rotundis, annulo 20 articulato; sporis reniformibus.

Habitat in Brasilia, insula Santa-Catharina (H. Gauthier).

Filix pinnata, frondulis sessilibus oppositis notata.

ICON. : *Tab. XIV, fig. 1.*

(Longueur : 46 centim. sur 8 centim. d'envergure au centre.)

Le sommet se termine en pointe avec des frondules plus nombreuses et plus rapprochées; elles se dégradent en dimensions vers la base et ne sont plus que rudimentaires et de forme triangulaire. Les sporanges sont lâchement groupées en sporothèces.

† 4. ATTENUATA, F.

Frondibus pinnatis, patulis, glabris; frondulis lanceolatis, breve petiolatis, apice longe attenuatis; mesonevris angustis, supra et infra canaliculatis, villosulis fuscisque; segmentis ovatis, obtusissimis, tantum apice dentatis; nervillis curvatis, tenuibus; sporotheciis centralibus, linearibus; sporangiis crassis; annulo lato.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 1776).

Filix magna; frondulis opacis, alternis, nervillis curvatis, liberis.

ICON. : *Tab. XIV, fig. 2.*

(Frondules, 28-30 centim. de longueur sur 5 de largeur. Le rachis a la grosseur d'une petite plume d'oie; les segments (20-24 paires) ont 7-9 millim. de largeur; ils sont libres dans les trois quarts de leur longueur totale; les deux paires inférieures sont un peu plus petites.)

Cette fougère est de grande dimension, avec des points pellucides, visibles à la loupe. Les segments forment des sinus fort étroits, et les nervilles, qui décrivent des courbes, tendent à s'y rendre comme dans les *Goniopteris*, la pointe qui termine les frondules est presque filiforme.

5. PTEROIDES, F., *Gen. filic.*, p. 182. Brésil, par Vauthier (Herb. F.). — Les frondules sont découpées à la manière des *pteris;* elles se terminent par une queue fort longue, anguleuse et à marge entière; les nervilles sont simples, courtes, et se chargent d'une simple rangée de sporothèces, de faible adhérence.

† 6. PATULA, F.

Frondibus pinnatis, glabris; rachi helveolo, supra canaliculato; frondulis pectinatis, curvatis, distantibus, suboppositis, sessilibus, fere decussatis, apice caudato, obtuso; segmentis oblongis, suboppositis alternisque obtusissimis, marginibus integris seu irregulariter crenatis; nervillis liberis aut rarissime in parte superiori bifurcatis; sporotheciis laxis, margine approximatis, sæpe in bifurcatione nervillarum sitis; sporangiis crassiusculis, annulo 16 articulato, articulis prominentibus, sepimentis succinoideis; sporis lutescentibus, crassis, reniformibus, sinu dilatato.

Habitat in Brasilia fluminensi (Serra os Orgaos); Glaziou, n° 2822.

Filix aperta, glabra, frondulis sessilibus, pectinatis.

ICON. : *Tab. XIV, fig. 3.*

(Longueur des frondules, 20-24 centim. sur 4-4,5 d'envergure.)

Cette espèce, dont nous ne possédons que la partie centrale, a des frondules sessiles dont les segments inférieurs sont un peu plus petits que ceux du centre. Les nervilles simples, dans la plus grande partie de leur trajet, se bifurquent parfois vers le haut, et le sporothèce naît dans cette bifurcation.

7. EXPANSA, F.

Frondibus pinnatis, glabris; rachi helveolo; frondulis pectinatis, curvatis, distantibus, suboppositis; segmentis oblongis, obtusiusculis, margine crenatis, superne integris; nervillis tenuibus, pinnatis. Reliqua ut supra.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, *sine numero*).

Filix tenera, aperta, nervillis pinnatis.

ICON.: *Tab. XIV, fig. 4.*

(Longueur des frondules, 25 centim. sur 7 d'envergure.)

La nervation fait complétement différer cette espèce de la précédente, simple dans le *G. patula*, pinnée dans le *G. expansa*. Ici les frondules sont pinnées dans les deux tiers de leur étendue. Nous ne l'avons qu'à l'état stérile.

8. MYRIOPHYLLA, Sw., *in Kongl. Vet. Acad. Handl.*, 1817; Hook., *Spec. filic.*, p. 134. Brésil, Freyreis, Sellow; Gardner, nos 102 et 5922. (N. V.)

40. CEROPTERIS, Lk., *Filic. spec.*, p. 141.

1. CALOMELÆNA, Lk., *l. c.*, p. 141. *Gymnogramme calomelæna*, Klfss., *Enum.*, p. 76. Langsd. et Fisch., *Icon.*, p. 6, t. 3. Sainte-Catherine, H. Gauthier.

2. TARTAREA, Lk., *l. c.*, p. 142. Desv., *Berol. mag.*, V, 305, *sub gymnogrammate; Acrostichum*, Sw., Glaziou, Rio-Janeiro, n° 363.

3. DISTANS, Lk., *Filic. spec.*, p. 142. Brésil, Link, *l. c.* Martius, *Herb. Brasil.*, n° 188? — Frondes bipinnées; frondules inférieures sessiles, décurrentes à la base; toutes pinnatifides; segments dentés au sommet. C'est surtout par le port qu'elle se distingue du *C. calomelæna*.

41. ANOGRAMME, Lk., *Spec. filic.*, p. 137.

1. VILLOSA, F., *Gen. filic.*, p. 184; Claussen, Minas-Geraes, 1841 (H. F.). — Stipe sarmenteux, très-délié, rougeâtre, flasque à l'état de dessiccation, portant des poils courts; frondules alternes, longues, écartées, décomposées,

pétiolées ; rachis pileux, ainsi que les derniers segments, qui sont pinnatifides, à lobes étroits, bilobés. Plante très-grande, très-délicate, flexueuse, s'appuyant sur les plantes voisines pour se soutenir : elle est rare.

NB. Ce groupe n'est pas très-naturel. Les *Gymnogramme* sont des *Phegopteris* à sporothèces allongés ou diffus; les *Ceropteris*, des *Gymnogramme* à sécrétion résineuse, dans laquelle sont plongés les sporothèces; le genre *Anogramme* n'a pour lui que la délicatesse du tissu de ses frondules et son port très-spécial.

XII. ASPLÉNIÉES.

42. ATHYRIUM, Roth. Presl., *Tent. pterid.*, p. 97.

1. DECURTATUM, Presl., *l. c.*, p. 98, t. 3, fig. 3 (*nervatio*); *Asplenium, auct. var.;* Lowe, *Ferns*, V, t. 45; *teste* Kunze. (N. V.)

43. ASPLENIUM, L., *Spec. pl.*, 1558, *et auct. var.*

* *Frondes simples.*

A. *Une nervure marginale.* NEOTTOPTERIDASTRUM.

1. RADDII, F., *Gen. filic.*, p. 193. *Asplenium Nidus,* Radd., *Filic. Bras.*, p. 34, t. 53, *syn. excl.* Mandiocca et au Corcovado, Radd., *l. c.;* Rio-Janeiro, Glaziou, n° 422. — Cette belle espèce a été confondue par les auteurs avec l'*A. serratum;* elle en diffère par un caractère facile à constater : les nervilles latérales se rendent à la marge pour s'unir, comme dans les *Neottopteris*, à une nerville marginale, mais sans former des arcs, ce qui permet de la regarder comme génériquement distincte et formant un sous-genre très-naturel. La figure donnée par Raddi est très-exacte. Les frondes atteignent jusqu'à 1 mètre de longueur, sur 10 centim. de largeur; la marge est ondulée et les sporothèces n'occupent que la partie supérieure des frondes.

B. *Nervilles latérales n'atteignant pas la marge.*

2. CRENULATUM, Presl., *Tent. pterid.*, p. 106; Link, *Filic. sp.*, p. 87; F., *Gen. filic.*, p. 190; *A. serratum*, Mart., *Herb. Bras.*, n° 376; Rio-Janeiro, Glaziou, n° 2349. — La synonymie de cette plante est fort embrouillée, et c'est à tort qu'on la confond avec l'espèce précédente; la marge est entière et simplement ondulée dans ses trois quarts supérieurs, puis finement crénelée avec une

pointe acuminée. Il n'est point étonnant que l'on ait pris ces crénulations pour des dents.

3. ANGUSTUM, Sw., *Kongl. Vetensk. Acad. Handl.*, Stockh., 1817, p. 53; Spreng., *Syst. veget.*, IV, p. 80; Kze., *Analect. pterid.*, p. 21, t. 14; Brésil, Freyreis (*teste* Sw.). — Nous ne possédons pas cette espèce provenant du Brésil, mais nous l'avons en herbier de Surinam (A. Kappler, n° 183 *a*). La plante figurée par Kunze l'a été sur un spécimen de Cayenne. C'est une espèce assez délicate, à frondes linéaires, très-longuement acuminées. Il ne semble pas qu'elle ait été retrouvée au Brésil depuis Swartz. A. Kappler a édité sous le nom d'*A. angustum*, Willd., *forma latior*, n° 183*b* (Herb. F.), une espèce gigantesque qui mesure au delà de 1 mètre de longueur sur 10-11 centim. de largeur, laquelle n'a aucun rapport avec l'*A. angustum*, Sw. Nous en avons fait (*Gen. filic.*, p. 192) un *A. Surinamense;* en le réunissant à l'espèce de Swartz, on met en évidence la légèreté avec laquelle on traite souvent les synonymies.

NB. L'*A. longifolium*, Schrad., *Gœtt. Gel. Anz.*, 1827, 870, du Brésil (Kze., *Anal.*, p. 21 *in nota*) est une espèce mal connue qu'il suffit d'indiquer avec doute.

** *Frondes simplement pinnées.*

A. *Grandes formes.*

† 4. ESCRAGNOLLEI, F.

Frondibus pinnatis, glaberrimis, flexibilibus; petiolis rachibusque pallide viridibus; frondibus ovatis, remotis, cuneatis; petiolo rachique planiusculis, marginibus inæqualiter dentatis, dentibus remotis, in cauda longissima, undulata, sterili terminatis; tela cellularia translucida; nervillis tenuibus, furcatis, excurvatis, ramo superiori fertili, marginem non attingentibus, apicibus translucidis; nervillis remotis, tenuibus, apice turgidis, pellucidisque; sporotheciis longis, linearibus, obliquis, indusio tenui; sporangiis magnis, pedicello intestiniformi donatis; annulo lato, 20 articulato; sporis ovoideis, episporiatis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Saint-Louis, Glaziou, n° 1774, et Serra os Orgaos, n°s 2815? et 2816).

Filix flexibilis, frondulis quinque vel sex aut septem in quoque latere frondium, surculo crasso, squamoso, squamis late lanceolatis; variat latitudine frondularum.

Icon. : *Tab. XV.*

(Longueur totale, 60-80 centim. jusqu'au sommet de la frondule terminale; celle-ci, un peu plus grande que les autres et un peu plus étroite, mesure 20 centim. sur 3,2 de largeur; la pointe, amincie en queue, s'étend à 5 ou 6 centim.; les entre-nœuds sont séparés par un intervalle de 5 centim. environ.)

Cette espèce, l'une des plus belles du genre, est remarquable par sa grande souplesse; quoique les frondules soient très-grandes, le rachis et les pétioles sont très-étroits. Ces frondules s'allongent en une pointe linéaire qui fait la 5e partie de leur dimension totale; elles se terminent à la base en s'amincissant d'une manière régulière. Les sporothèces, au nombre d'une vingtaine de paires, sont assez distants et dressés; ils forment avec le mésonèvre un angle de 45°.

Nous dédions cette fougère à M. d'Escragnolle, qui aime et favorise les explorations botaniques et dans la propriété duquel elle a été trouvée.

† 5. CAMPTOCARPON, F.

Frondibus longe petiolatis, ambitu ovoideis, petiolo rachique planis; frondulis paucis 3-7, late lanceolatis, glabris, mesonevro latiusculo, helveolo, apice caudato, basi inæquilateralibus, latis, inferne abscissis, terminali longiori petiolata; sporotheciis satis brevibus, arcuatis, nervillam tenuem rami superioris occupantibus; sporangiis rotundis, pedicello longo; sporis subrotundis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2342, Serra os Orgaos).

Filix frondulis longiusculis, opacis, nervillis tenuibus, remotis, frondulis acuminatis, marginibus repandis, dentatis, dentibus brevissimis, remotis.

Icon. : *Tab. XVI, fig. 1.*

(Longueur totale, mesurée du sommet de la fronde terminale, 40 centim.; frondules terminales, 20 cent. sur un peu moins de 3 centim. de largeur; les latérales, légèrement arquées, sont d'un tiers plus petites.)

Cette espèce, quoique distincte, n'a pas de caractère spécial. Le spécimen qui sert de diagnose a les lames inférieures chargées de lichens épiphylles : *Porina Americana*, F.; *Pyrenula*, *Verrucaria* et *Lecidea*. La présence de ces parasites indique pour la plante une longue durée. Les frondules sont échancrées à la base et obliquement terminées.

6. OLIGOPHYLLUM, Klfss., *Enum. filic.*, p. 166; Spreng., *Syst. veg.*, V, p. 82; Metten., *Asplen.*, p. 139; Brésil, Gaudichaud, n° 235; Gardner, nos 172, 173, 5310; Rio-Janeiro, Glaziou, n° 2341; île Sainte-Catherine (Th. Moor.); au Corcovado, Glaziou, n° 925. — La marge des frondules est fortement ondulée,

avec quelques dents écartées; les nervilles se terminent avant qu'elles puissent l'atteindre; elles sont terminées par un renflement globuleux qui tache la lame supérieure au point correspondant. Le pétiole est fort long; les frondules, d'un vert intense, sont souvent recourbées en faux; elles ont vers la base une tendance manifeste à se diviser et portent parfois des sporothèces diplazioïdes.

B. *Frondes de grandeur médiocre, dentées ou crénelées.*

7. SALICIFOLIUM, L., *Sp. pl.*, 1538, *et auct. plurim.* Raddi, *Fil. Bras.*, p. 35, t. 50; *A. riparium*, Lieb., *Fil. Mex.*, p. 92; Hook., *Sp. filic.*, III, p. 119, t. 169; *syn. excl.;* Brésil, Gardn., n° 108; Martius, *H. Bras.*, p. 342; lady Calcott, Para, Spruce, n° 37; Glaziou, Rio-Janeiro, n°s 1654, 1771, 2064 et 2809.— Cette espèce varie par une marge plus ou moins ondulée et portant parfois des dents obtuses; le rhizome est rampant; elle noircit par la dessiccation et n'a aucun rapport avec notre *Aspl. Granatense*, avec lequel M. Hooker (*l. c.*) la réunit. Le nom spécifique semblerait indiquer une fougère à pinnules dont la base serait régulièrement amincie en coin, tandis qu'elle est fortement gibbeuse.

8. CIRRHATUM, Rich. *in Willd. Filic.*, p. 321. *A. mastigophyllum*, F., 8e *Mém.*, p. 83; Serra os Orgaos, Glaziou, n° 2808. — Cette espèce est facile à reconnaître à son rachis, qui se prolonge en un très-long filament (*cirrha*), parfois prolifère à son extrémité. On la trouve fréquemment à la Guadeloupe.

9. GIBBOSUM, F., *Gen. filic.*, p. 195. *Ejusd. Hist. Foug. Antill.*, p. 33; *A. auriculatum*, Hook., *Sp. filic.*, III, p. 118, t. 171; *syn. excl.*, *non* Swartz *nec* Radd., Rio-Janeiro, Glaziou, n° 2345. — Les crénulations sont très-marquées; les auricules s'imbriquent avec la marge.

10. ANISOPHYLLUM, Kze., *in Linnæa*, X, p. 511; F., *Gen. filic.*, p. 191; Brésil, Gardner, 5942 et 5964 (5494, Th. Moor., *Ind.*). — M. Hooker, *Sp. fil.*, III, p. 112, a figuré une variété *latifolium*, t. 166, sur un spécimen d'Afrique, qui ne se rapporte en aucune manière à la forme de la pinnule donnée par M. Mettenius, *Aspl.*, p. 143, t. 4, fig. 12. C'est avec quelque doute que nous lui donnons place parmi les espèces brésiliennes.

† 11. STENOCARPON, F.

Frondibus glabris, petiolis rachique depressis; in ambitu ellipticis; frondulis

lanceolatis, acuminatis, leviter gibbosis, abscisso-cuneatis, crenatis, terminali hastato-cuneata; sporotheciis brevibus, ovoideis, indusio lato, tenui; sporangiis magnis, rotundis, annulo lato, 20 articulato; sporis ovoideis, late episporiatis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 1772).

Filix rigida, glabra, opaca, regulariter crenata.

Icon. : *Tab. XIX, fig. 1.*

(Longueur, 40 centim., dont le pétiole fait la moitié; frondules 6-8 sur 1,5 à 2 centim.; entre-nœud un peu moins de 3 centim.)

Cette fougère est établie sur un spécimen qui n'est fructifié qu'incomplétement; les sporothèces ovoïdes, munis d'un large indusium, la feront facilement reconnaître; les frondules sont amincies en un assez long pétiole, plus long encore pour la terminale. Nous en comptons de 5 à 7 paires.

12. AURICULATUM, Sw., *Vet. Acad. Handl. Stockh.* 1817, p. 68; *A. semicordatum*, Radd., *Filic. Bras.*, p. 36, t. 52, f. 1; *A. pimpinellifolium*, F. et Schaffn., 7e *Mém.*, p. 52, t. 25, f. 5, *non* F., *Hist. foug. Antill.*, p. 36; Brésil, Raddi; Gardner, n° 161. — Beaucoup d'*Asplenium* sont auriculés et gibbeux; ce nom n'a donc rien de caractéristique spécifiquement, celui de *semicordatum*, donné par Raddi, eût été mieux appliqué.

13. MACRODON, F., 10e *Mém.*, p. 28. — Plante robuste à stipe et à rachis déprimés et d'un vert livide; frondules nombreuses, rapprochées, très-obtuses, à grosses dents, assez longues; elles se terminent en coin et sont gibbeuses vers la partie supérieure.

14. HARPEODES, Kze., *Linn.*, XVIII, p. 329; *A. pendulum*, F., *Gen. filic.*, p. 196, et 8e *Mém.*, p. 120; Rio-Janeiro, Glaziou, n° 1769. — Frondules légèrement arquées, crénelées-dentées; auricules à sporothèces diplazioïdes.

15. FALX, Desv., *Prodr.*, p. 274; F., *Gen. filic.*, p. 191, t. 17 C, f. 2 (une pinnule). Brésil, Para, Spruce, n° 38. Pohl. — Nous n'avons pas vu cette plante provenant du Brésil, et nous ne pouvons décider si elle y existe en effet. Elle n'a été figurée que partiellement, et sa synonymie est très-confuse dans les auteurs; c'est là ce qui nous a décidé à la réduire, au nom spécifique de Desvaux.

16. REGULARE, Sw., *Vet. Act. Handl. Stockh.*, 1817, p. 67; F., *Gen. fil.*, p. 191; Mart., *Herb. Bras.*, n° 340, et la var. *brevisorum*, n° 341; Glaziou, Rio-Janeiro, n° 416. — Espèce voisine de l'*A. Brasiliense*, Radd., avec laquelle plusieurs auteurs la réunissent; elle en diffère par des pinnules très-obtuses, peu ou point auriculées, à marge finement crénelée; à sporothèces courts, ovoïdes dans la variété *brevisorum*. Le rachis est ailé vers le haut. Les frondules inférieures ne se dégradent pas en dimension et conservent leur forme.

17. BRASILIENSE, Radd., *Fil. Bras.*, p. 36, t. 51, f. 1; Lk., *Fil. sp.*, p. 91, *et auct. var.* — Cette fougère est indiquée comme très-commune au Brésil et elle est très-répandue dans les herbiers; cependant les spécimens que nous avons sous les yeux ne se rapportent pas, à une seule exception près, à la planche citée de Raddi. Nous avons reçu un spécimen, exactement conforme, de Rio-Janeiro, provenant de M. Glaziou, sous le n° 417. Les autres en diffèrent par des frondules plus ou moins écartées, plus ou moins gibbeuses et plus ou moins obtuses, à stipe plus ou moins long. Les frondes sont fasciculées à l'extrémité d'une souche dressée. Voici quelles sont les formes de notre herbier: — N° 1770, Glaziou, Rio-Janeiro, stipes fort longs, assez gros, frondules s'écartant de plus en plus vers le bas. — N°s 107 et 2107, Brésil, Claussen, Rio-Grande, frondules arquées, ayant une tendance manifeste à s'infléchir, et notablement crénelées; nous l'avons reçue de Sainte-Catherine. — N° 931, Glaziou, Serra os Orgaos, à souche dressée, longue, grosse comme le petit doigt; frondules presque dimidiées, assez courtes, étalées. Nous avons, en outre, de l'île Sainte-Catherine, un spécimen délicat, à crénulations écartées, lequel est prolifère au sommet. Dans toutes ces formes, les frondules inférieures s'infléchissent, diminuent de grandeur et prennent une forme arrondie, ce qui n'a pas lieu pour l'*A. regulare*.

18. PTEROPUS, Klfss., *Enum. filic.*, p. 170; Hook., *Sp. filic.*, III, p. 122, t. 177. Brésil, Mart., *H. Bras.*, n° 347. — Espèce délicate, souple, facile à reconnaître à son rachis fortement ailé par la décurrence du pétiole des frondules; elle a le port de l'*A. Brasiliense*.

19. FIRMUM, Kze., *Bot. Zeit.*, III, 283. *Ejusd.*, *Linn.*, XXIII, p. 304, *non* F., *Gen. filic.* Rio-Grande, Brésil mérid., Fox. — Plante non figurée, sur la validité spécifique de laquelle il est difficile de se prononcer.

20. ALATUM, H. B. Kth., *Nov. Gen. Amer.*, I, 14; Willd., *Filic.*, p. 319; Hook. et Grev., *Icon.*, n° 137; Gardner, Serra os Orgaos, n°s 670 et 5940. — Espèce très-remarquable et fort belle, que nous avons vue seulement figurée.

21. REPANDULUM, Kze., *Linn.*, IX, p. 65, et XXIII, p. 237; F., *Gen. filic.*, p. 191 et 192. *A. obtusifolium*, Lk., *Filic. sp.*, p. 88 (ex Kze., *l. c.*). — Espèce non figurée, que nous n'avons pas vue provenant du Brésil.

22. AURITUM, Sw., *Fl. Ind. occid.*, III, p. 1616; Schkh., *Crypt. Gew.*, p. 199, t. 130 *b et auct. var.* — Cette plante, extrêmement polymorphe, n'a aucun caractère spécifique tranché; aussi croyons-nous devoir nous borner à signaler les variations principales auxquelles elle est soumise.

A. Forme pinnée : Brésil, Ilheos (H. F., sans numéro); très-élancée; frondules écartées, dentées, obtuses.

B. Forme pinnée vers le haut, bipinnée vers le bas; frondules aiguës, sensiblement auriculées. *A. umbrosum*, Klfss., *Enum.*, p. 168; Glaziou, Rio-Janeiro, n°s 418 et 1766; Mart., *H. Bras.*, n° 348.

C. Segments des pinnules ovales obtus. H. Gauthier, à Sainte-Catherine, Serra os Orgaos; Glaziou, n° 2811.

D. Var. *obtusum*. Frondes bipinnatifides, presque jusqu'au sommet; frondules acuminées; lobes ovoïdes, pétiolés. Rio-Janeiro, Glaziou, n° 2063.

E. Frondes bipinnées, à segments arrondis-ovoïdes, de petite dimension; *A. macilentum*. Brésil, par Claussen, sans numéro. Serra os Orgaos, Glaziou, n°s 2812 et 2339.

F. Frondes pinnées, consistance épaisse; sporothèces occupant le sommet des segments, var. *crassum*. Glaziou, Rio-Janeiro, n° 1767.

Voy. *A. cuneatum*, Lmrk.

23. RHIZOPHORUM, L., *Sp. pl.*, 1549; Willd., *Fil.*, p. 334; F., *Gen. fil.*, p. 191. *A. cyrtopteron*, Kze., *Linn.*, XXXIII, p. 233 et 303; Metten., *Hort. Lips.*, p. 75, t. 10, f. 3-4. Brésil, Gardner, n°s 5308 et 5941. — La comparaison que l'on peut faire de l'*A. cirrhatum*, Rich. in Willd., *Fil.*, p. 321, ne permet pas de le réunir à l'*A. rhizophorum*, ainsi que le voudrait Mettenius.

24. SANGUINOLENTUM, Kze., *Herb.*; Metten., *Asplen.*, p. 98, t. 4, f. 10 (*pinnula*). Brésil, Beyrick. (N. V.)

25. Sellowianum, Presl., *Tent. pterid.*, p. 107; *Herb. Bras.*, *reg. Berol.*, n° 46, sans autre indication. (N. V.)

† 26. jucundum, F.

Frondibus pinnatis, lanceolatis, glabris, teneris; rachi alato, sursum anguste canaliculato; frondulis approximatis, patulis, inæqualibus, sessilibus, subdimidiatis, crenatis, apice longe caudatis, serratis, basi truncatis; sporotheciis ovoideis, 4-7, rubellis; indusio tenui; sporangiis fere rotundis, parvis; annulo 18-20 articulato; sporis lævibus, subreniformibus.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 1768).

Filix delicatula, flexibilis, translucens; rhizomate repente, filiformi.

Icon. : *Tab. XVII, fig. 1.*

(Longueur : 30 centim.; pétiole très-délié, mesurant 30 centim.; les plus longs segments atteignent 5 centim. sur 4 millim. de largeur; la pointe, qui est dentée, fait presque la moitié de la longueur totale des segments.)

Plante d'un aspect agréable, dilatée, à frondules très-rapprochées, terminées en une longue pointe dentée; ces frondules décroissent assez brusquement vers le sommet et d'une manière inégale. Le rachis est de couleur rougeâtre et très-lisse.

† 27. Serronii, Glaz.

Frondibus lanceolato-linearibus, pinnatis, glabris, pellucidis, petiolatis, apice in cauda fertili attenuata, terminatis; frondulis dimidiatis, approximatis, erectis, ovatis, cuneiformibus, sursum dentatis, margine inferiori integro; sporotheciis paucis, ovatis, rufescentibus; indusio tenui; sporangiis ovoideis; annulo 18-20 articulato; sporis ovatis, crassiusculis, episporiatis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 419).

Filix angusta, parvula; frondibus congestis; petiolo squamis cancellatis; surculo parvo.

Icon. : *Tab. XVII, fig. 2.*

(Longueur : 11-13 centim.; frondules, 9-11 millim.; pétiole, 3 centim.)

Cette espèce, qui a quelque analogie avec les *A. dentatum*, L., et *pulchellum*, Radd., est caractérisée par des frondes linéaires lancéolées, terminées par une longue pointe dentée, fructifère dans toute son étendue et par des frondules ovales, écartées, dimidiées, courtement pétiolées, dentées en scie, légèrement dressées et obtuses. Elle est destinée à rappeler le nom de M. le docteur Custodio Alves Serrâo, sur la propriété duquel, à la Gavia, cette plante a été récoltée.

28. PULCHELLUM, Radd., *Fil. Bras.*, p. 37, t. 52, f. 2; Kze., *Linn.*, IX, p. 66; Radd., Sierra d'Estrella, près de Mandiocca. Sainte-Catherine, Mors, n° 37.

Var. β *otites*, Lk., *Hort. Ber.*, II, 60; Metten., *Fil. Lips.*, p. 74, t. 9, f. 1-4. Rio-Janeiro, de Gestas. — Fronde linéaire; frondules dimidiées, obtuses et grossièrement crénelées.

Le type est souple, transparent et herbacé; il a quelque rapport avec l'*A. Serronii*, qui est plus grand, plus raide; à frondules très-obtuses, assez rapprochées, dressées, au nombre de 10 à 16, terminées en une longue pointe, à pétiole assez long, chargé d'écailles linéaires, cancellées. Dans l'*A. pulchellum*, plante beaucoup plus délicate, les frondules sont aiguës, étroites, ponctuées finement, étudiées à la loupe, portant seulement 2 ou 3 sporothèces, à rachis ordinairement squamuleux à la base; les écailles ne sont pas cancellaires.

C. FALCARIA; *consistance sèche; frondes raides.*

29. SERRA, Langsd. et Fisch., *Filic.*, p. 16, t. 19; Willd., *Filic.*, p. 312, *et auct.* Brésil, Langsd. et Fisch.; Serra os Orgaos, Glaziou, n° 2810; île Sainte-Catherine; H. Gauthier, 1868. — Espèce très-grande et très-robuste; marge garnie de dents inégales, raides et assez grandes. La station de cette fougère est fort étendue. Anneau des sporanges 20-24 artic.; spores très-grosses, papilleuses.

† 30. INCURVATUM, F.

Frondibus pinnatis, rigidis, curvatis, siccitate brunneis, squamosis; petiolo longissimo, sulcato, robusto; surculo magno, repente, squamis angustissimis, longis, acuminatissimis, cancellatis abunde vestito; fasciculis vasorum duobus tenuibus, parallelis peragratis; rachi squamoso, subquadrangulari; frondulis lanceolatis, intus curvatis, obliquis, superne rotundatis, petiolatis, apice longe acuminatis, æqualiter dentatis; nervillis scalpturatis, approximatis; sporotheciis centralibus, longiusculis, crassis, conniventibus, totam laminam invadientibus; sporangiis magnis, ovoideis, annulo 24-28 articulato; sporis ellipsoideis, papillatis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2340, Morro da Fazenda; 850^{m} *altitud.*).

Filix robusta, rigida, surculo pulvinato; frondulis curvatis, regulariter et breve dentatis.

ICON.: *Tab. XVIII, fig. 1.*

(Longueur totale, 70 centim. avec un pétiole de 30 centim.; frondules, 9 centim. sur 11-13 m.)

Cette espèce est très-bien placée à côté de l'*A. Serra;* ses formes sont très-régulières; les frondes sont obliques, courbées vers le bas, notablement pétiolées, arrondies vers la partie supérieure. Je compte près de 70 dents, ce qui indique un pareil nombre de nervilles; celles-ci en relief. Les sporothèces partent du mésonèvre, ils s'étendent sur toute l'étendue de la frondule et sont connivents; cette espèce est fort belle et parfaitement distincte.

31. PRÆMORSUM, Sw., *Prodr.*, p. 18, et *Syn. filic.*, p. 83; *A. cuneatum,* H. et Gr.; *Icon.*, n° 189, *non* Lmrk.; *A. laceratum*, Desv., *Prod.*, p. 278; Brésil, Gardn., n°s 181 et 5314; Claussen, n° 76; Glaziou, Rio-Janeiro, n° 2334. Synonymie extrêmement chargée.

D. *Frondes allongées pendantes.*

32. MUCRONATUM, Presl., *Delic. Prag.*, I, 178; Hook., *Icon. pl.*, t. 917 A; *A. lassum,* Radd.; *Fil. Bras.*, p. 37, t. 22², f. 4; Serra os Orgaos, Gardner, n° 162; Glaziou, Rio-Janeiro, n°s 420, 1765 et 2333; H. Gauthier, île Sainte-Catherine. — Espèce molle, ayant l'aspect d'un *Asplenium* de la section des *Darea;* elle peut atteindre jusqu'à 50 centim. de longueur; on la reconnaîtra facilement à ses frondules sessiles et décussées, dont les segments sont aristés.

*** *Frondules bi-tripinnées.*

33. SULCATUM, Lmrk., *Encyc. meth.*, II, p. 308. Desv., *Prod.*, p. 277; *A. auritum,* Sw., var. *bipinnatifidum*, Kze., P. Claussen, n° 117, 1842 (H. F.). — Nous réduisons à dessein la synonymie, tant celle qui est donnée par les auteurs nous semble incertaine. Le spécimen que nous avons sous les yeux correspond exactement à la description donnée par Lamarck et au spécimen de Bourbon, tel qu'il existe dans notre herbier. Cette plante est raide, lancéolée en son pourtour, tripinnée à la base; à segments notablement sillonnés; le pétiole est nigrescent, le rachis canaliculé. Le nom spécifique *sulcatum* est de tout point justifié par le caractère plus haut indiqué et déduit des segments.

34. CUNEATUM, Lmrk., *l. c.*, p. 309. Sw., *Syn. filic.*, p. 84, *et auct. plurim.; A. crenatum,* Desv., *Prodr.*, p. 279; Schkh., *Crypt. Gew.*, p. 73, t. 78; Brésil, Brackenridge; Rio-Grande, Para, Spruce, n° 8.

† 35. GASTONIS, F.

Frondibus glabris, virescentibus, in ambitu oblongo-lanceolatis; petiolis et rachibus canaliculatis; frondulis primariis curvatis, inferne bipinnatis,

superne tantum pinnatis, caudatis; frondulis secundariis cuneatis, late auriculatis, acutis, margine dentatis; sporotheciis paucis, tabacinis, indusio albidulo latiusculo; sporangiis parvulis, annulo angusto, 20 articulato; sporis ovoideis, aliquando leviter reniformibus, lævibus, brunneis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 1773; Sainte-Catherine, Mors, n° 40).

Filix magna, satis tenera; surculo parvo, squamis piliformibus fulvo-auratis onusto.

Icon. : *Tab. XIX, fig. 2.*

(Longueur totale, 80-90 centim.; frondules primaires inférieures, 18-20; frondules secondaires, 2,5 centim. sur 10-12 millim. de largeur à la base.)

Cette belle espèce, découverte à Pétropolis par le comte d'Eu, Gaston d'Orléans, méritait de lui être dédiée; elle est glabre, d'un vert cru, paucinervée, dentée dans toutes ses parties; les frondules primaires se terminent par une longue pointe étroite et ondulée; elle rappelle dans son ensemble la feuille de certaines ombellifères.

36. ANGUSTATUM, Presl., *Tentam. pt.*, p. 108; F., *Gen. filic.*, p. 191; *A. attenuatum*, Klfss.; *Enum.*, p. 174; Mart., *H. Bras.*, n° 345. — Espèce hétérophylle, lobée, crénelée, dentée; bipinnée seulement vers la base. Les lobes inférieurs portent quelques sporothèces diplazioïdes. M. Th. Moore en fait à tort une variété *b* de l'*A. sulcatum;* elle est spécifiquement très-différente.

† 37. CHÆROPHYLLOIDES, F.

Frondibus glaberrimis, tenerrimis, pellucidis, bi-tripinnatis; petiolo longo, depresso, rachi planiusculo; frondulis primariis petiolatis, acutis; frondulis secundariis abrupte terminatis, segmentis ultimis cuneatis, crenato-incisis; sporotheciis inversis, diplazioideis, linearibus, divergentibus, rufis; sporangiis rotundis; annulo 20-24 articulato; sporis ovoideis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2476; île Sainte-Catherine, Mors, n° 29).

Filix aspectu Chærophylli sativi referens, glabra; rachibus depressis.

Icon. : *Tab. XVI, fig. 2.*

(Longueur : 45 centim. Frondules primaires, à la base 10-12 centim. Les derniers segments, presque aussi larges que hauts, mesurent environ 15 millim.)

Cette fougère est fort molle et translucide; les segments sont dilatés, presque triangulaires, crénelés, dentés. Il existe, comme sur tous les segments auriculés, des sporothèces inverses, ces auricules n'étant autre chose que l'origine d'un nouveau lobe. Dans les vrais *diplazium* les sporothèces inverses sont opposés et connexes; ici ils sont écartés les uns des autres.

† 38. OVALESCENS, F.

Frondibus pinnatis, glabris, in ambitu ovalibus, petiolo rachique adiantinis, lucidis flaccidisque, frondulis primariis superne pinnatis, breve acutis; frondulis secundariis subsessilibus, superioribus ovalescentibus, crenatis, inferioribus lobatis; sporotheciis brevibus, remotis, tabacinis, centralibus; sporangiis rotundis, annulo 20-24 articulato; sporis ovoideis, late episporiatis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, nos 2474 et 2814, Serra os Orgaos).

Filix bipinnata, rachibus ad apicem frondularum alatis.

ICON.: *Tab. XVIII, fig. 2.*

(Longueur, 45-50 centim., avec des frondules qui mesurent 18 centim. Le pétiole, qui est déprimé et rougeâtre, fait la moitié de la longueur totale. Les frondules de 2e ordre atteignent à peine 3 centim. sur 13-15 millim. de largeur.)

Cette espèce est souple et facile à reconnaître à ses frondules de 2e ordre, toujours ovales dans la partie supérieure de la fronde et ondulées-lobées inférieurement; le pétiole et le rachis sont lisses, rougeâtres et luisants. Le rhizome est irrégulier, chargé des débris pétiolaires des frondes des végétations antérieures.

39. FRAGRANS, Sw., *Prodr.*, p. 130; *ejusd. Syn. filic.*, p. 84; *A. planicaule*, Lowe, *Ferns*, V, t. 10; *Tarachia*, Presl., *Epim. bot.*, p. 80. — L'*A. fragrans*, Schkh., *Crypt. Gew.*, p. 199, t. 130 *b*, dont on fait une variété de l'*A. præmorsum*, Sw., a été recueilli au Brésil par M. Glaziou, no 2335 (*statu juniori*), et par M. H. Gauthier, à l'île Sainte-Catherine.

40. PSEUDO-NITIDUM, Radd., *Filic. Bras.*, p. 39, t. 55; F., *Gen. filic.*, p. 191; Brésil, Vauthier, no 637; Gardner, nos 179, 180; Blanchet, no 2513? — Espèce triangulaire en son pourtour; frondules écartées, crénelées; pétiole mince et écailleux. Elle se rapproche de l'*A. ovalescens*, F.

E. DAREASTRUM.

† *Frondes pinnées.*

41. MONANTHEMUM, Sm., *Icon. ined.*, p. 73; Sw., *Syn. filic.*, p. 80; Metten., *Fil. Hort. Lips.*, p. 74, t. IX, f. 7-8 (2 pinnules), Sellow. (N. V.)

42. FORMOSUM, Willd., *Filic.*, 329, *et auct. plurim.;* Brésil, Gardner, n° 5313; Claussen, n° 59; Regnell, I, 487; Glaziou, Rio-Janeiro, n° 936. — Sporothèce unique à la base d'une frondule à base tronquée et à marge inciso-dentée.

†† *Frondes bi-, tri-, quadripinnées.*

43. FŒNICULACEUM, H. B. et Kth., *Nov. gener.*, I, p. 15; H. et Grev., *Icon.*, n° 92; *A. abrotanoides,* Presl.; *Reliq. Haenk.*, I, p. 47, t. 8, f. 2; Serra os Orgaos, Brackenridge. — Cette espèce a primitivement été décrite sur une plante de la Nouvelle-Andalousie; nous l'adoptons comme brésilienne sur la seule autorité de Brackenridge, cité par Th. Moore (*Index*). M. Mettenius ne voit en elle qu'une simple variété de l'*A. fragrans,* Sw.

44. RACHIRHIZON, Radd., *Fil. Bras.*, p. 39, t. 56; *A. amabile,* Liebm. *Mexic.*, Bregn. n° 99; Brésil, Gaudichaud à Rio, n° 161 (*specimina parvula*); Gardner, n° 42, et par le même, Serra os Orgaos, n° 176; Glaziou, Rio-Janeiro, n°s 1691 et 2337. — Espèce charmante, très-divisée, à lobes ovoïdes; le rachis s'allonge considérablement, sort de la fronde, se dénude, ou ne porte plus que quelques frondules éparses; elle se termine parfois par une petite souche fibrilleuse qui n'émet aucune ébauche de frondes.

45. ADIANTOIDES, Radd., *l. c.*, p. 40, t. 51, f. 2; Raddi, Minas-Geraes; Brésil, Gardner, n°s 177 et 178; Rio-Janeiro, Glaziou, n° 2338 et n° 2813, Serra os Orgaos; H. Gauthier, île Sainte-Catherine. — Cette espèce vit sur la terre à l'ombre des grands arbres; elle est très-divisée, tendre, souple, molle, pellucide, très-glabre, à partitions très-ouvertes.

46. SCANDICINUM, Klfss., *Enum. filic.*, p. 177; Hook., *Sp. filic.*, p. 183, t. 204? Brésil, Chamisso; Brésil mérid., Sellow; Gardner, n° 178; Glaziou, Rio-Janeiro, n°s 928, 1230 et 2475.

47. CICUTARIUM, Sw., *Prodr.*, p. 130; Presl., *Reliq. Haenk.*, I, 47, *et auct. varior.; Darea cicutaria,* Sm., *Mem. acad. Turin.*, V, 409; F., *Gen. filic.*, p. 338; Brésil, Sellow. — Cette espèce, cultivée dans tous les jardins botaniques, semble rare au Brésil et nous ne l'avons pas vue provenant de cette localité.

44. HEMIDICTYON, Presl., *Tentam. pterid.*, p. 110.

1. MARGINATUM, Presl., *l. c., Asplenium marginatum;* L., *Sp. pl.*, p. 1539; Sw., *Syn. filic.*, p. 76; Willd., *Filic.*, p. 309; Hook., *Fil. exot.*, t. 63; Brésil, Raddi;

Gardner, n° 31; Martius, *Herb. Bras.*, n° 378; Claussen, Nouvelle-Fribourg; Glaziou, Rio-Janeiro, n°s 421 et 3162, Serra do Couto (1869). — Par son ampleur, la délicatesse de ses tissus, sa souplesse, la longueur de ses sporothèces, elle est l'une des plus belles fougères connues.

NB. Les Aspléniées sont représentées dans toutes les régions du globe par un certain nombre d'*Asplenium*, type du groupe, genre qui renferme environ 350 espèces très-bien caractérisées par le port. Elles forment en France le quart de nos fougères, aux Antilles le treizième, au Brésil et au Mexique environ le quatorzième. La diagnose n'en est pas toujours facile, certaines espèces se présentant avec des frondes plus ou moins divisées. Les rapports des Aspléniées avec les Diplaziées sont très-étroits.

XIII. SCOLOPENDRIÉES.

45. ANTIGRAMME, Presl., *Tentam. pterid.*, p. 120, t. IV, f. 9 et 10, *non* J. Sm.

1. REPANDA, Presl., *l. c. A. subsessile*, F., *Gen. filic.*, p. 210; *A. oblongata*, Presl., *l. c. Scolopendrium ambiguum*, Radd., *Filic. Bras.*, p. 40, t. 57, f. 1. Sainte-Catherine, H. Gauthier. — Cette plante varie dans ses dimensions et dans la longueur du pétiole. Nous regardons la forme suivante comme une variété.

β *discreta*, F., Glaziou, Rio, n° 2348. — Très-grande forme; fronde papyracée, se terminant en pétiole; aréoles costales presque universelles. — Longueur, 45-50 centim. sur 7-8 centim. de largeur; sporothèces de longueur variable, pouvant atteindre jusqu'à 3 centim.

2. LANCIFOLIA, Presl., *l. c.*; F., *Gen. filic.*, p. 210. Brésil. — Espèce peu connue.

3. DOUGLASII, Hook., *Gen. filic.*, t. 55 *a* et 57 *a*. *Asplenium Douglasii*, Hook. et Gr., *Icon. filic.*, n° 150. Brésil, Rio-Janeiro; Glaziou, n° 690; Serra os Orgaos, Gardner, n° 148. — Très-belle espèce, fort distincte, très-ample, cordiforme à la base, avec des oreillettes qui souvent s'imbriquent l'une sur l'autre.

4. POPULIFOLIA, Presl., *l. c.*; F., *Gen. filic.*, p. 210. Brésil. — Cette espèce, connue seulement de Presl, n'a été ni décrite ni figurée.

NB. Ce genre est exclusivement brésilien; quelques espèces demandent à être mieux connues; il fait partie d'un petit groupe, composé de trois types seulement, très-bien caractérisés, dont un, le *Camptosurus*, appartient à l'Amérique du Nord; le genre *Scolopendrium* a des espèces européennes et malaisiennes.

XIV. DIPLAZIÉES.

46. DIPLAZIUM, Sw., *Syn. filic.*, p. 4.

* *Frondes simples.*

1. PLANTAGINEUM, Sw., *in Schrad. Journ.*, 1800, II, p. 62; Schkh., *Crypt. Gew.*, p. 80, t. 85; *Diplazium acuminatum*, Radd., *Filic. Bras.*, p. 41, t. 57, f. 2. Brésil, Raddi, au Corcovado; Claussen; Blanchet, n° 2459; Gardner, n° 30; Martius, n° 336; Glaziou, Rio-Janeiro, n° 423; île Sainte-Catherine, H. Gauthier. Cette espèce est très-fréquemment prolifère à la base de la lame, contrairement à ce qui arrive d'ordinaire, la prolification se manifestant au sommet ou sur le trajet des mésonèvres. Elle est très-répandue dans l'Amérique tropicale et équatoriale. Les marges sont parfois crénelées ou même dentées; telle est surtout la variété

   β *serratum;* Glaziou, Rio-Janeiro, n° 2347. — Frondes épaisses, élargies à la base, se terminant en une pointe assez courte; les marges, ondulées vers leur partie inférieure, sont fortement dentées en scie vers le haut et jusqu'à la pointe qui termine les lames.

** *Frondes pinnées à frondes assez larges, crénelées entières ou ondulées.*

2. CALLIPTERIS, F., *Gen. filic.*, p. 214; Metten., *Asplen.*, p. 179. Brésil, Rio-Janeiro, Glaziou, n° 424. — Grande et belle espèce, à frondules très-courtement pétiolées, crénelées, sinueuses vers le haut; les sporothèces sont très-longs, très-étroits et s'élèvent presque jusqu'à la marge; le sommet de la fronde est pinnatifide et à segments arqués.

3. GRANDIFOLIUM, Sw., *in Schrad. Journ.*, 1800, II, p. 62; Willdenow, *Filic.*, p. 351. *D. brevifolium*, Kze., *Linnæa*, XXIII, p. 309. Brésil, Moricand. Blanchet, n° 2474. Rio-Janeiro, Glaziou, n° 425. — Cette espèce ne saurait être confondue avec le *D. Schlimense*, F., que M. Th. Moore, dans son *Index*, réunit au *D. grandifolium*, Sw.; celle-ci est bien plus grande, plus souple, à

marge dentée et non crénelée, nullement cordiforme à la base; les lames sont translucides et permettent de voir à la loupe les mailles arrondies du tissu cellulaire, tandis que dans le *D. Schlimense* les lames, parfaitement opaques, ne laissent rien deviner de leur structure anatomique.

4. DISSIMILE, F.

Frondibus glabris, oblongis, apice longe acuminato-caudatis, dissimilaribus, subsimplicibus, pinnatifidis, basi pinnatis; frondulis ovatis, leviter dentatis, sessilibus; sporotheciis tabacinis, linearibus, diplazioideis et asplenioideis; sporangiis rotundis; annulo 16 articulato; sporis rotundis, atris.

Habitat in Brasilia (Sainte-Catherine), Mors, n° 16.

Filix frondibus heteromorphis notata.

ICON.: *Tab. XXI, fig. 1.*

(Longueur : 75 centim., dont les pétioles font les deux tiers; largeur, 5 centim.)

Cette espèce porte sur une souche très-dure des frondes différentes les unes des autres : simple avec quelques frondules libres à la base, pinnée-pinnatifide, à segments inégaux. Les sporothèces diplazioïdes occupent le sommet de la fronde; au point de vue des organes reproducteurs elle est autant *asplenium* que *diplazium*, mais le port la rattache à ce dernier genre; la radication est exactement celle du *D. plantagineum*, Sw. Il serait possible que la condition normale de la fronde fût d'être simple comme dans l'espèce de Swartz.

5. CELTIDIFOLIUM, Kze., *Bot. Zeit.*, III, 1845, p. 285, et *Linn.*, XXIII, p. 250 et 309; Hook., *Spec. fil.*, III, p. 240, *sub asplenio.* Brésil, Blanchet, n° 544. — Plante robuste, formant dans nos serres, dont elle est l'un des ornements, un tronc assez élevé. Elle est gabre, d'un vert foncé, et porte une vingtaine de paires de frondules, cordiformes ou cunéiformes, attachées sur un pétiole sillonné et terminées par une pointe dentée en scie; la marge est crénelée et les crénulations sont chargées de dents couchées et arquées; les sporothèces partent du mésonèvre pour s'élever jusqu'à la marge; elle est assez souvent prolifère. Nous ne l'avons pas vue provenant du Brésil.

6. PARALLELOGRAMMUM, F.

Frondibus oblongis, pinnatis, opacis, glaberrimis; petiolo longissimo, basi incrassato, angulato, late canaliculato; frondulis alternis, oblongo-lanceolatis, acuminatis, sessilibus, leviter curvatis, margine repandis, nervillis parallelis, tenuissimis, marginem attingentibus; sporotheciis linearibus, media-

nam partem laminæ, fere totam invadientibus; indusiis angustissimis, diplazioideis; sporangiis pyriformibus, annulo crasso, 16-18 articulato; sporis subrotundis, fuscescentibus.

Habitat in Brasilia, prope Barra, *provincia* Rio-Negro (Spruce, n° 3832).

Filix aspectu speciali; sporotheciis parallelis, angustissimis longissimisque.

Icon.: *Tab. XX, fig. 2.*

(Longueur totale : 1 mètre 20 centim., dont le pétiole fait les deux tiers; 7-8 paires de frondules, séparées par un entre-nœud de 8 centim.; elles mesurent 16-18 centim. sur 4 de largeur.)

Cette belle et curieuse espèce a un port tout spécial, qu'elle doit à ses sporothèces parallèles, de longueur inégale et assez distants du mésonèvre et de la marge; ils sont tous diplazioïdes et de couleur de tabac d'Espagne; l'indusium est formé d'un tissu cellulaire à mailles très-épaisses et comme cancellaires. Les frondules sont légèrement arquées, arrondies à la base, à peine cunéiformes et toutes de même grandeur; les supérieures sont adnées. La consistance est un peu cartilagineuse; le pétiole, qui est extrêmement long, est épaissi à la base et presque triangulaire dans son parcours; on voit, dans sa partie inférieure, quelques écailles étroites, raides et brunâtres.

† 7. LONGIPES, F.

Frondibus extensis, in ambitu oblongis, petiolo depresso, striato, piloso, squamoso, squamis sparsis, linearibus; rachi fusco, glabro; frondulis lanceolatis, membranaceis, glabris, inferioribus petiolatis, intermediis sessilibus, superioribus adnatis, apicilaribus pinnatifidis, cauda flexuosa, fertili terminatis; nervillis tribus, intermedia furcata sterili; sporotheciis in venula superiori diplazioideis, latioribus, in venula inferiori asplenioideis, angustioribus, marginem attingentibus; sporangiis satis magnis, annulo lato, 16-18 articulato; sporis ovoideis, late episporiatis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2346 *partim*).

Filix gigantea, robusta, petiolo rachique subrubris; marginibus frondularum repandis.

Icon.: *Tab. XXI, fig. 2.*

(Longueur : 1 mètre 60 centim. et plus; pétiole, 50 centim.; frondules, 23-25 centim. de haut sur un peu plus de 4 centim. de largeur; les entre-nœuds mesurent 9-11 centim.)

Cette espèce est vraisemblablement la plus longue de toutes ses congénères; le pétiole, qui a une teinte couleur lie de vin, ainsi que le rachis, est déprimé; les

frondules arrondies à la base se terminent en une longue pointe, les marges sont ondulées; la consistance est comme papyracée; les écailles du pétiole sont peu nombreuses et linéaires.

*** *Frondes pinnées-pinnatifides.*

8. MUTILUM, Kze., *in Flor.*, 1839, I, *Beibl.*, 37; F., *Gen. filic.*, p. 214. *H. Bras.* Mart., n° 335; Luschnath, Bahia, n° 15 (Herb. F.), dans les forêts ombragées. — Les frondules sont crénelées, à crénulations légèrement ondulées-denticulées; le pétiole est renflé vers le bas. Elle mesure 1 mètre 50 centim. dans notre spécimen; nous comptons 24 paires de frondules, libres presque jusqu'au sommet. Pourquoi ce nom de *mutilum*, tronqué ?

9. RADICANS, Desv., *Prodr.*, p. 281; F., *Hist. foug. des Antill.*, p. 41. *Asplenium ambiguum*, Radd., *Fil. Bras.*, p. 38, t. 54 et 54², *non* t. 58. *Diplazium Shepherdi*, Presl., *Tent. pterid.*, p. 114. Martius, *H. Bras.*, n° 344; Gardner, Serra os Orgaos, n°s 46 et 169. Rio-Janeiro, Glaziou, n°s 414, 1775 et 2343; Maranhao, Spruce, n° 3911; Blanchet, sous plusieurs numéros; Luschnath, Bahia, n° 6 (H. F.). — La synonymie de cette plante (23 synonymes) est aussi compliquée que confuse, ce qui ne s'explique qu'en partie par la mobilité de ses formes. Contrairement au nom spécifique qui lui est attribué, elle n'est presque jamais radicante. (*Voy.* F., *Hist. foug. des Antill.*, *l. c.*)

10. RŒMERIANUM, Presl., *Tentam. pterid.*, p. 113, t. 4, t. 5 (fragm.); Hook., *Spec. filic.*, III, p. 243; Martius, *H. Brasil.*, n° 346. (N. V.)

11. STRIATUM, L., *Spec. pl.*, 1539, *sub asplenio; Diplazium striatum*, Presl.; *Tent. pterid.*, p. 114, Brésil, Moricand, n° 2509. — Belle espèce, très-féconde; frondules tronquées à la base, terminées par une longue pointe dentée. Dans le spécimen que nous avons sous les yeux et qui provient de la Jamaïque, les spores sont polymorphes, ovoïdes, trigones, arrondies; l'anneau, qui est très-large, porte 10-12 articulations.

12. BISERRATUM, Presl., *Tent. pterid.*, p. 114, t. 4, f. 2; *ejusd. Epim. bot.*, p. 85 (*in notis*). — Plante très-peu connue et que nous n'avons jamais pu voir.

13. COSTALE, Sw., *Syn. filic.*, p. 82, *sub asplenio; Dipl. macrophyllum*, Desv.; *Prodr.*, p. 280, Brésil, Miers, n° 164, et Blanchet, n° 535. — M. Th. Moore (*Index*) réunit cette plante au *D. Tussaci*, F. Nous ne les croyons pas identiques. En

parlant du *D. costale*, Swartz, *l. c.*, écrit : *laciniis lanceolato-falcatis, acutis, serrulatis, soris costæ utrinque contiguis* (p. 82), et *soris sublunatis, turgidis, semi-cylindraceis* (p. 276), caractères qui ne conviennent pas au *D. costale*, F.

14. TUSSACI, F., *Gen. filic.*, p. 214 et 216; Rio-Janeiro, Glaziou, n° 927, *partim.* — Très-grande espèce, à frondules pétiolées, oblongues, acuminées, à segments oblongs, un peu arqués, très-obtus et dentés, à sporothèces assez courts, naissant près du mésonèvre, les inférieurs seuls sont diplazioïdes.

**** *Frondes pluripinnées.*

15. AMBIGUUM, Radd., *Filic. Bras.*, p. 41, t. 58; Spreng., *Syst. veg.*, p. 69; *Asplenium dubium;* Metten., *Asplen.*, p. 231, *non* Link; Hook., *Sp. filic.*, III, p. 261 (*synon. plurib. exclusis*). Brésil, Gardner, n° 47, Serra os Orgaos, n° 5937; Glaziou, Rio-Janeiro, n°s 415, 927 et 1675. — Formes assez variables; marge des frondules tantôt ondulée et tantôt crénelée. Stipes bruns-rougeâtres, très-lisses.

16. EXPANSUM, Willd., *Filic.*, p. 354; F., *Gen. filic.*, p. 214; *D. truncatum*, Presl., *Tent. pterid.*, p. 114; *D. obtusum*, Lk.; *Filic. sp.*, p. 85; Martius, *H. Bras.*, n° 337; Claussen, Nouvelle-Fribourg, n° 147 (H. F.); Blanchet, n° 2509. — Les segments tronqués, portant parfois quelques denticulations, feront facilement reconnaître cette espèce qui n'a point encore été figurée.

β *glabriusculum*, Th. Moor.; *Ind.*, p. 328. Rio-Janeiro, Glaziou, n° 1777?

† 17. LEPTOCHLAMYS, F.

Frondibus amplis, extensis, teneris, glabris; frondulis primariis late lanceolatis, petiolatis, pinnatis, apice pinnatifidis, acutis, alternis, distantibus; frondulis secundariis lanceolatis, basi leviter cuneatis, apice coadunatis, patulis, acutis, alternis; segmentis obtusis, dentatis, usque ad medianam partem liberis; sporotheciis asplenioideis, raro diplazioideis, curvatis; indusio angustissimo, ope microscopio granulis globosis onusto; sporangiis rotundatis, annulo lato, 14-16 articulato; sporis leviter reniformibus, crassis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n°s 926 et 2062).

Filix magna, viridis, flexibilis; rachi primario subquadrangulari.

ICON. : *Tab. XXII, fig. 1.*

(Longueur des frondules primaires, 36-40 centim.; frondules secondaires, 18-20; segments, 2 centim. en moyenne; chaque segment est chargé de 5-6 paires de sporothèces ayant 4-5 millimètres de longueur.)

Cette espèce est fort belle, assez délicate, très-flexible et très-ample; elle est glabre et ne montre de poils que sur le rachis des frondules de 1er et de 2e ordre, encore sont-ils très-courts et visibles seulement à l'aide d'une loupe. Les rachis sont lisses et d'un vert plus foncé en dessus qu'en dessous.

Var.: β *leptorachis*, Rio-Janeiro, Glaziou, n° 1673. Rachis très-délié, maculé de brun-rougeâtre et d'aspect marbré. Les sporothèces des frondules supérieures n'occupent que la base des segments, tandis qu'ils en envahissent la totalité dans les segments inférieurs; elle est fort souple et très-glabre.

† 18. HERBACEUM, F.

Frondibus pluripinnatis, tenerrimis, glaberrimis, herbaceis, rachibus helveolis; pinnulis secundariis petiolatis, in ambitu ovato-lanceolatis, acuminatis; tertiariis brevissime petiolatis, lanceolatis, acutis, curvatis; segmentis ovatis, crenatis, decurrentibus; sporotheciis oblongo-linearibus, fere omnibus diplazioideis, rufis; sporangiis ovoideis; annulo 14-16 articulato; sporis reniformibus, vitreis, crassiusculis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2062).

Filix tenerrima, pellucida, viridis, subdecomposita.

ICON.: *Tab. XXIII, fig. 1.*

(Longueur: 1 mètre et plus; pinnules secondaires, 40 centim.; tertiaires, 8 cent. sur 2 de largeur; les ramifications du rachis sont très-déliées.)

Cette belle espèce est très-dilatée; la base du rachis et de ses subdivisions est noirâtre; les pinnules se désarticulent facilement. Elle conserve la couleur verte après dessiccation. On peut lui trouver quelques rapports avec le *D. grammitoides*, F., *Hist. foug. des Antill.*, p. 43. Les nervures et les nervilles sont très-déliées.

† 19. LEPTOCARPON, F.

Frondibus bipinnatis, glaberrimis, in ambitu oblongis, petiolo canaliculato, fuscescente, basi squamoso; squamis lanceolatis, fuscis; rachi glabro, supra striato; frondulis primariis oblongis, curvatis, acutis, subsessilibus, ad insertionem petiolorum multisquamosis; frondulis secundariis basi liberis, deinde adnatis, apice pinnatifidis; sporotheciis angustis, basilaribus tantum diplazioideis; sporangiis paucis, laxe unitis, annulo latissimo, 10-12 articulato, obliquo (ut in Alsophileis); sporis ovoideis trigonisque.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2330).

Filix tenerrima, pellucida, frondulis primariis suboppositis; nervillis simplicibus.

Icon. : *Tab. XXIII, fig. 2.*

(Longueur : 1 mètre 15 centim., avec un pétiole qui mesure 48 centim. ; il est renflé à la base; frondules primaires, 17-19 centim. sur 7 d'envergure.)

Cette espèce se rapproche, par la consistance, du *D. herbaceum*, F., qui est tri- et même quadripinné; les frondules primaires sont presque opposées et présentent à l'aisselle des pétioles une petite touffe d'écailles lancéolées, dentées en leur marge, succinoïdes, notablement arquées et acuminées; les sporothèces sont formés d'un petit nombre de sporanges; l'anneau, très-large et difficile à voir, semble oblique comme dans les Alsophilées; le pétiole, le rachis et ses subdivisions, ainsi que le mésonèvre des frondules de deuxième ordre, ont une couleur brun-rougeâtre très-accusée.

20. ROSTRATUM, F.

Frondulis dilatatis, bi- tri? pinnatis, glabris; frondulis primariis patulis, petiolatis, rachi squamoso, supra canaliculato, basi nigricante, apice pinnatifido; frondulis secundariis alternis, sessilibus, basi truncatis, apice abrupte caudatis, cauda integra, segmentis oblongis, apice obtuso, curvato, rostrato; sporotheciis inæqualibus, ovoideis linearibusque; sporangiis crassis; annulo lato, 12-14 articulato; sporis fuscis, trigonis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2331).

Filix ampla, aperta, segmentis arcuatis, rostratis notata.

Icon. : *Tab. XXIV, fig. 2.*

(Longueur des frondules primaires, 45-50 centim.; envergure, 20-22 centim.; frondules secondaires, très-rapprochées [au delà de 16 paires]; entre-nœud, 3,2 à 3,5 centim.)

Très-grande espèce, dont nous n'avons que les frondules primaires. Les rachis et le mésonèvre des frondules secondaires ont une couleur brun-rouge; elles se terminent en une pointe déliée à peine ondulée; les segments sont libres jusqu'aux trois quarts de la demi-largeur de la lame; le sommet est denté en scie et se recourbe en une sorte de bec, pour se terminer par une dent très-apparente.

21. REMOTUM, F.

Frondibus bipinnatis, glabris, rachi primario, subquadrangulari; frondulis primariis oblongis, petiolatis, rachi superne bicanaliculato, squamuloso;

frondulis secundariis remotis, lanceolatis, petiolatis, apice caudato, serrato; segmentis oblongis, obtusissimis, dentatis; sporotheciis linearibus, a margine remotis; sporangiis pyriformibus, succineo colore; annulo lato, 12-14 articulato; sporis? nigris.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2332).

Filix ampla, frondulis petiolatis, remotis, rachi primario robusto.

Icon.: *Tab. XXIV, fig. 1.*

(Longueur: frondules primaires, 50 centim., portées sur un pétiole de 2 centim.; entre-nœuds, 4 centim.; frondules secondaires, 11-13 centim. sur 4 centim. de largeur au centre; 15 paires de frondules alternes.)

Cette plante a ses frondules de second ordre écartées qui laissent entre les segments un sinus assez étroit; mais l'intervalle qui les sépare s'élargit vers le haut pour éloigner leurs sommets. Nous n'avons pu voir distinctement les spores, mais une infinité de petits corps globuleux obtenus en frappant les frondules fructifiées sur une lame de verre.

47. DIDYMOCHLÆNA, Desv., *Berol. magas.*, V, t. 7, f. 7.

1. sinuosa, Desv., *l. c. et auct. plurim.;* Mart., *Icon. crypt. Bras. selec.*, p. 95, t. 18 (*arbor.*) et t. 29, fig. 1 (*stipus*); *Diplazium pulcherrimum,* Radd., *Fil. Bras.*, p. 42, t. 50; Mart., *H. Bras.*, n° 328; Regnell, II, 330; Gardner, n°s 40 et 5322; Igreja Velha, Blanchet, n° 2257 (H. F.); Claussen, n° 108 (H. F.); Rio-Janeiro, Glaziou, n° 383; île Sainte-Catherine à Itajahy.

Var. β *microtheca,* F., Rio-Janeiro, Glaziou, n° 2337. — Frondules très-rapprochées, parfois imbriquées, marge supérieure formant une ligne légèrement concave; l'extrémité du segment est obtuse et se porte en avant. Les sporothèces sont petits, étroits et distants.

NB. Vingt-une espèces de *diplazium* et le beau genre *didymochlæna,* qui est monotype, constituent au Brésil le groupe des diplaziées. Les Antilles sont régies par le même nombre d'espèces et de genres, et le Mexique, qui n'a qu'un seul genre, ne possède qu'une dizaine de *diplazium.* Ce genre est très-voisin des *asplenium* par certaines de ses espèces; le port toutefois diffère. Lorsque les *diplazium* n'ont de sporothèces doubles qu'à la base, on doit voir en eux des *asplenium* à oreillettes, lesquelles ne sont autre chose que le rudiment d'une nouvelle partition de la fronde, qui tend, de simplement pinnatifide ou pinnée qu'elle est, à devenir bipinnatifide ou bipinnée.

XV. MÉNISCIÉES.

48. MENISCIUM, Schreb., *Gen. pl.*, n° 1630.

1. RETICULATUM, Sw., *Syn. filic.*, p. 19; Willd., *Filic.*, p. 134; *M. palustre*, Radd., *Fil. Bras.*, p. 9, t. 20. — Cette espèce a de larges frondules, peu nombreuses et étalées. Nous possédons un spécimen de la Guadeloupe, au plus haut point prolifère et si complétement que les prolifications pourvues de longues radicelles atteignent presque la longueur des frondes-mères.

2. MACROPHYLLUM, Kze. *in Schkh. Supp.*, p. 93, t. 44; Mart., *Herb. Bras.*, n° 362; Blanchet, Moricand, Luschnath.

3. ROSTRATUM, F., *Gen. filic.*, p. 224; Brésil, Ceara, Gardner, n° 1905. — Espèce très-remarquable par une marge portant de grosses dents recourbées en manière de bec (serait-ce accidentel?). Cette particularité n'a pas lieu chez le *M. palustre*, Radd., *Fil. Bras.*, p. 9, t. 9, auquel notre espèce ressemble beaucoup, quoiqu'il ne soit pas possible de lui attribuer ces mots de la description de Raddi: *subduplicato et acute serrato*, attribués à la marge.

4. SORBIFOLIUM, Jacq., *Collect.*, II, p. 16, t. 3, f. 2; Schkh., *Crypt. Gew.*, p. 5, t. 5; Langsd. et Fisch., *Icon. fil.*, t. 4; Glaziou, Rio-Janeiro, n° 407; île Sainte-Catherine à Bignassei par Alburquerque. — Frondes dressées, notablement plus étroites que dans le *M. reticulatum*, Sw., dont elle n'est peut-être qu'une variété.

† 5. ELONGATUM, F.

Frondibus pinnatis, glaberrimis, rigidis, in ambitu lanceolatis, longe petiolatis; petiolo crasso, basi nigro, arcuato, compresso, lævi; rachi trisulcato; frondulis assurgentibus, coriaceis, lanceolatis, acutis, sessilibus, marginibus repandis, inferne remotis, superne approximatis; mesonevro albido, pilosulo, nervillis scalpturatis, numerosis; sporotheciis tabacinis, confluentibus; sporangiis crassissimis, annulo latissimo, 20-24 articulato, articulis fuscis, angustis; sporis magnis, ellipticis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 1169).

Filix præstantissima, rigida, nervatione scalpturata, elegantissima; petiolo crassitudine digiti infanticuli.

ICON.: *Tab. XXV, fig. 1.*

(Longueur totale, 1 mètre 50 centim. Le pétiole seul, 80 centim.; les frondules, 11-13 centim. sur 2 de largeur.)

Cette belle espèce est remarquable par la longueur très-considérable du pétiole et la petite dimension des frondules; les nervures et les nervilles sont en relief; il en existe sur chaque frondule, de la base au sommet, au delà de 60; les mailles fructifères ne sont pas précisément méniscioïdes, mais anguleuses. On peut en compter jusqu'à 12 paires; elles portent une nerville droite qui n'atteint pas la base, mais qui s'en rapproche beaucoup. Elle est parmi les fougères une de celles qui ont les plus grosses sporanges avec un anneau dont les articulations dépassent le nombre de 20.

6. SESSILIFOLIUM, Pohl, *Herb. Musei palat. Vind.*; San-Izidro, capitania de Goyaz, Pohl. — Cette espèce paraît bien distincte; elle est longuement stipitée avec des frondules très-rapprochées, sessiles, lancéolées, aiguës, glabres et dressées. Le pétiole est anguleux et assez gros. La plante mesure 70 centim., les frondules 7-9 centim. sur 2 centim. environ de largeur. Les sporanges ont un anneau portant 14-16 articulations et des spores obliquement ovoïdes, assez grosses.

† 7. LONGIFOLIUM, F.

Frondibus amplis, glabris, membranaceis, rachi helveolo, tenui, sulcato, nudo, in ambitu oblongis; frondulis alternis, remotis, breve petiolatis, lanceolatis, curvatis, basi inæqualibus, apice acuminatis; marginibus repandis, mesonevro tenui, supra anguste canaliculato, nudo, infra tomento brevissimo vestito; nervillis leviter flexuosis, areolis apice subangulosis, cum nervilla erecta plus minusve longa; sporotheciis 6-8, breve lunulatis, rubescentibus, semper distinctis, sporangiis rotundis; annulo lato, 14 articulato; sporis crassis, ovoideis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n°s 1747, 2375).

Filix ampla; frondulis magnis, manifeste curvatis flexibilibusque.

ICON. : *Tab. XXV, fig. 2.*

(La plante mesure sans doute au delà de 1 mètre; nous n'avons pas le pétiole; les plus grandes frondules, celles de la base, atteignent 36-40 centim. sur 4-5 de largeur; nous comptons sur celles du centre jusqu'à 40 séries fructifères, et cependant le tiers supérieur de la frondule est stérile.)

La nervation de cette belle plante rappelle celle qui a été donnée par Presl, *Tent. pterid.*, p. 186, t. 7, f. 13, pour le *Goniophlebium articulatum*, Desv., *Prodr.*, *sub polypodio*, avec cette différence que dans cette plante la nerville basilaire est fructifère, tandis que dans les *meniscium* elle n'existe pas, toutes les nervilles étant constituées en aréoles; ajoutons que ces aréoles, quoique surmontées d'une

droite, ne sont fructifères qu'au sommet. Du reste, parmi les *goniophlebium* la nervation figurée par Presl s'écarte de la nervation du genre.

NB. Ce groupe est très-nettement caractérisé par la nervation et par la disposition des sporanges qui s'attachent sur toute l'étendue d'une nerville courbe. Le Brésil est relativement très-riche en *meniscium*, il en possède 7 espèces, les Antilles 2 seulement. Il semble manquer au Mexique. Ces fougères sont très-prolifiques; souvent par confluence les sporanges recouvrent toute la lame à la manière des acrostichées.

XVI. POLYPODIÉES.

49. GRAMMITIS, Sw., *Syn. filic.*, p. 21.

1. PUNCTATA, Radd., *Filic. Brasil.*, p. 11, t. 22 *bis*, f. 1 (N. V.); Brésil, Raddi.

† 2. FLUMINENSIS, F.

Frondibus linearibus, glabris, obtusiusculis, basi longe attenuatis, nervillis simplicibus, marginem non attingentibus, surculo erecto; sporotheciis dimidiam partem frondium invadientibus, ovoideis, crassis, costalibus, approximatis, erectis; sporangiis rotundis, longe pedicellatis, annulo 10-12 articulato; sporis globulosis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2456).

Filix linearis, glabra, frondibus super surculum erectum, repens fibrillosumque congestis.

ICON.: *Tab. XIX, fig. 3.*

(Longueur: 18-20 centim. sur 8-9 millim. de largeur.)

Cette espèce rappelle par les frondes et les sporothèces le *G. Magellanica*, Desv., mais la radication est tout à fait différente; le rhizome rampant qui existe ici manque dans la plante de Desvaux.

50. POLYPODIUM, L., *Spec. pl.*, 1544.

I. *Frondes pinnatifides.*

A. DRESSÉES.

1er Type : *Polypodium vulgare*, L.

† 1. EXTENSUM, F.

Frondibus oblongis, acutis, villosulis, petiolis cylindricis, rufis, elongatis, segmentis anguste linearibus, adnatis, acuminatis, inferioribus oppositis, supe-

rioribus alternis, rachi tomentoso, laminis villosulis, in tota longitudine sporangiiferis; sporotheciis ovoideis, receptaculo minuto; sporangiis globosis, longo pedicello donatis; annulo 14 articulato; sporis ellipticis, magnis, lutescentibus.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2403).

Filix extensa, repens, petiolo rachique cylindricis, breve tomentosis, rufescentibus.

Icon.: *Tab. XXVIII, fig. 3.*

(Longueur, 86 centim., dont le pétiole fait les 2 cinquièmes. Les segments, qui mesurent de 9 à 10 centim. sur 5 millim. de largeur, sont au nombre de près de 60, séparés par un entre-nœud de 8 millim.; ils portent au delà de 40 paires de sporothèces tous distincts, quoique très-rapprochés.)

Cette espèce est la plus grande des espèces dressées; elle est assez raide, élastique, épaisse et opaque; les segments, dont la marge est ondulée, sont divisés jusqu'à la côte, longuement acuminés, élargis à la base de manière à former une double oreillette, supérieure et inférieure; ils portent des sporothèces dans toute leur étendue. Le pétiole et le rachis ne montrent aucune trace de sillon. Les vaisseaux du pétiole prennent une apparence ponctiforme et forment une série en fer à cheval; deux autres faisceaux plus gros leur sont opposés et ressemblent à deux virgules mises en regard l'une de l'autre. Le rhizome est rampant, écailleux, assez gros et de saveur sucrée.

2. tenuiculum, F., *Gen. filic.*, p. 239; Glaziou, Rio-Janeiro, n° 2412. — Petite espèce terminée par un appendice caudiforme; les segments sont très-aplatis, composés de petits sporothèces marginaux, dont les sporanges glabres renferment des spores ovoïdes, noirâtres. Elle vit à la Guadeloupe.

3. Spixianum, Mart., *Herb. Kze.;* Metten., *Polyp.*, p. 57. — Fronde glabre, ovale ou oblongue, acuminée, segments atteignant la côte; sporothèces rapprochés de la marge, au nombre de 5-7 par rangée; rhizome rampant. Indiquée au Brésil par Mettenius. (N. V.)

† 4. Pleopeltidis, F.

Frondibus profunde pinnatifidis, dilatatis, glabris, opacis, in ambitu oblongis, segmentis lanceolatis, acutis, alternis, adnatis, basi decurrente contractis, marginibus crenatis, terminalibus caudatis, inferne squamis rotundis, sparsis, modo pleopeltidorum; sporotheciis rotundis, remotiusculis, superne puncto

niveo carbonati calcis indicatis; sporangiis pyriformibus; annulo lato, articulis 12-14 spissis, remotiusculis; sporis satis magnis, reniformibus.

Habitat in Brasilia fluminensi (Serra os Orgaos, Glaziou, nos 2459 et 2817).

Filix rigida, longe repens, frondulis remotis, petiolo lævi, rima angusta percurso; facie pleopeltidis.

Icon. : *Tab. XXVI, fig. 1.*

(Longueur: 20-25 centim. avec des segments de 4-5 centim. sur 3-4 millim. de largeur. Le rhizome atteint à peine la grosseur d'une plume de pigeon. Les segments sont au nombre de 7 à 9 paires.)

Fougère opaque, raide, conservant la couleur verte dans l'herbier. Les segments sont inégaux, étalés, laissant entre eux de larges sinus; ils sont décurrents. Le rhizome est allongé et couvert de petites écailles courtes et lancéolées. Cette plante est au nombre de celles qui déposent sur la lame supérieure une petite plaque de carbonate de chaux au point qui correspond aux sporothèces.

5. REPANDUM, F.

Frondibus oblongis, villosis, nervillis unica vice furcatis, nervilla superiori abbreviata, fertili; segmentis ad costam partitis, lanceolatis, obtusiusculis, ciliatis, basi dilatatis, marginibus repandis; sporotheciis crassis, 5-6 per seriem, in medio segmentorum evolutis; sporangiis glabris, annulo lato, 20 articulato, sporis reniformibus, punctis pellucidis cribratis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2409) *et* Serra do Couto (n° 3170).

Filix curvata, elastica, rhizomate brevi; marginibus frondium manifeste repandis.

Icon. : *Tab. XXIX, fig. 1.*

(Longueur : 40 centim. dont le pétiole fait presque la moitié; segments, 3,5 centim. sur 7 millim. de largeur.)

Cette fougère se rapproche de notre *P. Guadalupense*, F., *Hist. foug. Antill.* Elle est plus robuste, et son facies n'a rien de saillant. Les segments pectinés diffèrent de longueur et de direction.

† 6. HIRSUTULUM, F.

Frondibus lanceolatis, acuminatis, basi attenuatis, petiolo cylindrico, breve hirsuto; rachi pilis brevibus nigris onusto; segmentis basi æqualiter dilatatis, coadunatis, centralibus oblongis, superioribus ovatis, inferioribus moni-

liformibus, omnibus obtusis, parce ciliatis; sporotheciis margini approximatis, utrinque ad costulam 4-5; nervillis simplicibus, atris, marginem non attingentibus; sporangiis parvulis, annulo angusto, 12 articulato; sporis subrotundis, nigrescentibus.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2460).

Filix habitu Polypodii vulgaris, sed minor; rhizomate brevi, squamoso, squamis fulvis, parvis, lanceolatis, marginibus ciliatis.

Icon.: *Tab. XXVI, fig. 2.*

(Longueur: 17-20 centim. sur 2 d'envergure au centre.)

Cette espèce est raide, les frondes naissent rapprochées sur un rhizome de la grosseur d'une petite plume d'oie; les pétioles sont hérissés de petits poils raides; on les retrouve sur les marges et en petit nombre sur les lames inférieures; les sporothèces sont indiqués sur la lame supérieure par un petit point noir.

2e Type: *Polypodium trichomanoides*, Sw.

7. TRICHOMANOIDES, Sw., *Syn. filic.*, p. 33; Willd., *Filic.*, p. 184; Schkh., *Crypt. Gew.*, p. 11, t. 10, f. 1; Metten., *Filic. Lechler.*, p. 7, t. 2, f. 4-6. — Petite espèce, très-velue, étroite, presque sessile, à segments très-rapprochés; les frondes sont portées sur une petite souche dressée. Mettenius met en synonymie notre *P. Serricula*, à frondes glabres, très-longues, très-étroites et à segments plus écartés; il y joint aussi le *P. gibbosum*, malgré la grande dissimilitude des segments, porteurs d'une double oreillette. — Elle est indiquée au Brésil, mais nous ne la possédons pas de cette localité.

8. MONILIFORME, Cavan. Willd., *Filic.*, p. 184; Schkh., *l. c.*, p. 188, t. 8 *c;* Metten., *Filic. Lechler.*, 7, t. 2, f. 4-6 (*fragmenta*). — Fougère indiquée au Brésil; elle est raide, épaisse, très-glabre. Nous l'avons en herbier, provenant du Pérou et récoltée par Dombey dès 1777.

† 9. IMMERSUM, F.

Frondibus linearibus, mollibus, sessilibus, pinnatifidis, abrupte terminatis; segmentis inæqualibus, remotiusculis, oblongis, obtusis, leviter crenatis, basi decurrentibus, horizontalibus, rimosis; sporotheciis profunde immersis, 4-6, in qualibet lacinia, in senectute confluentibus; sporangiis parvulis, glabris, sporis subtrigonis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 1721).

Filix elongata, flexuosa; ad arbores suspensa; surculo parvulo.

Icon. : *Tab. XXVII, fig. 1.*

(Longueur variable, 12-20 centim. sur 6-8 millim. de largeur.)

Cette espèce sera facile à reconnaître à ses sporothèces occupant une fossette, relativement très-profonde; les frondes sont réunies en touffe sur une petite souche dressée; elle est glabre; les segments sont assez épais et opaques; ceux qui terminent la fronde, réduits à quelques particules arrondies, semblent avortés. Dans notre genre *plectopteris* l'immersion est réelle; ici les sporothèces déterminent simplement une dépression, dans laquelle ils sont logés.

10. Serricula, F., *Gen. filic.*, p. 238; *ejusd.* 6e *Mém.*, p. 9, t. VII, f. 1; Rio-Janeiro, Glaziou, n° 2414. — Cette espèce est établie sur une fougère de la Guadeloupe, voisine, mais différente du *P. trichomanoides*, Sw. Le spécimen du Brésil est moins raide; ses frondes sont arquées, glabres, mais avec des pétioles poilus.

† 11. exiguum, F., Bahia, par Blanchet, n° 8. — Cette espèce, la plus petite du genre, a le port du *P. Serricula*, elle en diffère par des proportions très-inférieures et par des pétioles qui font le tiers ou même la moitié de la longueur totale, qui ne dépasse pas 7 centim. sur 3 millim. de largeur; elle est poilue et assez raide de port; les segments sont monosores, les sporothèces assez gros, ainsi que les sporanges, qui renferment des spores arrondies, lisses et noirâtres.

Icon. : *Tab. XXXVII, fig. 1.*

† 12. confluens, F.

Frondibus caudatis, lanceolatis, petiolo cylindrico, piloso; segmentis oblongis, usque ad costam pinnatipartitis; sporotheciis crassis, confluentibus, tabacinis, centralibus, 4-5 per seriem; sporangiis crassis, rotundis, annulo lato, 12-14 articulato; sporis magnis, atris, opacis, obscure trigonis rotundisque. Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2413).

Filix crassitudine et colore atra sporarum notata.

Icon. : *Tab. XXVI, fig. 3.*

(Longueur, 11-13 centim. sur 15 millim. d'envergure et 2-3 millim. de largeur.)

Très-distincte par la largeur de l'anneau et la grosseur des spores, obscurément trigones, opaques et très-noires; cette espèce n'a point de caractères saillants; les

sporothèces sont confluents et très-gros. Les nervilles, simples, n'atteignent pas la marge. On ne peut les voir que par immersion dans l'eau. Il y a un rhizome.

13. ORGANENSE, Metten., *Polyp.*, p. 39; *Grammitis*, Gardner, *in* Hook., *Icon. pl.*, t. 509; Brésil, Gardner, n° 5913. — Le collecteur, en donnant une place à cette petite espèce parmi les *Grammitis*, indique que les sporothèces sont oblongs. Le réceptacle est poilu (*dense setosum*). (N. V.)

14. PILOSISSIMUM, Mart. et Galeott., *Filic. Mexic.*, p. 39, t. 9, f. 2; Serra os Orgaos, Gardner, n° 111 (*ex* Hook., *Sp. filic.*, IV, 181); Rio-Janeiro, Glaziou, n° 410. — Frondes lancéolées, acuminées, à segments atteignant le rachis; pétiole velu, à poils étalés, fauves. Les spécimens brésiliens sont moins velus que ceux qui proviennent du Mexique et qui sont les véritables types de cette espèce.

(Longueur, 16-20 centim. sur 15 millim. environ d'envergure.)

3e Type: *Polypodium pectinatum*, L.

* Grandes formes.

15. PECTINATUM, L., *Spec. pl.*, 1545; Sw., *Syn. filic.*, p. 34; Plum., *Filic.*, p. 64, t. 83; Gardner, Brésil, sous divers numéros. — Segments horizontaux à marge ondulée; sporothèces assez petits. Il est bien difficile de mettre d'accord les auteurs sur la validité de cette espèce. La planche citée de Plumier reproduit une très-grande plante dont nous n'avons pas l'équivalent en herbier. M. Hooker, *Sp. filic.*, IV, p. 203, donne de cette fougère une synonymie qui réunit plusieurs espèces parfaitement distinctes.

16. PARADISIÆ, Langsd. et Fisch., *Icon. filic.*, p. 11, t. 11; Willd., *Filic.*, p. 179; Metten., *Polyp.*, p. 60; Brésil, Rio-Janeiro, Glaziou, n° 1683, et Therezopolis, n° 1724; île Sainte-Catherine, Langsd. et Fisch.; H. Gauthier. — Cette espèce est élastique, finement velue, à très-longs segments linéaires, obtusiuscules, étalés, décroissant considérablement vers la base. La saveur des segments est d'une amertume prononcée. Les sporothèces sont petits, arrondis, au nombre de 30 et plus sur chaque côté du segment fructifié.

† 17. PARADISIASTRUM, F.

Habitu P. Paradisiæ; frondibus profunde pinnatifidis, apice longe attenuatis, segmentis lanceolato-linearibus, acuminatis, basi contractis, leviter flexuosis, inferne oppositis, inferioribus discretis, oppositis, superioribus approximatis, alternis, marginibus undulatis; sporotheciis ovoideis, distinctis, cen-

tralibus scrobiculo ad laminam superiorem indicatis; sporangiis rotundatis, annulo 10-12 articulato; sporis aureis, lævibus, reniformibus.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, nos 396 et 974 au Corcovado, et no 1725 à Therezopolis).

Filix elata, glabrescens, rhizomate squamoso; squamis fulvis, lanceolatis, acuminatis, margine integris.

Icon. : *Tab. XXIX, fig. 2.*

(Longueur, 80 centim. à 1 m.; le pétiole, qui est arrondi et rougeâtre, fait le tiers de la longueur totale; les segments du centre atteignent jusqu'à 10 centim. sur 4-5 millim. de largeur.)

Cette belle espèce diffère du *P. Paradisiæ* par la forme de ses segments rétrécis à la base, laissant entre eux au centre de la fronde de larges sinus; ils sont très-diversement dirigés et s'écartent capricieusement du parallélisme; ajoutons qu'ils ne décroissent pas sensiblement à la base. Les sporothèces, au lieu d'être arrondis, sont oblongs et n'impressionnent en aucune manière la lame supérieure à leur point de développement; la squamescence est différente; les squames, qui sont ici lancéolées et fauves, sont linéaires et noirâtres dans le *P. Paradisiæ.*

18. recurvatum, Klfss., *Enum. filic.*, p. 106; *P. mænurum*, Lk., *Fil. sp.*, p. 126; Brésil, Sainte-Catherine, H. Gauthier. — Très-grande espèce, facile à distinguer des deux espèces précédentes par des segments fortement crénelés, arqués et dirigeant leur courbe de haut en bas.

19 ? otites, L., *Sp. pl.*, 1545; Willd., *Filic.*, p. 177; Metten., *Polyp.*, p. 59; *P. molle*, H. B. et Kth.; *Nov. Gen.*, I, 8; Bahia (*ex* Bory, Herb. F.), Sainte-Catherine, H. Gauthier. — Segments presque horizontaux, auriculés à la base du côté supérieur. Rhizome rampant. Il est très-vraisemblable que sous le nom d'*otites* on admet dans les herbiers des plantes spécifiquement différentes. Il en est ainsi de la plupart des espèces qui n'ont point encore été figurées. Le spécimen de Bahia que nous tenons de Bory a ses segments du centre opposés, ainsi que le veut la description donnée par Willdenow; mais les segments inférieurs ont des nervilles anastomosées, c'est un demi *goniophlebium.*

20. Plumula, Willd., *Filic.*, p. 178; Raddi, *Filic. Bras.*, p. 18, t. 27 (petite forme); Metten., *Polyp.*, p. 58; Para, Spruce, no 1; Glaziou, Rio-Janeiro et Tijuca, nos 1738, 2070 et 2461; Marianna, Vauthier, no 591. — Varie dans ses dimensions; elle est souple, translucide et très-élégante; nous avons des spé-

cimens fort longs, mesurant 50 centim. La description donnée par Raddi ne parle pas du mésonèvre des segments, lesquels sont très-flexueux; la figure donnée n'exprime pas ce caractère.

† 21. ROBUSTUM, F.

Frondibus oblongis, apice acutis, in parte inferiori abortivis, rigidis, robustis, petiolo rufo, glabrescente, canaliculato; rachi tomentoso, rufescente; segmentis horizontalibus, oblongo-linearibus, pilosulis, obtusissimis, basi superne auriculatis, mesonevro undulato, margine breve tomentoso; sporotheciis centralibus, rotundis, dimidiam partem inferiorem segmentorum occupantibus; sporangiis rotundis, turgidis; sporis crassis, ovoideo-reniformibus, punctatis, punctis translucidis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2407).

Filix gigantea, pinnatisecta, rhizomate crasso, fibrilloso, fibris numerosis, longissimis, rubescentibus; sporis structura propria.

ICON. : *Tab. XXVIII, fig. 1.*

(Longueur: 140 centim., dont le pétiole fait la 5e ou la 6e partie; les segments atteignent 9 centim. sur 9-10 millim. de largeur; ils sont très-rapprochés.)

Ce polypode prend place parmi les plus grandes espèces herbacées; le rachis n'est pas canaliculé; dans le spécimen que nous décrivons, les segments avortent et ne sont plus représentés que par des bases tronquées. Est-ce accidentel? La structure des spores est très-curieuse : elles sont ovoïdes ou réniformes, très-grosses, et se présentent sous le microscope criblées de points translucides; sont-ce de petits corps en saillie? ou des pores?

** Petites formes.

22. FILICULA, Klfss., *Enum.*, p. 275; Metten., *Polyp.*, p. 58. *P. Plumula*, var. *minor*, Willd., *Herb.* Rio-Janeiro, Glaziou, n° 972. — L'espèce que nous décrivons et dont nous donnons la figure, a des frondes très-courtement pétiolées, oblongues, décroissantes vers le haut et vers le bas; les segments sont divisés jusqu'à la côte, linéaires ciliés, obtus, présentant, d'espace en espace, sur leur trajet, des espèces de renflements; le sommet est parfois dilaté. Est-ce bien là la plante de Willdenow? Pour en décider il faudrait la voir, et nous ne l'avons pas vue.

ICON. : *Tab. XXVIII, fig. 2.*

† 23. HETEROCLITUM, F., Rio-Janeiro, Glaziou, n° 2410. — Cette espèce nous semble très-bien caractérisée, quoique voisine des *P. Filicula, Otites* et *Plumula.* Elle est assez grande, à segments très-rapprochés, à marge ciliée, dentée en scie et de grandeur très-inégale. Le rachis est d'un brun rougeâtre et tomenteux; la fronde est portée sur un petit rhizome écailleux. Les sporothèces sont marginaux et peu fournis de sporanges.

ICON. : *Tab. XXVI, fig. 4.*

24. SCHKUHRII, Radd., *Filic. Bras.*, p. 19, t. 27, f. 2. *P. pectinatum,* Schkh., *Crypt. Gew.*, p. 189, t. 17 B, *non* L. — Les figures données par les auteurs plus haut cités sont identiques. La fronde est tronquée à la base, où se trouvent des segments de même longueur qu'au centre. Malgré le très-grand nombre d'espèces de fougères brésiliennes dont se compose notre collection, cette forme nous est restée inconnue.

4e Type : *Polypodium chnoophorum* (espèces pubescentes).

25. CHNOOPHORUM, Kze., *Flor.*, 1839. *Beibl.*, I, 34. Blanchet; Mart., *H. Bras.*, n° 323. Glaziou, Rio-Janeiro, n° 975. — L'étymologie de ce nom spécifique se rapporte à une plante duveteuse; il manque ici de justesse; la fronde est simplement villeuse; cette fougère acquiert parfois d'assez grandes proportions. Elle n'a point encore été figurée et se rapproche, par le port, du *P. vulgare,* L.

26. SUBLANOSUM, Hook., *Spec. filic.*, IV, p. 221. Serra os Orgaos, Gardner, n° 122. — Cette espèce, que la description caractérise très-faiblement, ne nous est pas connue.

B. PENDANTES AVEC DE LONGS POILS SUR LE SACCULUS.

27. PENDULUM, Sw., *Syn. filic.*, p. 33; Schkh., *Crypt. Gew.*, p. 12, t. 10; Metten., *Polyp.*, p. 55. Brésil, Gardner, n° 5914. — La figure citée de Schkuhr est une petite forme de cette espèce qui n'a guère l'apparence d'être pendante. Cet auteur, très-exact, a reproduit les poils dont le sacculus est porteur, comme dans toutes les espèces de cette section.

28. SUSPENSUM, L., *Spec. pl.*, p. 1544; Sw., *Syn. filic.*, p. 32; Willd., *Filic.*, p. 181; Plumier, *Filic.*, p. 67, t. 87. Rio-Janeiro, n°s 128 et 129. — Très-longues frondes, molles, flottantes, à segments oblongs, glabriuscules, à

marge portant plusieurs longs cils; les pétioles sont presque nus, assez longs, cylindriques et brunâtres. La figure donnée par Plumier est exacte, quoique grossière.

29. CULTRATUM, Willd., *Filic.*, p. 187; Plum., *Filic.*, p. 68, t. 88. *P. suspensum*, Metten., *Fil. Lechl.*, 7; *non* L. Rio-Janeiro, Glaziou, n° 2417. — Très-velue, très-flexible, assez étroite; frondes presque sessiles; segments alternes; ovoïdes, arrondis à la base et détachés du rachis par la partie supérieure, de sorte qu'elle est presque pinnée. Les spores brunâtres et polymorphes sont renfermées dans une sporange, dont l'anneau porte plusieurs poils raides et noirâtres.

† 30. CILIARE, F.

Frondibus oblongis, mollibus, pinnatifidis, villosis, stipitibus brevissimis; segmentis ovato-oblongis, obtusissimis, integerrimis, sursum gibbosis; pilis longis utrinque obsitis; sporotheciis sparsis, in qualibet lacinia 3-4, crassis, sæpe apicilaribus, rufis; sporangiis parvulis, pilis longissimis, rigidis, oculo nudo perfacile perspicuis; annulo 10-12 articulato, sporis subtrigonis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 961).

Filix parva, sessilis, apice breve terminata.

ICON. : *Tab. XXVII, fig. 2.*

(Longueur : 7-9 centim. sur 7-9 millim. de largeur.)

Cette fougère a le port et le facies du *Polypodium elasticum*, Bory, *in* Willd., *Filic.*, p. 183. Elle est plus courtement stipitée, et ce qui la distingue d'une manière toute particulière, c'est la présence, sur le sacculus et l'anneau, de poils raides, nombreux, et si longs qu'on les distingue à l'œil nu; ils dépassent de beaucoup la longueur de la capsule qui les porte.

† 31. OVALESCENS, F.

Frondibus pinnatis, linearibus, substipitatis, pilos longissimos flexibiles ferentibus; rachi flexuoso, tenuissimo atro; frondulis ovalibus obtusissimis, sessilibus; sporotheciis apicilaribus 2-3, rufis; sporangiis rotundis; annulo 10 articulato, pilis nigris, longissimis onusto; sporis ovalibus.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 1722).

Filix parva, mollis, ad arbores suspensa.

ICON. : *Tab. XXVII, fig. 3.*

(Longueur : 7-9 centim. sur 7-9 millim. de largeur.)

Cette espèce ressemble beaucoup au *Polypodium ciliare*, F. C'est le même type, mais avec des frondes pinnées. Les poils portés par la sporange en excèdent 2 ou 3 fois la longueur.

32. SEMIADNATUM, Hook., *Icon. pl.*, t. 948; *ejusd. Centur. of ferns*, t. 48, et *Spec. filic.*, p. 222. Serra os Orgaos, Vauthier, n° 588; Gardn., n° 112. Rio-Janeiro, Brackenridge; même localité, Glaziou, n° 410. — Les poils de l'anneau sont aussi longs que dans l'espèce précédente; les spores sont trigones; les nervilles sont simples et n'atteignent pas la marge; les segments ne sont attachés au rachis que par une portion très-réduite de la partie inférieure de la base (voy. *P. cultratum*). C'est là ce qui, entre autres caractères, la distingue de notre *P. mollissimum* (*Hist. foug. Antill.*, p. 47, t. 12, f. 2). Elle est étroite et mesure environ un demi-mètre sur 2,5 d'envergure.

33. APICULATUM, Klotz., Kunz., *Linn.*, XX, p. 378; Metten., *Polyp.*, p. 44. Brésil, Gardn., Serra os Orgaos, n° 110 (H. Hook.). — Si cette plante est, en effet, notre *P. Pecten.*, *Gen. filic.*, p. 240, il est difficile de comprendre comment elle a pu mériter le nom d'*apiculatum*, les sporothèces naissant sur les segments dans presque toute l'étendue de la fronde.

II. *Frondes pinnées-pinnatifides* (segments dentés).

34. ACHILLÆFOLIUM, Klfss., *Enum. filic.*, p. 116; Kze., *Die Farrenkr.*, I, p. 91, t. 43, f. 2. Brésil, Sellow, Gardner; Glaziou, Rio-Janeiro, n°s 1720 et 2416. — Espèce bien dénommée, très-élégante et de proportions assez restreintes.

NB. Les *Polypodium* écailleux doivent être placés parmi les *Drynaria* ayant des nervilles anastomosées; c'est dans ce genre qu'il faut les chercher.

Parmi les espèces de la section B, il s'en trouve, ainsi que nous l'avons fait voir, qui portent sur l'anneau de longs poils raides, au nombre de 3-6, ayant parfois une longueur 2 à 3 fois supérieure à celle de la sporange. Voici celles qui présentent cette particularité :

1. *P. asplenifolium*, Sw., *Syn. filic.*, p. 32. La Martinique.
2. *P. ciliare*, F. Rio-Janeiro, Glaziou, n° 61. (*Vide supra.*)
3. *P. Guadalupense*, F. (Herb.).
4. *P. mollissimum*, F., *Hist. foug. Antill.*, p. 47, t. 12, f. 2.
5. *P. ovalescens*, F. (*vide supra*). Rio-Janeiro, n° 1722.
6. *P. semiadnatum*, Hook., *Icon. pl.*, t. 948; Glaziou, Rio-Janeiro, n° 410.

7. *P. cultratum,* Willd., *Filic.*, p. 187; Glaziou, n° 2417. (*Vide supra.*)
8. *P. suspensum,* Sw., *Syn. filic.*, p. 33. Guadeloupe; Nouv.-Grenade, L. Schlim., n° 855. (H. F.) [*Vide supra.*]
9. *P. xanthotrichium,* Klotz., *Linn.*, XX, p. 376. *P. ellipticosorum,* F., *Gen. filic.*, p. 239. Colombie.

51. PHEGOPTERIS, F., *Gen. filic.*, p. 242, t. 20 *a.*

I. *Frondes pinnées-pinnatifides.*

* *Formes à frondes plus ou moins étroites.*

1. PRIONITIS, Kze., *in Flora,* 1839, I, p. 29, *sub polypodio. Phegopteris,* F., *l. c.*, p. 243; Martius, *Herb. Bras.*, n° 305; Blanchet, Bahia, n° 2483. — Cette espèce peut atteindre 1 mètre de longueur; ses frondules sont étroitement lancéolées, aiguës, crénelées, à crénulations simulant des dents très-obtuses; nervilles simples et très-courtes; les sporothèces sont ovoïdes, parfois confluents; spores ovoïdes; elle n'a point été figurée. — *Prionitis,* petite scie.

2. TIJUCCANA, Radd., *Filic. Bras.*, p. 25, t. 37, *sub polypodio; Ph. Tijuccana,* F., *Gen. fil.*, *l. c.* Brésil, au Corcovado; Spruce, à Saint-Gabriel, et Tarapota, n° 2100; Rio-Janeiro, Glaziou, n° 1784. — Port du *Ph. Thelypteris,* F., d'Europe; très-différente de l'espèce précédente, dont le port est spécial, et aussi plus petite; la souche est dressée; les pétioles sont chargés d'écailles fauves, lancéolées, à marge entière, acuminées, avec un acumen tortillé sur lui-même.

3. FLAVO-PUNCTATA, Klfss., *Enum.*, p. 108, *sub polypodio,* Fée, *Foug. et lycop. des Antill.*, p. 51. Brésil, Moricand, *in Spec. filic.*, Hook., IV, p. 239. Indiquée comme variété pinnée-pinnatifide. — Très-grande et très-belle espèce, pouvant atteindre 1 mètre et plus; les frondules sont dressées, étroitement lancéolées, crénelées (plus de 50 crénulations sur chaque marge), presque pinnatifides, terminées par une pointe piliforme; texture délicate, translucide, laissant voir par transparence de petits points arrondis d'un blanc jaunâtre. Je compte sur chaque marge environ 50 crénulations sur une largeur de 22 à 24 centim. — Glaziou, Rio-Janeiro, n° 2400. Forme étroite.

ICON. : *Tab. XXX, fig. 3* (un fragment pour établir la différence qui sépare cette espèce du *Ph. tenuis,* F.).

4. Blanchetiana, F., *Gen. filic.*, p. 245. Blanchet, Bahia, n° 2928. — Espèce très-glabre; nervilles atteignant la marge; frondules pétiolées, segments entiers. Port des *Phegopteris* d'Europe. Les grands spécimens mesurent jusqu'à 75 à 80 centim. Elle prend, par la dessiccation, une teinte rougeâtre; les frondules secondaires sont pétiolées; les segments entiers, mais légèrement denticulés au sommet.

† 5. fluminensis, F.

Frondibus pinnato-pinnatifidis, oblongis, longe petiolatis; petiolo rachique debilibus, canaliculatis, squamis mollibus, lanceolatis, acuminatis, obsitis; frondulis oblongis, sessilibus, infimis reflexis, supremis integris, medianis pinnatifidis; nervillis tenuibus, simplicibus; sporotheciis rufis, rotundatis; annulo angusto, nigrescente, 16 articulato; sporis rotundis, episporiatis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 965).

Filix pinnata, petiolo et rachibus squamosis; sporangiis laminam superiorem inquinantibus; receptaculo punctiformi.

(Longueur : 36 centim.; frondules centrales, 6-7 centim. sur 2 de largeur; le pétiole fait environ la moitié de la longueur totale; rhizome écailleux.)

Cette plante, quoique distincte spécifiquement, n'a point de caractère saillant. Elle prend, par la dessiccation, une teinte jaunâtre; le pétiole, le rachis et ses subdivisions, ainsi que le mésonèvre des segments, sont écailleux; facies européen.

6. Oreopteridastrum, F.

Frondibus pinnato-pinnatifidis, oblongo-lanceolatis, apice abrupte terminato; petiolo crasso, longo, sulcato, basi squamoso; rachi tomento griseo, brevi vestito; frondulis lanceolatis, sessilibus, cauda integra terminatis, subtus glabris, supra brevissime pilosis; segmentis obtusissimis, apice unidentatis; sporotheciis submarginantibus, rotundis, rufis; sporangiis rotundatis; annulo lato, 14-16 articulato; sporis crassiusculis, subreniformibus.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 963. Villarica, Vauthier, n° 585).

Filix magna; frondulis aliquando oppositis; nervillis simplicibus; Phegopteridem Oreopteridem Europæ facie referens.

(Longueur totale : 1 mètre 10 centim.; pinnules centrales, 14-16 sur 2-2,2 de largeur; le pétiole, qui est robuste, fait environ le tiers de la longueur totale. Nous comptons 25 paires de frondules.)

Très-belle et très-grande espèce qui se termine brusquement en pointe avec des segments entiers; les frondules sont presque opposées à la base de la fronde et ne laissent entre elles qu'un intervalle (entre-nœud) de 2,4 centim. Les nervilles sont simples; les sporothèces atteignent le sommet du segment pinnulaire et chacun d'eux en porte de 7 à 10 et même 12 par rangée. Le rachis est d'un blanc jaunâtre, canaliculé et tomenteux du côté supérieur de la lame; elle rappelle, par le port, le *Phegopteris Oreopteris* d'Europe, qui en donne une idée assez rigoureuse pour qu'il ne soit pas absolument nécessaire de la figurer. Le spécimen recueilli par M. Vauthier a des sporothèces un peu plus petits et moins rapprochés de la marge.

7. PUBESCENS, Radd., *Fil. Bras.*, p. 23, t. 34, *sub polypodio.* Raddi, Sierra da Estrella. — Pubescente, délicate, assez petite; frondules lancéolées, sessiles, les inférieures plus petites et dirigées vers le bas; segments linéaires, très-entiers, obtus, recourbés en faux; souche dressée. (N. V.)

8. TRICHOLEPIS, F.

Frondibus extensis, late lanceolatis, petiolo elato, striato, squamis rufis, piliformibus, abunde vestitis; frondulis sessilibus, acutis, lanceolatis, basi subopositis, medianis alternis, segmentis brevibus, apice leviter erosis, superne glaberrimis, inferne pallidioribus; sporotheciis crassis, rufis, 14-18, per totas lacinias, inter mesonevron et marginem evolutis; sporangiis rotundis, magnitudine mediocri, annulo 14 articulato; sporis ellipsoideis, nigrescentibus.

Habitat in Brasilia boreali ad San-Gabriel (Spruce, n° 2100).

Filix elata, basi petiolorum squamis piliformibus, numerosissimis abscondito, surculo crasso; nervillis tenuibus, marginem attingentibus.

ICON. : *Tab. XXXII, fig. 2.*

(Longueur totale : 1 mètre 20 centim.; frondules, 16-18 sur 2 centim. de largeur.)

Cette espèce sera facile à reconnaître à ses pétioles chargés d'un épais coussinet de poils roussâtres, longs d'un centimètre et plus, un peu élargis inférieurement et atténués en une longue pointe sétacée; elle est fort vigoureuse et les frondes naissent d'une grosse souche, chargée des mêmes écailles que le pétiole.

9. RIVULORUM, Radd., *Fil. Bras.*, p. 23, t. 35, *sub polypodio. Phegopteris rivulorum,* F.; Rio-Janeiro, Raddi; Glaziou, n° 2361; elle y abonde. — Frondes étroitement lancéolées, finissant en une longue pointe; elle se termine par une dégradation ménagée des frondules qui sont sessiles, en pointe aiguë,

très-glabres et un peu cartilagineuses ; les segments n'atteignent pas la marge, ils sont arrondis, très-nombreux, ainsi que les frondules, celles-ci opposées ou presque opposées. Le pétiole est très-court et de couleur paille, ainsi que le rachis; souche dressée.

10. FALCICULATA, Radd., *Fil. Bras.*, p. 24, t. 36[2], *sub polypodio. Phegopteris falciculata*, F. — Frondes longuement pétiolées; sporothèces presque ronds, déterminant une petite fossette sur la lame supérieure; elle est glabre avec un stipe quadrangulaire, légèrement velu vers la partie supérieure. — Trouvée par Raddi, qui la dit rare, dans la Sierra da Estrella; revue à Bahia par Blanchet en 1857.

** *Formes à frondes larges.*

11. MACROPTERA, Klfss., *Enum. filic.*, p. 111, *sub polypodio*; *Phegopteris macroptera*, F.; *Gen. filic.*, p. 243; Rio-Janeiro, de Gestas; Claussen; n° 111; Glaziou, n°s 958 et 1676. — Très-belle et très-grande espèce, oblongue, ne portant qu'un assez petit nombre de frondules dont les segments sont obtus, ciliés, courbés en faux. La nervation présente, comme particularité propre à faire reconnaître la plante, des nervilles basilaires qui forment la lettre *V* et qui, quelquefois, s'unissent en anneau. Le *Phegopteris macroptera* ne saurait être confondu avec le *Ph. formosa* de Raddi, lequel prend place parmi les espèces bipinnées.

12. TENUIS, F.

Frondibus in ambitu oblongis, glabris; petiolo sulcato, longo, squamoso, squamis fulvis, lanceolatis, acuminatis, integris; frondulis inferioribus majoribus, lanceolatis, longe acuminatis, sessilibus, margine integris, basi superne truncatis, segmentis brevibus, dentibus crassis, curvatis, simulantibus; nervillis simplicibus, brevibus, marginem non attingentibus; sporotheciis 4-6 serialibus, rotundis, rubescentibus; sporangiis rotundis, annulo lato, 20 articulato; sporis ovideis, crassis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 964).

Filix magna; frondibus suboppositis; petiolo rachique helveolis; textura delicatula.

ICON.: *Tab. XXX, fig. 1.*

(Longueur: 70 centim.; pinnules, 16 centim. sur 2,5 de largeur; les entre-nœuds mesurent environ 3 centim.)

Cette fougère est transparente et souple; la texture du tissu est délicate; les frondules sont comme dentées, à dents tronquées; les nervilles, simples et très-courtes, se terminent assez loin de la marge; chaque segment porte deux rangées de 4-6 sporothèces; elle est parfaitement glabre.

† 13. DENTICULATA, F. Rio-Janeiro, Glaziou, n° 2400, *partim.* — Nous n'avons qu'une fronde stérile; elle est souple, translucide, très-mince; le pétiole et le rachis sont stramineux et écailleux; les frondules lancéolées, sessiles, s'allongent en une pointe dentée en scie, la base est inégale avec un segment supérieur assez long et un inférieur très-court; les segments, obtus et ovoïdes, sont dentés dans toute leur étendue.

ICON.: *Tab. XXXII, fig. 2.*

† 14. HETEROCARPA, F.

Frondibus oblongis, glabris, petiolo robusto, striato, squamoso; squamis lanceolatis, acuminatis, brunneis; rachi depresso, striato, squamis linearibus, parce obsitis; frondibus lanceolatis, crenatis, oppositis, sessilibus, subpetiolatis, aliquando connatis et tunc basi leviter decurrentibus, supremis pinnatifidis; segmentis curvatis, irregulariter crenato-dentatis; nervillis simplicibus, brevibus, marginem non attingentibus; sporotheciis rotundis, ovoideis, fuscis, receptaculis linearibus, super laminam superiorem fossicula lineari indicatis; sporangiis parvulis, succineo colore, pedicello longo, annulo 14 articulato; sporis ovoideis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2401).

Filix magna, diversitate sporotheciorum, brevitate nervillarum, fossicula laminæ superioris, præsentia sporotheciorum determinata, amplissime notata.

ICON.: *Tab. XXX, fig. 2.*

(Longueur totale: 1 mètre 30 centim., dont le pétiole fait plus de la moitié; il atteint dans sa partie inférieure la grosseur du petit doigt d'un enfant; frondules, 20-22 centim. sur 3 de largeur avec des entre-nœuds de 4 centim.; il existe une dizaine de paires de frondules jusqu'au sommet, qui s'étend en une longue pointe pinnatifide.)

Cette espèce est l'une des plus distinctes du genre. Le pétiole et le rachis sont tricanaliculés, le mésonèvre des frondules est aplati; celles-ci sont connées vers le haut, où elles tendent à devenir arquées; le tissu de la fronde permet de voir par transparence une multitude de petits points ronds, pellucides; les sporothèces, quadrisériés et de forme très-variable, sont portés sur un réceptacle linéaire, indiqué sur la lame supérieure par une petite dépression.

II. *Frondes bi-tripinnées.*

15. SPLENDIDA, Klfss., *Enum. filic.*, p. 112, *sub polypodio. Phegopteris*, F., *Gen. filic.; Polypodium formosum*, Radd., *Fil. Bras.*, p. 25, t. 38; Raddi, au Corcovado; Brésil, Martius, Gardner; Rio-Janeiro, Glaziou, n°s 394 et 966. — Grande espèce, glabre, un peu coriace, très-dilatée, à segments crénelés; les sporothèces sont trisériaux et très-gros; les spores ont une forme ovoïde et une couleur noirâtre.

16. CONNEXA, Klfss., *Enum. filic.*, p. 120, *sub polypodio;* Mart., *Icon. crypt. Bras.*, p. 90, t. 65; *ejusd. Herb. Bras.*, n° 327; *Phegopteris connexa*, F.; *Gen. filic.*, p. 243. — Grande espèce glabre, à segments crénelés et à consistance mince; les sporothèces sont bisériaux; elle prend dans les herbiers une teinte rougeâtre.

17. CANESCENS, Kze., *Herb.;* Metten., *Phegopteris*, p. 30; Bahia, Blanchet, n° 2454. — Grande espèce, incane, ayant, après dessiccation, un aspect grisâtre; le pétiole est vigoureux, pluricanaliculé; les frondules secondaires sont pétiolées, pinnatifides, avec des segments crénelés, qui, vers la base, tendent à devenir obtus et légèrement arqués; le tissu est mince et souple; les nervilles, très-déliées, n'atteignent pas la marge.

18. SUBINCISA, Mart., *Icon. crypt. Bras.*, p. 89, t. 64, *sub polypodio; Phegopteris incisa*, F.; *Gen. filic.*, p. 243, Martius; province Saint-Sébastien, Minas-Geraes, Rio-Janeiro, Glaziou, n° 393. — Martius en fait une fougère arborescente; elle est sans doute tripinnée, ce que ne démontrent ni nos spécimens ni la planche citée.

19. MOLLI-VILLOSA, F., *Polypodium subincisum;* Mart., *Herb. Bras.*, n° 320, *in Herb. F.*, *non* Mart. *in Icon. crypt. Bras.*, p. 89, t. 64. — Diffère évidemment de la fougère figurée par Martius (*l. c.*). Willdenow écrit *frondibus glabris* et elles sont ici couvertes de poils mous et soyeux. Elle ne saurait être arborescente et notre spécimen authentique en démontre l'impossibilité. Le pétiole est très-long, très-gros, fortement sillonné, ainsi que le rachis, dont les divisions de 2e ordre sont tomenteuses; les frondules sont oblongues et portent inférieurement des frondules de 2e ordre, à segments crénelés, tandis qu'ils sont entiers supérieurement; le pétiole, à la base, atteint la grosseur du petit doigt; il mesure 60 centim. dans notre spécimen.

20. CAUDATA, Klfss., *Enum. filic.*, p. 113, *sub polypodio;* Radd., *Filic. Bras.*, p. 25, t. 39; *Phegopteris caudata*, F., *Gen. filic.*, p. 243; Brésil, Raddi, au Corcovado; Claussen, n° 133 (H. F.); Gardner, n° 131; Rio-Janeiro, Glaziou, n°s 395 et 2396. — Très-grande espèce fort élégante, à pétiole et à segments lisses, gramineux, très-glabres. Les frondules, terminées en une longue pointe dentée, sont opposées, sessiles, avec des segments étroits, arqués, aigus et fortement crénelés. Notre spécimen, sans le pétiole, mesure 75 centim. Le pétiole et le rachis sont écailleux.

† 21. SCROBICULATA, F.

Frondibus amplissimis, patulis; frondulis primariis breve petiolatis, rufo-brunneis, sulcatis, supra leviter tomentosis, infra glabris, oblongis, cauda fertili, integra, angulata terminatis; frondulis secundariis lanceolatis, caudatis, pinnatifidis; rachi et nervillis furcatis, tenuibus, rufescentibus; sporotheciis rotundis, marginantibus, flavescentibus, receptaculo globoso, prominente et super laminam superiorem scrobiculo parvulo indicatis; sporangiis rotundis; annulo 14-16 articulato; sporis numerosissimis, parvulis, ovoideis, fuscis, tenuissime papillosis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n°s 1780 et 2066).

Filix magna, glabra, frondulis primariis et secundariis alternis; nervillis rufis, superficialibus, oculo nudo perspicuis.

ICON.: *Tab. XXXI, fig. 2.*

(Longueur des frondules primaires, 50-54 centim.; des secondaires, 14-16 centim. sur une largeur de 3 centim. au centre; le rachis est gros comme une plume de cygne.)

Cette belle fougère est très-ample; les frondules primaires sont pétiolées et les secondaires sessiles; les rachis sont rufescents. On la reconnaîtra facilement: 1° à ses nervures visibles à l'œil nu du côté inférieur de la lame inférieure seulement et colorées en brun-rougeâtre; 2° à ses sporothèces indiqués par une dépression très-marquée, colorée en brun, très-visible sur la lame supérieure; 3° enfin à la nerville basilaire interne, dont les deux branches sont bifurquées, ce qui leur donne une apparence géminée.

† 22. ERIOPODIA, F.

Frondibus amplissimis, rachibus secundariis tomentosis; frondulis primariis oblongis, acutis, basi pinnatis, dein adnatis; frondulis secundariis lanceolatis, sessilibus, glabris, mesonevro tenui, rubricoso; nervillis simplicibus, omnibus fertilibus, marginem non attingentibus; sporotheciis rufescentibus,

4-6 serialibus, receptaculo prominente, laminam superiorem inquinantibus; sporangiis rotundis, annulo 12-14 articulato; sporis rotundo-ovoideis, leviter papillosis, atris.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2397).

Filix ampla, dilatata; petiolo basi incrassato, canaliculato, lana spissa, fulva cooperto; frondulis secundariis basi inferiori decurrentibus.

Icon. : *Tab. XXXI, fig. 3.*

(Longueur des frondules primaires, 36-40 centim.; frondules secondaires, 8-9 au centre.)

Cette espèce ne se distingue que par la base de son pétiole, qui est renflé, de la grosseur du petit doigt d'un enfant et couvert d'un épais coussinet laineux, jaunâtre, formé d'écailles étroitement linéaires, mêlées à de véritables poils, très-longs et ondulés.

† 23. ADNATA, F., Rio-Janeiro, Glaziou, n° 2398. — Cette espèce est moins grande que la précédente; les frondules de 2e ordre, à l'exception des deux ou trois paires inférieures, sont attachées par toute leur base, qui est décurrente du côté inférieur. La diagnose microscopique est la même; ici les frondules de 2e ordre sont plus rapprochées, plus courtes, à crénulations moins profondes; elles ont aussi une consistance plus ferme; l'épiderme des frondes est évidemment granuleux. — Sporothèces 3-4 sériaux. Cette espèce est très-légèrement villeuse et les marges portent quelques cils.

† 24. PROPINQUA, F., Rio-Janeiro, Glaziou, n° 2399. — Cette fougère est établie sur le même type que les deux précédentes; elle est glabre avec un épiderme très-finement granuleux; ce qui la distingue spécifiquement, ce sont les frondules secondaires terminées par une longue pointe triangulaire, à marge entière; les sporanges offrent ce caractère singulier de s'entourer de fibrilles linéaires, ondulées, qui, sans doute, partent du réceptacle. Celui-ci occupe une dépression dont on devine l'existence à un petit boursouflement, teinté de brun, très-apparent sur la lame supérieure.

Icon. : *Tab. XXXII, fig. 3.*

III. *Frondes pluripinnées.*

25. SPECTABILIS, Klfss., *Enum. filic.*, p. 121, *sub polypodio;* Metten., *Filic. Hort. Lips.*, p. 83, t. 17, f. 10 (fragm.), *Phegopteris spectabilis,* F.; *Gen. filic.*, p. 243, Rio-Janeiro, Glaziou, n° 967. — Cette belle et très-grande espèce est remarquable par les amas d'écailles rubanées qui se trouvent à la bifurcation des

principales divisions des frondes et de leur rachis; elle est glabre et à nervilles bifurquées.

26. EPIREOIDES, F., *Gen. filic.*, p. 248; Rio-Janeiro, Glaziou, n° 2395. — Nous avons (*l. c.*) indiqué cette espèce plutôt que décrite. Elle est fort grande, tripinnée, glabre avec des rachis et des mésonèvres tomenteux. Les sporothèces sont assez gros; l'anneau des sporanges est large et porte de 12 à 14 articulations; spores arrondies, noires et papilleuses. Le nom spécifique exprime qu'elle est tomenteuse; elle a, en effet, ce caractère sur le rachis et ses partitions.

27. DIVERGENS, Sw., *Syn. filic.*, p. 73, *sub polypodio;* Willd., *Filic.*, p. 209. *Polypodium effusum*, Sw., *l. c.*, p. 41; Willd., *Filic.*, p. 208. *Phegopteris effusa* et *divergens*, F., *Gen. filic.*, p. 243. Brésil, Gardner, n° 120; Claussen, n°s 113, 128 et 213; Blackenridge, n° 31. Rio-Janeiro, Glaziou, n°s 387, 960 et 2392. — Cette espèce, très-divisée, est parfois gemmifère; le pétiole est glabre, mais les subdivisions du rachis, déprimées, portent un sillon, relativement assez large, occupé par un tomentum roussâtre. On le trouve dans les spécimens indiqués comme *effusa*, ainsi que dans ceux déterminés comme *divergens*. L'examen le plus attentif ne fait trouver entre ces fougères aucune différence qui permette même d'établir pour elles une simple sous-variété. Swartz et Willdenow ne les avaient, du reste, séparées qu'avec doute. (*Voy.* Schkh., *Crypt. Gew.*, p. 27. *Polyp. divergens*, t. 26 B, et *P. effusum*, *l. c.*, t. 26 *c.*)

28. MARGINANS, F.

Inermis; frondulis primariis oblongo-lanceolatis, inæqualibus, breve petiolatis, acuminatis, alternis, apice curvatis; rachi et racheolis infra squamosis et supra breve tomentosis; squamis angustis, rufis; frondulis secundariis lanceolatis, apice sterili undulato; segmentis glabris, obtusissimis, undulatis; sporotheciis distantibus, marginantibus, 3-5 per singulas series; sporangiis rotundis, longe pedicellatis; annulo obliquo, 18 articulato; sporis subtrigonis, nigrescentibus.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 1631).

Filix flexibilis, sporotheciis remotiusculis notata.

ICON.: *Tab. LXI, fig. 1.*

(Longueur des frondules primaires, 30-36 centim.; frondules secondaires, 8 centim. sur 2 de largeur.)

Cette espèce se fera facilement reconnaître à ses rachis écailleux et à ses segments frondulaires glabres, crénelés dans le voisinage du pétiole, qui est très-court, et surtout à ses sporothèces écartés les uns des autres et tout à fait rapprochés de la marge. Les deux lames sont concolores. Elle a le port de l'*Alsophila aspera*, mais elle est inerme et l'anneau des sporanges n'est point oblique.

Il existe, très-vraisemblablement, quelques autres *Phegopteris* brésiliens; tels sont, par exemple, un *Ph. brevinervis*, F., récolté par Claussen, qui se rapproche du *Ph. molli-villosa*, étant bipinné, glabre, à pinnules secondaires sessiles et décurrentes; enfin un *Ph. organensis*, F., Glaziou, Serra os Orgaos, n° 2821, pluripinné, glabre, à frondules de 3e ordre, terminées en queue; espèce surtout remarquable par des segments crénelés dans la partie inférieure de la frondule et à marge entière vers le haut.

Ce genre, à ne consulter que l'absence de l'indusium, devrait se grossir des *Polystichum* phégoptéroïdes. Nous nous sommes décidé en faveur du *facies*, tellement semblable à celui des *Polystichum*, que nous leur avons donné place parmi les espèces de ce genre. M. Glaziou a constaté que l'indusium n'existait pas, et vainement l'a-t-il cherché sur les sporothèces en voie de formation, sur des frondes qu'il a bien voulu nous transmettre. (Janvier 1869.)

Nous avons fait remarquer, ailleurs, que plusieurs espèces de fougères, regardées comme des *Gymnogramme*, devaient rentrer dans les *Phegopteris*, dont elles ne diffèrent que par l'élongation plus ou moins considérable des sporothèces.

52. GONIOPTERIS, Presl., *Tentam. pterid.*, p. 181.

1. PROLIFERA, Klfss., *Enum.*, p. 107, *sub polypodio. P. viviparum*, Radd., *Fil. Bras.*, p. 22, t. 32. *Goniopteris fraxinifolia*, Presl., *Tent. pterid.*, p. 182. Minas-Geraes, Claussen, nos 112 et 122 (H. F.). Rio-Janeiro, Glaziou, au Corcovado, nos 409, 1643 et 1685; ce dernier spécimen est à l'état prolifère; île Sainte-Catherine, H. Gauthier, à Desterro. — Sporanges de médiocre grosseur, glabres; anneaux portant 16-18 articulations; spores légèrement réniformes, assez grosses.

2. TETRAGONA, Presl., *l. c. Polypodium tetragonum*, Sw., *Syn. filic.*, p. 37. Var. *c: tetragonoides*, F., *Hist. foug. et lyc. des Antill.*, p. 63. Brésil, Mart., *Herb. Bras.*, n° 319; Luschnath, n° 19 (H. F.). — Sporanges glabres, 12-14 articulations à l'anneau; poils trifides sur le rachis et ses divisions.

† 3. MACROCLADIA, F.

Frondibus pinnato-pinnatifidis, rachi quadrangulari, flaccido, pilosulo; frondulis suboppositis, breve petiolatis, longissimis, flexuosissimis, linearibus, acuminatis; mesonevro subtus glabro, supra piloso, anguste canaliculato; segmentis numerosis, oblongis, obtusissimis, ciliatis; sporotheciis confluentibus, rotundis, areola basilari sæpe fructifera; sporangiis crassis, glabris, annulo 16-18 articulato; sporis crassissimis, centro depressis et tunc marginem crassum circumdantibus.

Habitat in insula Santa-Catharina *ad urbem* Desterro (Alburquerque).

Filix flexibilis; frondulis linearibus longissimis, flaccidis notata.

ICON.: *Tab. XXXIII, fig. 3.*

(Longueur des frondules, 33-35 centim. sur 2-5 centim. de largeur.)

Cette espèce sera facile à reconnaître à ses longues frondules, très-souples, terminées en pointe, à ses segments nombreux, plus de 40, très-faiblement arqués, à marge ciliée, aux deux tiers libres, laissant entre eux un sinus terminé en pointe à la base; les segments basilaires sont à peine plus petits que ceux du centre. Les nervilles sont très-rapprochées, 12 environ sur un segment de 12 millim.

† 4. PLATYPES, F.

Frondibus pinnatis, oblongis, glaberrimis; petiolo plano, virescente, rachi decrescente, apice frondium filiformi; frondulis lanceolatis, basi cuneiformibus, apice acuminatis, marginibus crenato-undulatis, crenis unidentatis, membranula inter se coalitis; mesonevro tenui, nervillis elongatis, tenuibus; duabus conniventibus; sporotheciis parvis, quadriseriatis, remotiusculis; sporangiis parvulis, glabris; annulo 12-14 articulato; sporis rotundis, nigris.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2402).

Filix elongata, petiolo depresso; rachi undulato, tenui; rhizomate crasso, squamis linearibus, fulvis vestito.

ICON.: *Tab. XXXIII, fig. 1.*

(Longueur : 1 mètre et plus jusqu'au sommet de la frondule terminale, qui atteint 18 centim. sur 3 centim. de largeur, dimension très-peu supérieure à celle des frondules centrales; entre-nœuds, 3,5 à 4 centim.)

Cette espèce est la plus grande du genre; les frondules sont papyracées; le pétiole est aplati dans sa moitié inférieure et canaliculé vers sa moitié supérieure. Nous comptons 12 paires de frondules. Elle est fort distincte.

† 5. HASTATA, F.

Frondibus in ambitu lanceolatis, glabris, petiolo rachique tenuiculis, sulcatis flaccidisque; frondulis sessilibus, hastato-lanceolatis, acuminatis, alternis, infimis, suboppositis, acumine integro, areola unica basilari; sporotheciis rotundis, mesonevro approximatis, tabacinis, in quavis lacinia biserialibus 8-10; sporangiis ovatis, annulo 20 articulato, sæpe pilis furcatis coronato; sporis satis magnis, ovoideis.

Habitat in Bahia (Blanchet, 1836).

Filix extensa, glabra, frondulis sessilibus, basi hastatis.

ICON. : *Tab. XXXIII, fig. 2, ad tertiam partem reducta.*

(Longueur : 65 centim., dont le pétiole fait la 6e partie; frondules, 8-9 centim. sur 1,6 centim. de largeur; entre-nœuds, un peu moins de 4 centim.)

Cette fougère est glabre, élancée, flexible, à pétiole et rachis grêles; les sporanges portent souvent sur l'anneau un poil bifurqué.

NB. On n'a, jusqu'à présent, trouvé au Brésil que ces cinq espèces de *Goniopteris*, tandis qu'il en existe dix-huit aux Antilles. Ce fait de géographie botanique méritait d'être noté.

53. GONIOPHLEBIUM, Presl., *Tent. pterid.*, p. 186.

* *Polylépidées* (POLYPODIASTRUM).

1. INCANUM, J. Sm., *Journ. bot. Lond.*, IV, 56. *Marginaria incana*, Presl., *Tent.*, p. 188. Martius, Sebastianopolis. Glaziou, Rio-Janeiro, n° 973. Sainte-Catherine, H. Gauthier. — Fougère très-répandue sous les tropiques et à l'équateur; ses frondules sont assez mobiles.

   β *minor. Marginaria minima*, Bory, *Crypt. Voy. de la Coquille*, p. 264, t. 31, f. 2.

2. MICROLEPIS, F., 6e *Mém.*, p. 8, t. 6, f. 2, *sub polypodio*. Brésil, à Sainte-Catherine, par H. Gauthier. — Nous avons décrit cette jolie espèce sur un spécimen dont la patrie était seulement indiquée comme américaine; aujourd'hui nous indiquons une localité précise.

3. CETERACCINUM, F. Ile Sainte-Catherine, H. Gauthier. — Cette forme du *G. incanum* a des segments courts, ovoïdes, attachés au rachis par une large base; elles prennent, dans leur ensemble, l'aspect ondulé des frondes du *Ceterach*

officinarum. C'est là, sans doute, le *Polypodium ceteraccinum* de Michaux, *Fl. Amériq. boréale,* II, p. 271.

4. LEPIDOPTERIS, Th. Moor., *in Indice,* p. 392, *Syn. exclus. pro parte. Acrostichum lepidopteris,* Langsd. et Fisch., p. 5, t. 2. — Cette espèce, trouvée à l'île Sainte-Catherine, du Brésil, par Langsdorff et Fischer, nous a été envoyée, en 1866, de la même localité, par M. H. Gauthier, et de Rio-Janeiro, par M. Glaziou, sous le n° 1221. Elle ne saurait être confondue avec l'espèce suivante.

5. HIRSUTISSIMUM, F., *Marginaria,* Presl., *Tent. pterid.*, p. 189. *Polypodium hirsutissimum,* Radd., *Fil. Bras.*, p. 17, t. 26. Brésil, Radd.; Glaziou, Rio-Janeiro, n°s 976 et 977; à Tijuca, près de Rio, n° 2069; à Sainte-Catherine, par H. Gauthier. — Espèce très-distincte.

Var. β *angustior.* Pectinée, très-raide et très-écailleuse.

NB. Les fougères qui constituent ce petit groupe ont une synonymie fort étendue et fort confuse. Elles sont écailleuses comme les *Pleopeltis;* avec le port des *Polypodium* à frondes pinnatifides; chez les plus étroites il est très-difficile de constater l'union des nervilles.

** *Oligolépidées* ou *glabres* (EUGONIOPHLEBIUM).

A. *Frondes pinnatifides.*

6. XIPHOPHORUM, Kze., *Herb.;* Metten., *Polyp.*, p. 73. Brésil, Pohl. — Espèce rampante, coriace, glabre, profondément pinnatipartite, segments atténués au sommet. (N. V.)

7. CATHARINÆ, J. Sm., *Bot. mag.*, 72. *Polypodium Catharinæ,* Fisch. et Langsd., *Icon.*, p. 9, t. 9. *Marginaria,* Presl., *Tent. pterid.*, p. 188. Brésil, Sainte-Catherine et Serra os Orgaos; par divers.

8. PECTINATUM, J. Sm., *Bot. Her.*, I, 230. Brésil, San-Gabriel, Spruce, n° 2324; Nouvelle-Grenade, Schlim., n° 636. (H. F.)

9. LATIPES, J. Sm., *l. c. Marginaria,* Presl., *Tent. pterid.*, p. 188. *Polypodium latipes,* Langsd. et Fisch., *Icon. filic.*, p. 10, t. 10. Willd., *Filic.*, p. 170. Brésil, Claussen; île Sainte-Catherine, Gaudichaud, n° 37 (*marginibus repando-subdentatis*); H. Gauthier; Glaziou, Rio-Janeiro, n°s 397 et 1659, et à Copocabona, au bord de la mer, n° 2068.

10. LÆTUM, J. Sm., *Bot. Her.*, I, 231; *Marginaria*, Presl., *Tent. pterid.*, p. 188; *Polypodium lætum*, Radd., *Fil. Bras.*, p. 19, t. 28; Serra os Orgaos; Rio-Janeiro, Glaziou, n° 1726, spécimen mesurant 90 centim. dont le pétiole fait les 2 cinquièmes. Les sporothèces impressionnent la lame supérieure.

11. LORICEUM, J. Sm., F., *Gen. filic.*, p. 255; *ejusd. Hist. foug. et lycop. des Antill.*, p. 67; *Polypodium loriceum*, L., *Sp. pl.*, 1546; Metten., *Fil. Lips.*, p. 32, t. 23, f. 7-9 (*fragm.*); Lowe, *Ferns*, II, t. 30; Serra os Orgaos, Gardner, n° 121.

12. CHNOODES, Spreng., *Syst.*, IV, p. 53, *sub polypodio;* F., *Hist. foug. et lycop. des Antill.*, p. 67. Brésil. — Espèce à tort réunie par quelques auteurs au *G. dissimile*, dont les frondes sont pinnatifides.

† 13. PECTINANS, F.

Frondibus pinnatis, glaberrimis, coriaceis, rigidis, oblongis; petiolo longo, lævi, luteolo; frondulis linearibus, oppositis, apice alternis, obtusiusculis, opacis, adnatis; sporotheciis biserialibus, in medio laminarum evolutis; nervilla basilari extra-axillari, fertili; sporangiis rotundis; annulo 12 articulato; sporis subreniformibus.

Habitat in Brasilia (Claussen, Herb. F.).

Filix pectinata; frondulis obtusiusculis, approximatis.

ICON. : *Tab. XXXIV, fig. 1.*

(Dimensions : longueur, 42 centim. sur 10 d'envergure; le pétiole fait les 2 tiers de la longueur totale. Les frondules n'ont que 4-5 millim. de largeur.)

Cette espèce se distingue à ses frondules exactement opposées dans presque toute l'étendue de la fronde; elles sont élargies à la base, au nombre de plus de trente paires, doublement auriculées, formant des sinus de 2 à 3 millimètres d'ouverture; le rhizome est courbé et écailleux; les écailles, qui sont lancéolées et acuminées, lui donnent un aspect crépu. Les frondes sont assez rapprochées et articulées, ainsi qu'en témoignent les débris des pétioles qui persistent. Nous lui donnons le nom de *pectinans* pour indiquer ses rapports avec le *G. pectinatum*, dont notre espèce est, du reste, très-distincte.

Dans le *G. pectinatum*, J. Sm., *Bot. Herit.*, I, 230, les écailles du rhizome sont cancellaires; nous comptons seulement 14 rangées de sporothèces sur chaque segment, tandis que, dans notre espèce, il en existe au delà de 20. Dans le *G. arcuatum*, F., les segments sont arqués et les inférieurs réfléchis. Au reste, ces trois espèces appartiennent à un même type.

† 14. GRAMMATOIDES, F.

Frondulis oblongis, glaberrimis, rigidis, coriaceis; petiolo et rachi helveolis, lævibus, nec canaliculatis, nec striatis; frondulis anguste lanceolatis, acutis, inferne leviter contractis, adnatis, approximatis, assurgentibus; marginibus anguste cartilagineis; nervatione pellucida, nervillis liberis apice incrassatis; areolis nervillam rectam fructiferam ferentibus; sporotheciis crassis, oblongis, approximatis, receptaculo ovoideo, terminali, pellucido; sporangiis ovoideis, annulo crasso, 14 articulato; sporis lævibus, semi-ovoideis.

Habitat in Rio-Janeiro (Glaziou, n° 1222).

Filix elegans; sporotheciis oblongis, approximatis, sed semper distinctis; rhizomate crasso, longo repente, squamis fulvis, oblongis, cancellatis obsito.

ICON. : *Tab. XXXIV, fig. 2.*

(Longueur : 65 centim. avec le pétiole, qui mesure 25 centim.; les frondules inférieures, qui sont les plus grandes, s'élèvent à 12 centim. sur 10-12 millim. de largeur; le rhizome est de la grosseur du petit doigt; les frondes qui s'y attachent sont écartées les unes des autres.)

Cette espèce élégante a une teinte jaune après dessiccation; les frondules inférieures sont arquées et légèrement obtuses. Elle diffère de toutes ses congénères par la nervation et par la situation des sporothèces, qui naissent au sommet d'une nerville droite renflée en un réceptacle globuleux, pellucide. Les sporothèces, en outre, sont manifestement ovoïdes, et la nerville libre basilaire toujours stérile.

B. *Frondes pinnées.*

15. MENISCIFOLIUM, Langsd. et Fisch., *Icon. filic.*, p. 11, t. 12, *sub polypodio; Goniophlebium*, F., *Gen. filic.*, p. 155; *Marginaria*, Presl., *Tent. pterid.*, p. 189, t. 7, fig. 31 et 32 (*fragm.*); Langsd. et Fisch. à Sainte-Catherine; Rio-Janeiro, Pohl (*Herb. Vindob.* et H. F.); Luschnath à Bahia, et Glaziou, n° 2404. — Grande espèce assez rare, prenant une teinte olivâtre par la dessiccation; elle exhale une très-agréable odeur de violette qui persiste dans les herbiers; les frondes sont membraneuses, minces et assez souples.

16. NERIIFOLIUM, Schkh., *Crypt. Gew.*, p. 14, t. 15, *sub polypodio; Marginaria*, Presl., *Goniophlebium;* J. Sm. *in* Hook., *Journ. bot.*, IV, 67; F., *Gen. filic.*, p. 255, t. 24 B, f. 2; Bahia, Salzmann, n° 753 (1830); Mart., *Herb. Bras.*, n° 306; Moricand à la Jacobine, n°s 1792 et 3372 (H. F.); Gardner, n°s 26 et 1219; San-Gabriel, Spruce, n° 2269; Glaziou, Rio-Janeiro, n°s 397, 408,

1641, 1656 et 2403; au bord de la mer à Gavia, nos 1655 et 2405, et à Copocabona, no 2067. — Cette espèce est très-répandue au Brésil, et il se pourrait que parmi les numéros cités de M. Glaziou il y eût des formes spécifiques. Les frondules sont très-fermes, cartilagineuses, redressées ou étalées, toujours plus étroites que dans l'espèce précédente, les sporothèces tachent en noir les lames inférieures à leur point d'évolution. Les spécimens nos 1792 et 3372 de la collection Moricand ont de larges frondules très-voisines par le facies de la planche donnée par Langsdorff et Fischer pour le *G. meniscifolium*. Le nom spécifique attribué à cette fougère rend compte d'une analogie de forme qui n'est pas réelle :

* *Frondulæ erectæ*, EUNERIIFOLIUM : Martius, *Herb. Bras.*, no 306; Rio, Glaziou, nos 397, 408, 1641, 1656.

** *Frondulæ patulæ :* Moricand à la Jacobine, nos 1793 et 3372; Glaziou, nos 2067 et 2405.

17. FRAXINIFOLIUM, Jacq., *Coll.*, vol. III, *Icon. pl. rar.*, 639, *sub polypodio; Polypodium distans,* Radd., *Fil. Bras.*, p. 21, t. 31; *P. triseriale,* Sw. *in* Schrad. *Journ.*, 1800, II, p. 26; *P. deflexum,* Lowe, *Ferns*, I, t. 45; *Goniopteris,* Pr., *Tent. pterid.*, p. 182; *Goniophlebium*, J. Sm., *Cat. Ferns,* 3; Regnell, I, 473; Glaziou, nos 1729 et 2411. — Sporothèces fort gros, distants, quadrisériaux; déprimant légèrement la lame; sporanges portées sur un long pédicelle grêle; anneau étroit; spores étroites, recourbées sur elles-mêmes d'une manière souvent extraordinaire. Le rhizome, assez délié, est rampant.

18. DISSIMILE, Linn., *Sp. pl.*, 1549, *sub polypodio;* Schkh., *Crypt. Gew.*, p. 14, t. 14. Brésil, Guillemin, no 99; Para, Spruce, nos 12* et 736. — Espèce très-différente du *G. chnoodes,* Spr., dont les frondes sont pinnées.

19. ALBO-PUNCTATUM, J. Sm., *Bot. mag.*, 1846, *comp.* 12; *Polypodium,* Radd., *Fil. Bras.*, p. 21, t. 30. — Serra os Orgaos. M. Hooker, *Spec. filic.*, IV, p. 27, le réunit au *G. meniscifolium,* à l'exemple de M. Mettenius; nous ne saurions adopter cette opinion.

20. HIRSUTULUM, Th. Moor., *in Ind.*, p. 390; *Polypodium,* Radd., *Fil. Bras.*, p. 21, t. 29, f. 2. — Plante mal connue.

21. RHIZOCAULON, Presl., *Tent. pterid.*, p. 186; *Polypodium Richardii*, Klotz, *Linnæa*, XX, p. 394; *P. rhizocaulon*, Willd., *Fil.*, p. 196. — Serra os Orgaos, Gardner, n° 130. (N. V.)

22. ELATIUS, Th. Moor., *Ind.*, p. 389; *Polypodium elatius*, Schrad., *Gœtt. gel. Anz.*, 1824, 868, Brésil. (N. V.)

23. ARTICULATUM, Presl., *Tent. pterid.*, p. 186, t. 7, f. 13; *Polypodium articulatum*, Desv., *Prodr.*, p. 236; San-Gabriel, Spruce, n° 2099, et la var. β *angustifolium*, Desv., *l. c.*, indiquée au Brésil. — La nervation de cette espèce et celle de l'espèce suivante reproduisent tout à fait la nervation des *meniscium:* les sporothèces sont posés sur le sommet de l'angle que forme l'aréole prolifère; ces nervilles sont étagées et au nombre de 5-7.

† 24. GAUTHIERI, F.

Frondibus lanceolatis, glabris, rachi villoso, petiolo compresso; frondulis lineari-lanceolatis, sessilibus, approximatis; superne adnatis, basi rotundatis, apice acutiusculis; inferne punctis minutissimis, albis conspersis; superne crustulis niveis, punctiformibus carbonati calcis, ad apicem nervillarum sitis; nervillis scalpturatis, crassiusculis; sporotheciis biserialibus, partem medianam frondularum occupantibus; sporangiis rotundatis; annulo crasso, 12-14 articulato; sporis ovoideis, ad superficiem reticulatis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2406, *major*); *in insula* Santa-Catharina *Brasiliensium* (H. Gauthier, *minor*).

Filix rigida, crustulis carbonati calcis ad laminam superiorem frondium notata; siccitate nigrescit.

ICON.: *Tab. XXXIV, fig. 3.*

(45-50 centim. de longueur totale avec des pinnules de 11-13 centim. sur 2 de largeur; nous comptons au delà de 20 paires de frondules très-rapprochées.)

Cette espèce a ses nervures en relief, et toutes celles qui s'élèvent au-dessus des mailles déposent, du côté supérieur de la lame, une petite plaque ovoïde de carbonate de chaux, dont la présence est tellement constante qu'il serait possible de savoir, en les comptant, quel est au juste le nombre des mailles. Le côté inférieur est tiqueté de points blancs extrêmement nombreux et rapprochés. Les frondules sont opaques et assez raides.

Le nom de M. H. Gauthier, consul de l'Uruguay, à Desterro, qui se reproduit si fréquemment dans cet ouvrage, méritait, par gratitude, de figurer au nombre des espèces.

54. CAMPYLONEVRON, Presl., *Tentam. pterid.*, p. 189.

* *Frondes simples.*

A. *Nervation réduite à une seule courbe.*

1. ANGUSTIFOLIUM, F., *Gen. filic.*, p. 257; *Polypodium angustifolium*, Sw., *Prodr.*, p. 130, et *Syn. filic.*, p. 27; Brésil, Martius, *Herb. Bras.*, n° 309; Gardner, Serra os Orgaos, n° 136 (*partim*); Regnell, II, 317 ½; Glaziou, Rio-Janeiro, n° 959. — Sporothèces naissant à l'extrémité d'une nerville qui se détache de la côte médiane.

β *tenerum*, Glaziou, Serra os Orgaos, n° 1733; *Polyp. angustifolium*, Radd., *Fil. Bras.*, p. 14, t. 24, f. 2. — Très-souple, translucide, non convolutée par dessiccation et longuement acuminée.

B. *Nervation à deux courbes, émettant une droite fructifère.*

2. TÆNIOSUM, F., *l. c.*, *Polypodium tæniosum*, Willd., *Filic.*, p. 155; Metten., *Polypod.*, p. 82, et *Filic. Lips.*, p. 34, t. 24, f. 6 *a* et *b* (*synonym. plures rejiciendæ*); *non* Radd., *Fil. Bras.*, p. 14, t. 24, f. 2; Sainte-Catherine, Mme Fanny Gauthier. — Frondes translucides, longues, acuminées, ridées, mais non convolutées par la dessiccation; sporothèces fort gros. Le n° 1731 de M. Glaziou semble rentrer dans cette espèce, mais nous comptons trois courbes, et les frondes sont sessiles.

† 3. LEUCONEVRON, F.

Frondibus linearibus, glaberrimis, lucidulis, in petiolo desinentibus; apice longe attenuatis, margine repandis; rhizomate repente; nervillis scalpturatis mesonevroque albidis; venulis secundariis arcus duos formantibus, nervilla basilari axillari rigida; sporotheciis magnis, rufescentibus; sporangiis crassis, annulo spisso, leviter obliquo, 10-12 articulato; sporis lutescentibus, lævissimis, aspectu seminam phaseoli referentibus.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 1001).

Filix rigida, sessilis, linearis, rigida; margine incrassato, nervatione albicante.

ICON.: *Tab. XXXV, fig. 1.*

(Longueur des frondes, 40-45 centim., sur un peu moins de 2 centim. de largeur; elles sont fasciculées sur un rhizome de la grosseur d'une plume d'oie.)

Cette espèce est des plus distinctes; elle a le facies du *C. tæniosum*, mais elle en diffère absolument par la nervation. Dans notre plante il se détache du mésonèvre des nervilles, qui s'ouvrent presque à angle droit, de sorte que cette nervation est pinnée, tandis que dans le *C. tæniosum* toutes les nervilles forment des courbes anastomosées. Les sporothèces sont fort gros et rougeâtres, avec des sporanges distendues par la présence de spores nombreuses, légèrement réniformes, jaunâtres, ayant, sous le microscope, la forme de petits haricots. Le mésonèvre et les nervilles primaires sont blanchâtres.

4. LUCIDUM, Th. Moor., *Ind.*, p. 225; *Polypodium lucidum*, Beyrich, *Herb.; P. tæniosum*, Metten., *Polypod.*, p. 82, var. γ; Glaziou, Rio-Janeiro, n°s 1731 [2], stérile, et 2073, fertile. — Plante raide, brusquement pointue; frondes courtement pétiolées, luisantes, opaques et comme vernissées sur les deux faces; rhizome rampant, radicelles tomenteuses. — Elle est voisine du *C. tæniosum*, F. Les sporothèces sont assez petits.

C. *Nervation à trois ou quatre courbes.*

5. FASCIALE, Presl., *l. c.*, p. 190; *C. minus*, F., *Gen. filic.*, p. 258, et 7e *Mém.*, p. 64 et 129, t. 24, f. 3; *Polypodium lapathifolium*, Raddi, *Filic. Bras.*, p. 15, t. 24, f. 3; au Corcovado, Raddi. Rio-Janeiro, n°s 402, 2419 et 2457 (frondes obtuses); île Sainte-Catherine, H. Gauthier. — La figure donnée par Raddi reproduit une plante à fronde lancéolée, renflée au centre; notre planche (*C. minus*) se rapporte à une fronde presque linéaire; les spécimens provenant de MM. Glaziou et H. Gauthier ont tous cette forme.

† 6. FALLAX, F.

Frondulis lanceolatis, acutis, basi cuneatis, petiolo longo, depresso, bi-tricanaliculato mesonevroque helveolis; nervillis lateralibus, vix oculo nudo perspicuis; nervillis secundariis arcus quatuor constituentibus, apice paululum angulatis, nervillas rectas tres, intermediam fructiferam ferentibus; sporotheciis crassis, in duabus seriebus dispositis, una adscendente cum quatuor sporotheciis, altera descendente cum sex aut raro septem aut octo; sporangiis crassis, ovatis, annulo 24-28 articulato; sporis crassissimis, subreniformibus, lutescentibus.

Habitat in Brasilia fluminensi (Serra os Orgaos, Glaziou, n° 2819).

Filix lævissima, opaca, glaberrima; rhizomate repente, squamoso; squamis ovatis, obtusissimis.

ICON. : *Tab. XXXV, fig. 2.*

(Longueur : 40-50 centim. sur 3 environ de largeur ; le pétiole fait le tiers ou le quart de la longueur totale.)

Cette espèce, qui prend, étant desséchée, un aspect jaunâtre, se distingue très-facilement de ses congénères par l'aspect que présentent ses rangées de sporothèces, lesquelles, au lieu de former pour l'œil des séries montantes, en forment, au contraire, qui semblent descendre du mésonèvre vers la marge.

D. *Nervation à quatre ou cinq courbes.*

7. REPENS, Presl., *l. c.*, p. 190; *Polypodium repens*, Sw., *Syn. filic.*, p. 29; Metten., *Fil. H. Lips.*, p. 34, t. 24, f. 1 et 2 (*synonym. exclus.*); Brésil, Sainte-Catherine, Gaudichaud, n° 24? Regnell, I, 471. — Courbes très-prononcées, surmontées de deux droites assez longues; nervilles noirâtres en saillie. Il n'y a aucun rapport entre cette plante, très-bien figurée par Mettenius, et nos *C. Xalapense* et *Moritzianum*, *Gen. filic.*, p. 258, à courbes plus nombreuses et très-différentes.

8. DECUMANUM, F., *Gen. filic.*, p. 265; *Polypodium decumanum*, Willd., *Filic.*, p. 170; *Pleopeltis*, Presl., *Tent. pt.*, p. 187, t. 7, f. 36. — Brésil, Hoffmannsegg; Gardner, n° 1221; Para, Spruce, n° 912.

E. *Nervation à cinq ou six courbes.*

9. PHYLLITIDIS, Presl., *l. c.*, t. 7, f. 18-20; *C. repens*, Lk., *Sp. filic.*, p. 124, *non* Mettenius; *Polypodium Phyllitidis*, L., *Sp. pl.*, 1543; Sw., *Syn. filic.*, p. 28; Plumier, *Filic.*, t. 130 (exagérée dans ses dimensions); Brésil, Gardner, n° 138; Rio-Janeiro par Glaziou, n° 1730; Sainte-Catherine, Pabst, n° 221; H. Gauthier, Serra os Orgaos; Gardner, n° 136, *in parte.* — Les frondes sont élancées, acuminées, lancéolées et très-raides.

† 10. ACROCARPON, F.

Frondibus lanceolatis, acuminatis, margine repandis, basi cuneatis, decurrentibus; petiolo depresso, alato, mesonevro supra planiusculo; nervillis primariis lateralibus, apertis; nervillis secundariis arcus quatuor aut quinque formantibus, apice leviter angulatis, nervillas tres, intermediam tantum fructiferam ferentibus; sporotheciis apicilaribus tabacinis, approximatis et sæpe confluentibus; sporangiis ovoideis, annulo lato, 12-14 articulato; sporis crassis, oblongo-subreniformibus, aureis, lævissimis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Serra os Orgaos, Glaziou, n° 2801).

Filix repens, apice tantum fructifera, sporotheciis conniventibus.

Icon. : *Tab. XXXV, fig. 3.*

(Longueur: 30 centim. sur 2 environ de largeur; le pétiole fait les 2 cinquièmes de la longueur totale.)

Cette espèce est jaunâtre étant desséchée; elle a des rapports avec le *C. leuconevron*, mais ici chaque moitié de la lame porte de 4 à 5 courbes, tandis que l'espèce à laquelle nous la comparons n'en a que deux à trois; la diagnose montre aussi des différences dans les sporanges et les spores; la situation des sporothèces et la décurrence des lames qui bordent le pétiole sont caractéristiques.

F. *Nervation à sept ou huit courbes.*

11. crispum, F., *Gen. filic.*, p. 258; Luschnath, Bahia, *ad arbores*, n° 21. — Espèce mal à propos réunie au *C. nitidum*, Th. Moor., *Ind.*, p. 226.

G. *Nervation à neuf ou dix courbes.*

12. nitidum, Presl., *Tent. pterid.*, *l. c.*, p. 90, *Polypodium nitidum*, Kze., *in Martio, Herb. Bras.*, n° 303, *non* Klfss., *Enum.*, p. 92; Brésil, Goyaz, Pohl. — La plante de Pohl est peut-être distincte comme espèce; le rhizome est rampant et délié; les frondes sont papyracées; le pétiole est court et ailé, et nous comptons seulement huit courbes.

13. latum, Th. Moor., *Ind.*, p. 225; *C. nitidum*, J. Sm., *Catal. ferns*, 13; *Polypodium nitidum*, Kl., *Linn.*, XX, p. 398; Brésil, Gardner, n° 5291.

** *Frondes pinnées.*

A. *Nervation à cinq ou six courbes.*

14. decurrens, Presl., *Tent. pterid.*, p. 190; *Polypodium decurrens*, Radd., *Fil. Bras.*, p. 23, t. 33; Lowe, *Ferns*, II, t. 4. Brésil, Douglas, n° 7; Gardner, n°s 5292 et 5665; Serra os Orgaos, par le même, n° 104; au Corcovado, Glaziou, n°s 970, 1684 et 1748. — Cette plante varie beaucoup par sa consistance plus ou moins souple, par sa pointe plus ou moins longuement acuminée, par son rachis plus ou moins gros. Il serait possible que ces variations, qui s'étendent au nombre des courbes, qui pourtant n'excèdent guère 6, fussent des espèces, ce qu'on peut décider seulement dans le pays où elles croissent. Nous pouvons du moins indiquer les formes suivantes comme des variétés :

β *tenerum.* Frondes très-souples, très-longuement acuminées, tantôt pinnées et tantôt simples; marge ondulée, crénelée; pétiole évidemment décurrent; 4 courbes et plus rarement 5; rhizome rampant et délié. Rio-Janeiro, Glaziou, n° 403. Serait-ce un état jeune du type?

γ. Frondes à marge irrégulièrement crénelée. Glaziou, Rio-Janeiro, n° 2388.

δ *latifolium.* Frondes sessiles, oblongues, lancéolées, acuminées, pointe longue, ondulée, ainsi que la marge qui est blanche, étroite et cartilagineuse; le pétiole, extrêmement court, n'est pas décurrent. Dans le type, la largeur des frondules n'excède guère 3 centim.; elle atteint, dans cette variété, jusqu'à 5. Rio-Janeiro, Glaziou, n°s 404, 970 et 1749.

B. *Nervation à huit courbes.*

† 15. JUGLANDIFOLIUM, F.

Frondibus pinnatis, rachi sulcato, mesonevris robustis, rubescentibus; frondulis oblongo-lanceolatis, petiolo brevi suffultis, apice obtusiusculis, basi acutis; margine undulatis; nervillis primariis pinnatis, albidulis; nervillis secundariis octo arcus efformantibus, duas vel tres nervillas rectas ferentibus; nervilla basilari axillari; sporotheciis satis parvis; sporangiis rotundo-ovoideis; annulo lato, 12 articulato; sporis reniformibus.

Habitat in Rio-Janeiro Brasiliensium (Glaziou, n° 1750).

ICON. : *Tab. XLV, fig. 1.*

(Frondules : 30-35 centim. de longueur sur 5 de largeur.)

Nous ne possédons que la partie inférieure de cette plante, qui doit être fort grande; les frondules, presque opposées, ne sont nullement décurrentes; elle est robuste. Les sporothèces sont au nombre de 2 ou de 3, suivant le nombre de droites qui se dressent sur les courbes; nous en comptons 8; les nervilles ont une couleur noire très-prononcée.

NB. La synonymie de ce genre est inextricable, faute d'un caractère tranché, capable de séparer nettement les espèces. Nous croyons l'avoir trouvé en adoptant le nombre de courbes ou de mailles qui composent la nervation de chaque côté de la lame, à partir du mésonèvre. Ce caractère est constant et facile à constater. Mais pour mettre de l'ordre dans ce chaos, il faut faire abstraction des synonymies, les réduire considérablement et se rallier uniquement, pour les décrire, aux espèces distribuées par les botanistes collecteurs.

55. CRASPEDARIA, Lk., *Spec. filic.*, p. 117, *reductum.*

1. PILOSELLOIDES, F., *Gen. fil.*, p. 264. J. Sm. *Marginaria,* Presl., *Niphobolus,* Spr., *Polypodium piloselloides,* L., *Sp. pl.*, p. 1542; Lowe, *Ferns,* I, t. 32. Brésil, Sainte-Catherine, Alburquerque.

2. AURISETA, F., *l. c. Polypodium aurisetum,* Radd., p. 12, t. 23, f. 1. *Marginaria,* Presl., *Tent.*, p. 186. Brésil, Em. Picard; Glaziou, Rio-Janeiro, n°s 945 et 2418 (frondes un peu modifiées). Sainte-Catherine du Brésil, Alburquerque. — Les frondes sont ovoïdes, plus ou moins acuminées, quelquefois cordiformes à la base.

3. GESTASIANA, F., 6e *Mém.*, p. 15, t. 4, f. 2. Brésil, de Gestas. — Charmante espèce la plus délicate et en même temps la plus écailleuse du genre.

4. CILIATA, Lk., *Fil. sp.*, 117; *Polypodium ciliatum,* Willd., *Filic.*, 144. Nord du Brésil, San-Gabriel, Spruce, n° 2227; Para, Spruce, n° 17. — Cette plante n'a point été figurée. (N. V.)

5. VACCINIFOLIA, Lk., *Sp. filic.*, p. 117. *Polypodium vaccinifolium,* Fisch. et Langsd., *Icon.*, p. 8, t. 7; Radd., *Fil. Bras.*, p. 13, t. 23, f. 2. Brésil, Martius, *Herb.*, n° 308; Blanchet. (H. F.)

Var. β *elongata,* Glaziou, Rio-Janeiro, n° 1221.

† 6. CORDIFOLIA, F.

Frondibus sterilibus rotundo-ovoideis, cordatis, breve petiolatis, glabris, membranaceis, siccitate rufescentibus, areolis circum marginem tantum evolventibus; fertilibus linearibus, obtusis, in petiolo desinentibus, siccitate nigrescentibus; sporotheciis crassiusculis, centralibus, totam laminam occupantibus; sporangiis crassis, ovoideis; annulo crassissimo, articulis 16-18, spissis; sporis ellipticis seu raro leviter reniformibus.

Filix caulibus undulatis, parce ramosis, squamosis; squamis patulis, rufis, angustissimis.

Habitat in Brasilia, insula Santa-Catharina (H. Gauthier).

Filix frondulis remotis; sterilibus cordatis, fertilibus linearibus, obtusiusculis.

ICON.: *Tab. XXXVI, fig. 1.*

(Frondes stériles, 17-18 millim. de diamètre; les fertiles, 4 centim. sur 4 millim. de largeur; les tiges ont la grosseur d'une petite ficelle.)

Nous avons peu de chose à ajouter à la description que nous donnons ici. Les frondes stériles et les frondes fertiles se sont développées sur des tiges différentes dans notre spécimen, circonstance peut-être accidentelle. Les stériles sont presque aussi longues que larges; elles ressemblent parfaitement aux feuilles de la nummulaire, et la plante mériterait de porter ce nom spécifique, si déjà il n'avait été donné à une espèce des Philippines.

† 7. CRISPATA, F.

Frondibus sterilibus lanceolatis, obtusiusculis, in petiolo brevi desinentibus, glaberrimis, opacis, aliquando basi rotundatis; areolis basilaribus magnis, fertilibus linearibus, acutis, margine undulatis, in petiolo longissimo desinentibus; sporotheciis centralibus, remotis, laminam totam occupantibus, rufis; sporangiis crassissimis; annulo latissimo, 14-16 articulato, articulis spissis; sporis magnis, lutescentibus, reniformibus, reticulatis.

Filix caulibus rigidiusculis, ramis brevibus, squamosis, rufescentibus, squamis linearibus, crispatis, longe acuminatis.

Habitat in Brasilia (Tijuca, Glaziou, n° 2072).

Filix surculo crasso, squamis crispatis, rufis onusto.

ICON. : *Tab. XXXVI, fig. 2.*

(Frondes stériles, 6-8 centim. sur 2 de largeur; fertiles, 10-12 centim. Les tiges dénudées sont fort minces et irrégulièrement aplaties.)

Dans cette espèce, les frondes fertiles sont remarquables par leur longueur; elles portent jusqu'à 20 paires de sporothèces assez distants, qui impressionnent la lame supérieure. Les spores réticulées, à la surface, d'un beau jaune d'or, sont magnifiques d'aspect. Les écailles, très-abondantes, feraient croire à une grosseur des tiges qui est fictive. C'est, avec l'espèce suivante, une des plus grandes du genre.

† 8. GRANDIS, F.

Frondibus sterilibus lanceolatis, acutis, longe petiolatis, cartilagineis, glaberrimis; nervillis basilaribus, elongatis, nervillas rectas includentibus; areolis parvulis, circa marginem numerosis, fere pentagonoideis; fertilibus linearibus, longe petiolatis, obtusis, rigidis; sporotheciis 16-20, crassis, approximatis, rufis, in fovea nascentibus, ad laminam superiorem gibbositate indicata; sporangiis pyriformibus; annulo 12-14 articulato; sporis ut supra.

Filix caulibus ad cortices fulcris affixis; squamis arcte imbricatis, ovoideis, margine laceris.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 989).

Filix robusta, surculo crasso, frondulis cartilagineis, glaberrimis, opacis.

Icon. : *Tab. XXXVII, fig. 2.*

(Frondes stériles, 11-13 centim. sur 2 de largeur; fertiles, 9-10 centim. sur 7-9 millim. de largeur. Les tiges sont ondulées, raides, de la grosseur d'une plume de pigeon; elles s'attachent aux arbres par des crampons et émettent de courts rameaux très-écailleux.)

La nervation est fort belle et en relief. Les jeunes frondes stériles portent quelques écailles et des poils strigilleux. Les sporothèces sont logés dans une dépression de la lame, qui détermine, en dessous, une gibbosité; les sporanges sont attachées sur un réceptacle arrondi, noirâtre; elle grimpe sur les écorces et doit atteindre 1 à 2 mètres.

56. CHRYSOPTERIS, Lk., *Spec. filic.*, p. 120.

1. AUREA, Lk., *Spec. filic.*, p. 121. *Polypodium aureum*, L. Willd. *et auct. Pleopeltis aurea,* Presl., *Tent. pterid.*, p. 193. Plum., *Filic.*, p. 59, t. 76. Glaziou, Rio-Janeiro, n° 1727. — Forme à segments plus étroits que dans le type.

2. AREOLATA, Lk., *l. c. Ch. sporodocarpa,* Lk., *l. c.*, p. 121. *Pleopeltis,* Presl., Brésil. — Fronde profondément pinnatifide, glauque, à segments obtusiuscules; sporothèces unisériaux.

3. MARTINICENSIS, F., 8e *Mém.*, p. 130; *Hist. foug. et lycop. des Antilles*, p. 71. Glaziou, Rio-Janeiro, n° 1728.

4. PULVINATA, Lk., *l. c. Polypodium pulvinatum, ejusd. Hort. Berol.*, 2, p. 99. Brésil (*teste* Link.). Frondes glaucescentes, à segments lancéolés, terminés en une longue pointe, à marge dentée; sporothèces unisériaux.

5. RADDIANA, F., *Polypodium glaucum*, Radd., *Filic. Bras.*, p. 20, t. 29, f. 1. Sierra d'Estrella, Raddi. — Il ne nous semble pas possible de rapporter à cette espèce, qui est très-velue, le *Goniophlebium Catharinæ,* qui est tout à fait glabre. Elle a le port du *Polyp. vulgare,* L.; les deux segments inférieurs sont réfléchis.

57. DRYNARIA, Bory, *Dictionn. classiq.*, art. *Polypodium.*

* *Frondes simples.*

1. PERCUSSA, F., *Gen. fil.*, p. 270. *Polypodium percussum,* Cavan.; Langsd. et Fisch., *Icon.*, p. 8, t. 6. *Pleopeltis,* Hook. et Gr., *Icon.*, n° 67; Mart., *Herb.*

Bras., n° 304. Ile Sainte-Catherine, H. Gauthier. Rio-Janeiro, Glaziou, n° 2387, *normalis*, et n° 400, *angustior*.

2. MORICANDII, Metten., *Polyp.*, p. 87, t. 1, f. 47 et 48 (fragm.). Bahia, Moricand. (N. V.) — Rampante, couverte d'écailles étroites et subulées; port du *D. lepidota*.

3. SCHOMBURGKIANUM, Kze., *Suites à Schkh.*, I, p. 88, t. 42. San-Gabriel de Cachoeira, Rio-Nigro, Spruce, n° 2329. — Splendide espèce à frondes naissant espacées sur un très-gros rhizome couvert d'écailles lancéolées, à marge blanche. La fronde est coriace, largement lancéolée et terminée en un long acumen linéaire; les sporothèces sont irrégulièrement arrondis, portés sur un réceptacle étroit, noirâtre. Une variété à fronde étroite a des sporothèces parfaitement ronds et semi-globuleux.

4. LEPIDOTA, Schlecht., *Adumb.*, p. 17, t. 8, *sub polypodio; Pleopeltis*, Presl., *Tentam. pterid.*, p. 193; *Drynaria*, F., *Polypodium macrocarpon*, Willd., *Filic.*, p. 147. Rio-Janeiro, Glaziou, n°s 1735 et 2386. — Belle espèce à frondes lancéolées, épaisses, acuminées. Les sporothèces occupent le sommet de la lame; ils sont fort gros et se développent entre le mésonèvre et la lame. Le réceptacle est ovoïde. Longueur des grandes frondes, 25-28 centim. sur 1,5 à 2,5 de largeur. Elle se trouve au Mexique et à Bourbon.

5. ELONGATA, F., *Gen. filic.*, p. 270. *Grammitis elongata*, Sw., *Syn. filic.*, p. 22. *Grammitis lanceolata*, Schkh., *Crypt. Gew.*, p. 9, t. 7. Glaziou, Rio-Janeiro, n°s 1170 et 1734. — Cette espèce est aux *Drynaria*, quant à l'élongation des sporothèces, ce que les *Grammitis* sont aux *Polypodium*. Le réceptacle est linéaire, caractère facile à reconnaître et qui le distingue nettement de l'espèce précédente.

6. ITEOPHYLLA, F., *Gen. filic.*, p. 270. *Polypodium stigmaticum*, Kze. *P. geminatum*, Schrad., *Gœtt. g. Anz.*, 1824, 867. Mart., *Herb. Bras.*, n° 302; Moricand. Glaziou, Rio-Janeiro, à Copocabona, n° 2071.

7. PERSICARIÆFOLIA, F., *l. c. Polypodium persicariæfolium*, Schrad., *l. c.* Metten., *Fil. Lips.*, p. 36, t. 25, f. 20; Mart., *Herb. Bras.*, n° 384. Bahia, Blanchet; Spruce, près le fleuve Orénoque, n° 3218. — Sporothèces allongés, portés sur un réceptacle linéaire, comme dans le *D. elongata*, et donnant lieu à la même remarque.

8. ACUMINATA, F.

Frondibus glabris, oblongis, ad apicem longissime acuminatis; fertilibus et sterilibus similibus, basi cuneatis; surculo filiformi, setoso, paleaceo, repente; squamis arcte imbricatis; sporotheciis intermediis, rotundis, crassis, receptaculo punctiformi; sporangiis rotundis; annulo 16-18 articulato; sporis ellipticis, crassis, lævibus, leviter lutescentibus.

Habitat in viciniis Barra, *prov.* Rio-Negro (Spruce, sans numéro; 1850-1851).

Filix repens, frondulis remotis, subpapyraceis, areolis irregularibus.

ICON.: *Tab. XXXVII, fig. 3.*

(Longueur : 16 centim. sur 2-2,5 centim. La pointe mesure 3 centim.)

Cette plante sera facile à reconnaître à la longue pointe qui termine les frondes; elle a le port des *D. persicariæfolia* et *lycopodioides.*

** *Frondes pinnatifides.*

9. RADDIANA, F., *Gen. filic.*, p. 270. *Polypodium pleopeltidifolium*, Radd., *Fil. Bras.*, p. 16, t. 21, *non Pleopeltis angusta*, H. et B., *in* Willd., *Fil.*, p. 211. Rio-Janeiro, Glaziou, n° 399; Claussen (H. F.). Ile Sainte-Catherine, H. Gauthier, n° 115.

Var. : *obtusiloba,* Glaziou, Rio-Janeiro, n° 978.

La description donnée par Willdenow, d'après Humboldt, pour le *Pleopeltis angusta,* ne saurait se rapporter à la plante figurée par Raddi (*l. c.*, p. 16, t. 21). Le stipe est lisse; la fronde atteint 4 à 5 centim. seulement; les segments, 3 centim.; ils sont linéaires, lancéolés, avec des sporothèces gros comme une graine de moutarde. Ce signalement se rapporte de tout point au *Pleopeltis angusta,* distribué par Galeotti sous le n° 6368 (plantes du Mexique). D'autre part, la figure 140, donnée par Humboldt et Bonpland, *Pl. æquinoxial.*, 2, p. 182, t. 140, ne correspond plus avec la description willdenowienne; elle se rapproche de la figure éditée par Raddi. Pour expliquer toutes ces singularités, il faut croire que la diagnose de Willdenow aurait été faite sur un très-petit spécimen, fructifié, pareil à celui édité par Galeotti. Ceci admis, il n'en reste pas moins établi que la plante brésilienne et la plante mexicaine sont différentes, celle-ci grimpante, avec un stipe de la grosseur d'une plume de pigeon, tandis que l'autre a un assez gros rhizome, simulant parfois une simple souche. Ajoutons que la plante mexicaine porte sur la lame supérieure de petites couches nombreuses de carbonate de chaux.

58. PLEURIDIUM, F., *Gen. filic.*, p. 273.

1. CRASSIFOLIUM, F., *l. c. Polypodium crassifolium*, L., *Sp. pl.*, 1543. Sw., *Syn. filic.*, p. 27. Willd., *Fil.*, p. 161. *Anaxetum*, Schott., *Gen. fil.*, fasc. 1. Rio-Janeiro, Glaziou, n° 1732; Sainte-Catherine, H. Gauthier. — Cette espèce, l'une des plus belles fougères américaines connues, dépasse parfois 1 mètre de longueur (1 m. 6 c. dans notre spécimen) sur 11-12 centim. de largeur. Nous avons changé le nom d'*Anaxetum*, donné par Schott, par ce motif qu'il sert à désigner un genre de Synanthérée, créé par Gardner.

† 59. HETEROPTERIS, F.

Sporotheciis rotundis, marginantibus; indusio nullo; sporangiis pyriformibus; annulo crasso, 16-18 articulato; sporis trigonis, leviter papillosis.
Frondibus monotaxibus, trifidis; petiolis adiantinis, lævibus, surculo erecto; nervillis anastomosantibus exappendiculatis.
Filix tenera, heteromorpha.

† 1. DORYOPTERIS, F.

Frondibus glabris; novellis indivisis, basi cordatis, adultis subpedatis, segmento intermedio longo, acuto; omnibus teneris, pellucidis; sporotheciis fulvis, subrotundis, sæpe approximatis, sed semper distinctis; sporis trigonis, lutescentibus.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 939).

ICON.: *Tab. X, fig. 2.*

(Longueur totale jusqu'au sommet de la lame frondulaire, 24-25 centim.; le segment central mesure 9-11 centim. sur environ 2 centim.)

Sur une petite souche se dressent quelques frondes souples et translucides, prenant une teinte vert-jaunâtre en se desséchant. Cette fougère a tout à fait le port des *Pellæa*, et particulièrement celui du *P. quinquelobata*. C'est une ptéridée par le port et la situation marginale des sporothèces; mais il n'y a point d'indusium et les sporothèces forment des groupes arrondis très-distincts. Nous la plaçons comme appendice à la fin des Polypodiacées, dont elle termine la série.

NB. Ce groupe, l'un des plus considérables de la famille des Polypodiacées, a des représentants sur toute la surface du globe. Les nervilles des espèces européennes ne sont jamais anastomosées. Les *Phegopteris* ont le port des *Aspidium*, et quelques

espèces ressemblent, sauf l'indusium, à des *Polystichum*. Le genre *Heteropteris* propre au Brésil, doit être regardé comme dissident; autant ptéridée que polypodiée. Nous décrivons ou énumérons 133 Polypodiées brésiliennes, réparties en 11 genres; le nombre des Polypodiacées étant environ de 550, elles en forment à peu près le quart; dans les Antilles, qui en ont 381, la proportion est de 3,4, et au Mexique, avec 94 de 3,5. Le nombre des genres, pour les trois régions, est de 11 pour le Brésil et les Antilles, et de 8 seulement pour le Mexique.

XVII. CYCLODIÉES.

60. POLYSTICHUM, Roth, *Tentam. Fl. German.*, III, 69 (*reduct.*).

I. *EUPOLYSTICHUM.*

§ 1. *Mutiques:* TECTARIA, Cavan.

1. CORIACEUM, Schott., 2e fascic., t. 4. *Aspidium coriaceum*, Sw., *Syn. filic.*, p. 57. Willd., *Filic.*, p. 268. *Tectaria*, Lk., *Spec. filic.*, p. 113. *Tectaria Calahuala*, Cavan., *Prælect.*, 1801. *Aspidium discolor*, Langsd. et Fisch., *Icon.*, p. 28, t. 43, Brésil mérid. Même localité, par Fox, n° 241. Sellow, Minas-Geraes; Gardner, n° 5321. Ile Sainte-Catherine, H. Gauthier. Rio-Janeiro, Glaziou, nos 384, 1778, 1779 et 2383. — Cette espèce cosmopolite varie grandement ses formes et se présente parfois avec des sporothèces nus, les indusium étant, sous certaines influences, très-facilement caducs. D'autres espèces se trouvent dans le même état. On a alors sous les yeux un *Phegopteris;* pour reconnaître le genre, il faut consulter le port, très-spécial dans les espèces aristées, qui sont les plus nombreuses. Le *Polystichum coriaceum* permet d'établir, parmi les formes brésiliennes, les variétés suivantes :

   β *platychlamys.* Derniers segments mutiques; indusium très-large, très-peu bombé, rufescent; sporothèces écartés; plante très-robuste; stipe de la grosseur d'une plume de cygne, portant à sa base de larges écailles acuminées, dorées. — Rio-Janeiro, n° 384, H. Gauthier; île Sainte-Catherine.

   γ *acuminatum.* Forme africaine; frondules et leurs subdivisions écartées et acuminées; les derniers segments mutiques; indusium caduc; sporothèces écartés; plante souple avec un pétiole et des rachis gramineux. — Ile Sainte-Catherine, par Alburquerque. Rio-Janeiro, Glaziou, n° 1779.

δ *callochlamys.* Les sporothèces sont recouverts par un indusium ombiliqué, ayant la forme d'un verre de montre très-bombé, avec une dépression centrale colorée; elle est très-robuste; à l'état de dessiccation elle prend une teinte jaunâtre très-prononcée. — Rio-Janeiro, Glaziou, nos 1225 et 1657; à Gavia, au bord de la mer.

† 2. REMOTUM, F.

Frondibus tripinnatis, glabris, coriaceis, omnibus partitionibus remotissimis, petiolo valido, sulcato, basi squamoso, rachibus helveolis; frondulis primariis curvatis, bipinnatis, pyramidatis, acutis; secundariis lanceolatis, pinnato-pinnatifidis; tertiariis oblongis, in tota superficie fructiferis; sporotheciis crassis, rufescentibus, conniventibus; indusiis crassis, atro-fuscis, persistantibus; receptaculo lineari; sporangiis ovato-rotundis, annulo 12-14 articulato; sporis nudis, vitreis, ovoideis aut leviter reniformibus.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 1778, Serra os Orgaos).

Filix statura mediocri, partitionibus remotis, siccitate flavidula.

ICON.: *Tab. XXXIX, fig. 1.*

(Longueur totale, 70 centim.; frondules primaires mesurées sur la paire inférieure, 20-25 centim., séparée de la supérieure par un intervalle de 10-12 centim.; les secondaires de la base, 5-6 centim.)

Cette plante paraît bien distincte; elle est surtout caractérisée par l'écartement de toutes ses parties et la longueur des pétioles et pétiolules; les frondules de 3e ordre, celles qui sont fructifères, ont une forme ovoïde; la marge est crénelée et la lame inférieure entièrement couverte par les sporothèces qui se touchent par leurs bords.

§ 2. *Aristées.*

3. ACULEATUM, Roth., *Fl. Germ.*, III, p. 79. *Polypodium aculeatum*, L., *Sp. pl.*, 1552; *Aspidium*, Sw., *Syn. filic.*, p. 53, Willd., *Filic.*, p. 258. Schkh., *Crypt. Gew.*, p. 41, t. 39. — Cette fougère est présentée par M. Hooker comme absolument cosmopolite, et nulle plante ne le serait au même degré. La variété *angulare*, qui est pour nous une espèce distincte, aurait été trouvée au Brésil par Sellow et par Gardner, dans la Serra os Orgaos, et distribuée sous le n° 133. Nous ne la possédons pas de cette partie de l'Amérique du Sud.

† 4. MICROSORIUM, F.

Frondibus bipinnatis, oblongis, apice sensim decrescentibus; petiolo helveolo, depresso, subtus bisulcato, basi squamas amplas, ovatas, acuminatas ferente;

rachi squamoso; squamis fuscis, angustis, linearibus, longe acuminatis; frondulis primariis linearibus, acuminatis, inferioribus deflexis, horizontalibus aut superne curvatis; racheolo anguste canaliculato; frondulis secundariis fructiferis, breve ovatis, cuneatis, sursum auriculatis, apice et auricula aristatis; marginibus repandis; sporotheciis minutis, indusio? parvo.

Habitat in Brasilia fluminensi, circa Tijuca (Glaziou, n° 2065 *partim*).

Filix elata, bipinnata; frondulis primariis brevissime petiolatis, acutis; frondulis secundariis basilaribus minoribus.

Icon. : *Tab. XL, fig. 1.*

(Longueur totale : 90 centim., dont le pétiole fait le tiers; les frondules secondaires atteignent 14-15 centim. et mesurent au centre 3 centim. Le pétiole, irrégulièrement anguleux, est de la grosseur d'une plume d'oie.)

Cette espèce a un aspect agréable; les frondules primaires, terminées en pointe aiguë, sont garnies d'une trentaine de paires de pinnelles, aristées au sommet et sur l'auricule, à marge ondulée, très-obtuses, courtement pétiolulées, à base tronquée, se redressant sur le rachis, comme si elles voulaient s'y appliquer par leur marge; le pétiole et le rachis sont gramineux et très-écailleux, surtout le rachis. Elle est d'un jaune-paille très-prononcé après dessiccation. Le pétiole déprimé et lisse est parcouru par deux étroits sillons. Les pinnelles des frondules supérieures sont mutiques. L'indusium est hypothétique.

II. *PHEGOPTEROIDES.*

† 5. LANOSUM, F.

Frondibus bipinnatis, amplissimis, ambitu oblongis; petiolo sulcato, crasso, helveolo; rachibus squamis angustissimis, lanæ rufæ similibus, vestitis; frondulis primariis petiolatis, alternis, remotis, lanceolatis, apice acuto inciso; frondulis secundariis glabris, basi cuneatis, sursum auriculatis, apice et margine crenato-aristatis; sporotheciis crassis, sparsis, tabacinis; sporangiis rotundis; annulo crasso, 14-16 articulato, sporis rotundis.

Habitat in Brasilia fluminensi [Claussen, sans numéro (H. F.); Glaziou, n° 388].

Filix magna, petiolo, rachibus squamis rubellis, lanæ similibus, coopertis.

Icon. : *Tab. XL, fig. 2.*

(Longueur : 1 mètre et plus; frondules primaires distantes, médiocrement arquées, mesurant 15-17 centim.; les secondaires, 3 centim. sur 9-11 millim.)

Cette belle espèce est remarquable par les écailles d'aspect laineux qui adhèrent au pétiole et aux rachis, particulièrement au point d'insertion des frondules; on

ne les voit plus sur les frondules de 2e ordre ; l'oreillette qui se trouve à la base supérieure de ces mêmes frondules, est très-accusée et fructifère, ce qui indique nettement qu'elle est la partition distincte d'un segment soudé, lequel, s'il se développait, rendrait la frondule pinnatifide. Le pétiole et ses divisions sont assez profondément canaliculés. C'est l'espèce dont les frondules secondaires sont les plus larges.

6. CAUDATUM, Cav., *Anal. de hist. nat.*, n° 4, p. 100, *sub tectaria. Aspidium caudatum*, Sw., *Syn. filic.*, p. 55. Willd., *Filic.*, p. 270. — Brésil, Claussen, *Herb. F.*, *ex* Kze., mssc. — Frondes tripinnées, très-glabres ; frondules primaires alternes, terminées en une longue pointe denticulée; les frondules secondaires très-rapprochées, auriculées, pointues, crénelées en leur pourtour; la pointe et l'auricule portent une pointe aristée. Elle n'a point encore été figurée.

Filix magna, dilatata, siccitate pallida; nervillis tenuibus.

(Longueur : 1 mètre 10 centim., dont le pétiole fait environ les 2 cinquièmes; entre-nœuds, 6-7 centim.; frondules primaires, 20-25 centim.; les tertiaires, 2-3,5 centim.) [Spécimen de Claussen.]

† 7. TIJUCENSE, F.

Frondibus oblongis, bipinnatis; rachi squamoso, depresso, anguste canaliculato; squamis rufis, linearibus, patulis; pinnulis alternis, apice caudatis, vix petiolatis; rachi tenui, squamoso; pinnellis oblongis, basi cuneatis, sursum auriculatis, apice, auricula segmentorum et sæpe marginibus aristatis; supremis parvulis, conformibus liberisque; sporotheciis crassiusculis, remotiusculis; sporangiis rotundis, longo pedicello donatis, cum paucis squamis angustis, laceratis immixtis; sporis crassis et ovoideis.

Habitat in Brasilia fluminensi circa Tijuca (Glaziou, n° 2065).

Filix elegans, dilatata; frondulis curvatis; pinnellis omnibus liberis.

ICON. : *Tab. XXXVIII, fig. 1.*

(Longueur, 46 centim. sans le pétiole, qui manque à notre spécimen ; les frondules atteignent 15-17 centim. sur 3 centim. d'envergure.)

Cette fougère a le port du *P. microthecium*, F., dont elle diffère par de très-gros sporothèces nus, par des pinnules plus écartées du rachis avec lequel leur base forme un angle aigu, enfin par des arêtes assez nombreuses, qui se détachent d'une marge ondulée.

† 8. GIGANTEUM, F.

Frondibus bipinnatis, oblongis, petiolo longo, basi præcipue squamoso; squamis tenuibus, lanceolatis, fulvis, margine integris; frondulis primariis lan-

ceolatis, longe acuminatis, breve petiolatis, curvatis, pinnatis; frondulis secundariis ovatis, auriculatis, basi truncatis, apice et auricula mucronatis, marginibus undulatis, mucronem unicum ferentibus; sporotheciis distinctis 6-7, per seriem, ad auriculam tribus; sporangiis ovoideis; annulo 12-16 articulato; sporis rotundatis, opacis, fuscis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2354).

Filix formosa, gigantea, squamosa, caudata; sicca colorem viridem servat.

Icon.: *Tab. XXXIX, fig. 2.*

(Longueur, 1 mètre 80 centim. avec des frondules primaires, arquées, qui mesurent 19-21 centim. seulement et qui sont séparées par un entre-nœud de 4 centim.; le pétiole atteint à la base la grosseur du petit doigt; les écailles ont 2 centim. de long.)

Cette espèce peut être regardée comme la plus longue des fougères herbacées terrestres; le pétiole seul, fortement sillonné, atteint 70 centim.; il est couvert à sa base d'abondantes écailles, qui diminuent de dimension en arrivant dans le rachis, où elles deviennent irrégulièrement pinnatifides; les frondules secondaires se dressent légèrement sur leur base. On trouve dans le pétiole 6 faisceaux vasculaires, 2 supérieurs plus grands, 4 inférieurs plus petits.

† 9. ACULEOLATUM, F.

Frondibus bipinnatis, in ambitu oblongo-lanceolatis, glabris, longe caudatis, squamosis; squamis basilaribus late fulvis, lanceolatis, integris, superioribus succineo colore, ad rachim angustis fuscisque; frondulis primariis lanceolatis, acutis, pinnatis, vix ad apicem pinnatifidis; frondulis secundariis oblongis, auriculatis, obtusissimis, multiaculeolatis; sporotheciis 6-7 per seriem, distinctis; sporangiis ut supra.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2357).

Filix elata, squamosa; frondulis secundariis multiaculeolatis.

Icon.: *Tab. XXXVIII, fig. 2.*

(Longueur totale, 1 mètre 20 centim., dont le pétiole fait le tiers; il a la grosseur d'une plume de cygne à la base; les frondules primaires, courbes et lancéolées, atteignent 20 centim. sur 2,5 de largeur; les inférieures sont un peu plus petites.)

Cette espèce, de grande taille, porte plus de 40 paires de frondules jusqu'au sommet de la fronde, qui est pinnatifide; les frondules secondaires sont chargées de mucrons, surtout en s'élevant vers le haut de la plante; les mucrons sont très-développés. Le pétiole porte trois sillons très-prononcés; il a le même nombre de faisceaux vasculaires que dans l'espèce précédente: 2 inférieurs plus grands, 4 supérieurs plus petits.

† 10. PLATYLEPIS, F.

Frondibus bipinnatis, glabris, pyramidatis, patulis; petiolo robusto, sulcato, squamoso; squamis ovoideis, acuminatis, margine fimbriatis, ad rachim filamentosis; frondulis primariis subsessilibus, lanceolatis, caudatis; frondulis secundariis ovoideis, approximatis, auriculatis, marginibus undulato-crenulatis, mucronibus validis; sporotheciis distantibus, centralibus; sporangiis ut supra.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2356).

Filix magna, siccitate lutescente; squamis latis, fulvis, fimbriatis.

ICON. : *Tab. XL, fig. 1.*

(Longueur totale, 1 mètre 26 centim., dont le pétiole fait le tiers; les frondules primaires, très-étalées à la base des frondes, 24-25 centim.; celles du sommet, redressées et arquées, se réduisent successivement en grandeur; les frondules secondaires ne dépassent guère 2 centim.; les écailles sont molles, luisantes, longuement acuminées; les plus grandes mesurent 2 centim.)

C'est encore là une très-grande espèce; les frondules secondaires sont très-rapprochées et s'imbriquent assez souvent par leurs auricules; les marges sont ondulées, crénelées d'une manière un peu irrégulière; le pétiole, à sa base, est gros comme une plume de cygne; les faisceaux vasculaires sont fort petits, écartés du centre et blanchâtres; une coupe horizontale du pétiole semble le montrer pourvu d'une zone d'apparence corticale.

† 11. LONGE CUSPIS, F.

Frondulis bipinnatis, oblongis, glabris, squamosis; petiolo longo, stramineo, canaliculato; squamis lanceolatis, acutis, subcrispis; rachi squamoso, flexuoso; frondulis primariis lanceolatis, sessilibus, acutis, mucrone terminatis, basi patulis, deinde arcuatis; frondulis secundariis ovatis, auriculatis, apice crenato et auricula mucronatis, mucrone valido; sporotheciis crassis, tabacinis; sporangiis ut supra.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2355).

Filix magna, magnitudine mucronum notata.

ICON. : *Tab. XL, fig. 2.*

(Longueur totale, 1 mètre 26 centim., dont le pétiole fait le tiers; les frondules primaires, un peu plus petites à la base, ont au centre 13-14 centim.; les entre-nœuds sont distants, les uns des autres, de 3 centim. environ; les frondules secondaires ne dépassent pas 1 centim.)

Les faisceaux vasculaires sont au nombre de 8, et occupent la plus grande partie de la surface de la coupe du pétiole, ce qui la sépare complétement de l'espèce

précédente. Elle sera facile à reconnaître à ses mucrons plus longs que dans ses congénères; les écailles sont aussi fort distinctes; celles du rachis sont étalées, presque rouges, très-étroites et très-longuement acuminées.

12. PLATYPHYLLUM, Willd., *Filic.*, p. 255, *sub aspidio. Polypodium polystichioides.* Kl., *Linn.*, XX, p. 383. Caracas, Moritz, n° 2, et Colombie, n° 45 (*Herb. F.*). Rio-Janeiro, Karsten; Glaziou, n° 1783. — Willdenow, en faisant de cette plante un *Aspidium*, semble faire croire qu'il a vu l'indusium. M. Klotzsch, qui la place dans le genre *Polypodium*, indique qu'il ne croit pas à la présence de ce tégument; nous sommes dans le même cas, et si nous en faisons un *Polystichum*, c'est en raison du port, qui est tout à fait semblable aux espèces les mieux caractérisées de ce beau genre. Le *Polystichum platyphyllum* est semi-pinné dans ses frondules primaires et secondaires. Notre *Phegopteris polystichiformis, Gen. filic.*, p. 247, de Cuba, qui doit rentrer dans les *Polystichum* à sporothèces nus, est très-probablement une plante différente.

NB. *Polystichum abbreviatum*, Presl. (Voy. *Cyrtomium abbreviatum*, du même auteur.)

Le genre *Polystichum* se partage, très-naturellement, en deux groupes : espèces mutiques et espèces aristées. La 1re section, *tectaria*, est de beaucoup la moins nombreuse et pourrait constituer un genre distinct; nous l'eussions fait, n'eût été la crainte de charger encore la synonymie. Ces espèces sont coriaces, privées de mucron et n'ont point d'analogues en Europe, tandis que celles de la 2e section, plus flexibles et toujours aristées, se rattachent de tout point à nos espèces européennes, avec cette différence que l'indusium n'existe pas; sur notre prière, M. Glaziou l'a vainement cherché sur toutes les espèces et à tous les âges. Rigoureusement, elles devraient prendre place parmi les *Phegopteris*, mais tous les organes de la nutrition, souches, frondes, tout, jusqu'à la nature des écailles et à la présence constante des mucrons, en fait de véritables *Polystichum*, c'est là ce qui nous a décidé, nous contentant de noter ici les circonstances organiques qui ont motivé notre résolution. (Voy. *Phegopteris*, p. 105.)

Pour reconnaître les espèces, il faut s'aider de la squamescence, de la distribution des faisceaux vasculaires dans le pétiole ou dans le rhizome; ce sont là d'utiles auxiliaires, qui confirment les caractères tirés des frondes et des frondules fructifères.

61. CYRTOMIUM, Presl., *Tent. pterid.*, p. 86.

1. ABBREVIATUM, Presl., *Tent. pterid.*, p. 86. *Aspidium*, Schrad., *Gœtt. gel. Anz.*, 1824, 809. *Nephrodium abbreviatum*, F., *Gen. filic.*, p. 306. *Polystichum abbreviatum*, Presl., *Epim. bot.*, p. 58. Martius, *Herb. Bras.*, n° 325; Blanchet (H. Moug.) (*Venulis liberis*). — Cette plante est *Polystichum* dans sa partie inférieure par des nervilles simples, et *Cyrtomium* vers le haut par des nervilles conniventes. C'est là une de ces plantes à caractère générique ambigu, qui démontrerait, s'il en était besoin, que les meilleures classifications, en apparence, sont toujours artificielles. Cependant à voir les nervilles des frondules inférieures, non-seulement libres, mais n'atteignant pas même la marge, il semble qu'elle est plus près des *Polystichum* que des *Cyrtomium*.

62. BATHMIUM, Lk., *Sp. filic.*, p. 286.

1. PLANTAGINEUM, F., *Aspidium*, Hook., Mettenius. *Polypodium*, Jacq. Sw. et Willd. Serra de San-Gabriel, Spruce, n° 2189.

Var. β *serrata;* Rio-Janeiro, Glaziou, n° 2347. — Frondes oblongues, à marge sinueuse vers la moitié inférieure, dentée en scie vers le sommet, qui se termine en une longue pointe fortement dentée.

Cette plante est difficile à classer. Est-ce un *Drynaria?* Est-ce un *Bathmium?* Est-ce un *Dryomenis?* Quoique très-grande et très-complète dans les herbiers, elle est de genre incertain et se présente le plus ordinairement sans indusium.

XVIII. ASPIDIÉES.

63. ASPIDIUM, Sw., *Syn. filic.*, p. 51, *Emend.*

* *Indusium glabre* (frondes pinnées-pinnatifides).

† OOCHLAMYS, F., *Gen. filic.*, p. 290.

1. RIVULORUM, Radd., *Filic. Bras.*, p. 23, t. 35; *non* Kze. Brésil, Radd., Rio-Janeiro; Pohl (*Herb. F.*); Claussen, *sine numero*. — Espèce élancée; frondules se dégradant par le bas, de manière à ne plus ressembler qu'à des ébauches difformes. Nous n'acceptons pas la synonymie donnée pour cette plante par M. Hooker (*Spec. filic.*, IV, p. 90). La figure citée de Raddi est très-fidèle. Cette espèce peut atteindre jusqu'à 1 mètre de longueur sur 11 à 13 centim. d'envergure.

2. CONTERMINUM, Desv., *Mém. soc. Linn.*, VI, p. 255; Hook., *Spec. filic.*, IV, p. 91. *Polypod. concinnum*, Sieb., *Fl. Martin.* Brésil, Fox et Forbes; Gardner, n°s 5318 et 5316. — La synonymie de cette plante, chez M. Hooker, *l. c.*, est confuse; elle n'a point été figurée et se rapproche de la précédente. L'indusium, glabre dans toute son étendue, porte à la marge des espèces de glandules. Nous ne l'avons pas vue provenant du Brésil.

3. HELVEOLUM, F.

Frondibus glabris, extensis; petiolo rachique helveolis, supra tri- quadricanaliculatis, in ambitu oblongis; frondulis suboppositis, superne alternis, glabris, acuminatis, profunde pinnatifidis, sessilibus, infimis remotis, sensim brevioribus et difformibus, apice caudatis, cauda denticulata, segmentis oblongis, integris; nervillis simplicibus; sporotheciis submarginantibus, partem medianam segmentorum occupantibus; sporangiis sessilibus, rotundis, annulo 12 articulato; sporis atris, ellipticis subrotundisque.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2364).

Filix extensa, frondulis basi et apice decrescentibus, glabris.

ICON.: *Tab. XLII, fig. 2.*

(Longueur, 1 mètre et plus; pinnules centrales, 12 centim. sur un peu moins de 2 centim. de largeur. Les frondules, dégradées dans leur forme, descendent très-bas sur le pétiole.)

Cette curieuse espèce a l'organisation des *Aspidium* à indusium obové (*oochlamys*), attaché au centre dans toute son étendue et libre dans son pourtour. Elle est parfaitement distincte de la précédente par le port, le nombre et les dimensions des frondules; le nom spécifique que nous lui donnons pourrait être appliqué à plusieurs autres espèces dont le pétiole et les rachis ont une couleur de paille. Le *facies* n'offre aucun caractère spécial.

4. ELATIOR, F.

Frondibus extensis, glabris; petiolo rachique lævi, helveolo; frondulis oppositis, inferioribus alternis, infimis remotis, abbreviatis, ultimis deformibus; frondulis lanceolatis, glaberrimis, acuminatis, profunde pinnatifidis, oblongis, pellucidis, obtusiusculis, marginibus integris, sæpe dentatis, sinu lato separatis, nervillis simplicibus; sporotheciis breve pedicellatis, rotundis, annulo pellucido, 14 articulato; sporis ovoideis, aterrimis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2366).

Filix altissima; frondulis arcuatis, marginibus integris seu dentatis.

ICON. : *Tab. LXII, fig. 3.*

(Longueur, 1 mètre 50 centim. et même plus; frondules, 16-20 sur 2,5 centim. d'envergure; entre-nœuds inférieurs, 5 centim., s'écartant de plus en plus vers le pétiole, qui est renflé vers le bas et noirâtre; le nombre de paires de frondules excède 30.)

Cette espèce est gigantesque; elle diffère de l'*A. rivulorum* par des frondules plus écartées, plus larges et au moins trois fois plus longues; elle s'en éloigne encore par sa souplesse et la transparence de son tissu; elle se distingue de l'*A. helveolum* par sa taille et ses frondules plus larges, dont les segments arqués, plus longs et moins obtus, ont une marge dentée dans ceux qui se dirigent par en bas, tandis que ceux qui regardent le sommet de la fronde, sont entiers; c'est aussi par cet ensemble de caractères qu'elle s'éloigne de l'*A. conterminum*, Desv.

5. BERTEROANUM, F., *Hist. foug. Antill.*, p. 77, t. XXII, f. 1. Glaziou, Rio-Janeiro, n° 2365. — Grande espèce, à segments étalés, rapprochés; frondules terminées par une pointe qui se tortille par la dessiccation; elles sont pectinées et prennent une teinte noirâtre par dessiccation.

Dans les cinq espèces qui constituent ici le petit groupe des Oochlamydées, l'indusium, les sporanges et les spores ont des caractères communs, et dans toutes les frondules se dégradent en grandeur, pour ne plus offrir à la base que des ébauches informes.

†† EUASPIDIUM.

1. Frondes pinnées, à segments simplement dentés.

6. IMRAYANUM, Hook., *Sp. filic.*, p. 86, t. 242 B. San-Gabriel de Cachoeiro, Rio-Negro; Spruce, 2153. — Cette espèce peut atteindre jusqu'à 1 mètre de longueur, dont le pétiole fait presque la moitié; il est d'un blanc jaunâtre, bicanaliculé et porte, très-étalées, des frondules terminées en un court pédicelle; elles sont lancéolées, acuminées, crénelées, dentées, les supérieures parfois gibbeuses vers leur partie supérieure; les sporothèces trisériaux se détachent en brun sur la lame supérieure et déterminent sur l'épiderme une petite fossette en fente. Les frondules mesurent 13-14 centim. sur 1,7 centim. de largeur. Nous en comptons au delà de 20 paires. Notre spécimen brésilien a des frondules courtement pétiolées; tandis que dans le spécimen de la Dominique, figuré par M. Hooker, elles sont sessiles.

7. BRACHYNEVRON, F. Bahia, Blanchet (*sine numero*). — Même port que l'espèce précédente, avec des frondules un peu plus étroites et sensiblement pétio-

lées; la pointe de la fronde est pinnatifide et terminée en une pointe crénelée; mais ce qui la distingue, entre toutes, ce sont les nervilles excessivement courtes, n'atteignant pas la moitié de la largeur du segment qui les porte; les sporothèces sont sous-terminaux. Elle dépasse 1 mètre; le pétiole mesure 55 centim.; les frondules n'ont pas au delà de 12 centim. sur 15 millim. de largeur.

2. Frondes pinnées-pinnatifides.

8. VESTITUM, Radd., *Filic. Bras.*, p. 24, t. 36, *sub polypodio. Aspidium*, F., *Nephrodium* (*Lastrea*) *Raddianum*, Hook., *Spec. filic.*, t. IV, p. 98, t. 245. Rio-Janeiro, Douglas; Martius, *Herb.*, n° 324; Pohl; Glaziou, n° 2374. — Espèce très-bien figurée et nettement caractérisée par les poils abondants qui la recouvrent. L'indusium, qu'il n'est pas toujours facile de voir, est garni, en son pourtour, de poils glanduleux; elle a le port des *Aspidium* d'Europe.

9. TENERRIMUM, F.

Frondibus tenerrimis, glaberrimis, ambitu pyramidatis, rachi helveolo, depresso, supra sulcato, leviter undulato; frondulis pellucidis, pinnatifidis, apice attenuatis, patulis, sessilibus; nervillis simplicibus; segmentis oblongis, inferioribus obtusis, superioribus acutis, omnibus leviter arcuatis, crenatis, basi conniventibus; sporotheciis parvulis, fulvis, laminam superiorem inquinantibus; indusio parvulo, glabro; sporangiis subreniformibus, nigrescentibus.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n°s 390, 1223 et 2367).

Filix magna, flexibilis, tenerrima, glaberrima, pellucida; nervillis simplicibus.

ICON.: *Tab. XLIII, fig. 1.*

(Longueur, 65 centim. sans le pétiole; frondules inférieures, 20-22 centim. sur 3 centim. de largeur; les entre-nœuds mesurent 5 centim.; nous comptons environ 24 paires de frondules et au delà de 30 segments pour chacune d'elles.)

Cette espèce se distingue par de larges frondes dont la souplesse est très-grande, par des frondules sessiles très-longuement acuminées, dont les segments atteignent presque la nervure médiane. Les sporothèces sont formés d'un petit nombre de sporanges, faiblement unies entre elles, au nombre de 4-8 par série; ils n'atteignent pas le sommet du segment prolifère et ne naissent que sur les deux tiers inférieurs de son étendue seulement.

10. FALCICULATUM, Radd., *Fil. Bras.*, p. 31, t. 47; *Nephrodium*, Desv., *Mem. soc. Linn. Par.*, VI, p. 241. Rio-Janeiro, Raddi, Claussen, n° 12 (H. F.); Douglas, Gardner, Sellow, etc. — Les frondes sont réunies en grand nombre sur une souche dressée. Les pétioles canaliculés ont une teinte rougeâtre très-prononcée, qu'ils gardent après dessiccation dans les herbiers; on la retrouve sur les sporothèces, qui sont très-rapprochés; l'indusium est persistant. Elle est très-répandue au Brésil, dans les environs de Rio. Port des *Aspidium* d'Europe.

11. FILIX-MAS, Sw., *Syn. filic.*, p. 55. Schkh., *Crypt. Gew.*, p. 45, t. 44, *et auct. plurim. Nephrodium, Lastrea, Polystichum, auct. varior.* Sommités de la Serra os Orgaos, Gardner, n° 5944; Glaziou, n° 2823. — La forme brésilienne a été nommée, par Kunze, *A. parallelogrammum, Linn.*, XIII, p. 146, et établie sur une plante du Mexique; nous trouvons la plante du Brésil tout à fait semblable aux types d'Europe, seulement les frondules primaires sont très-longuement acuminées. L'*A. Filix-Mas*, Sw., est cosmopolite.

12. PARALLELOGRAMMUM, Kze., *Linn.*, XIII, p. 146. — Ce serait là une simple forme de l'*A. Filix-Mas*, L. Serra os Orgaos, Gardner, n° 5944. Nous n'avons pas vu cette forme provenant du Brésil.

13. BASILARE, F.

Frondibus oblongis, glabris, acuminatis; petiolo rachique squamosis; squamis lanceolatis, fulvis; frondulis inferioribus oppositis, alteris alternis, breve petiolatis, lanceolatis, obtusiusculis; mesonevris squamosis, approximatis; segmentis oblongis, leviter arcuatis; sporotheciis ad basim nervillarum simplicium circa mesonevron evolutis; sporangiis rotundis; annulo pellucido, 12 articulato; sporis ovoideis, fuscis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2373).

Filix frondulis profunde pinnatifidis; segmentis squamosis; sporangiis longe pedicellatis, fasciculatis.

ICON. : *Tab. XLIII, fig. 2.*

(Longueur : 75 centim., y compris le pétiole, qui mesure 28-30 centim.; frondules, 10 centim. sur 2-2,2 de largeur; entre-nœuds, 2 centim.)

Dans cette espèce, les frondules sont très-rapprochées; elles se touchent ou même s'imbriquent parfois; nous en comptons 20 paires jusqu'à la pointe, qui est

pinnatifide et porte des segments arqués; le nom spécifique s'entend des sporothèces qui naissent à la base des nervilles, à leur point d'insertion avec les mésonèvres.

† 14. NERVATUM, F.

Frondibus patulis, rachi sub et supra canaliculato, fusco; squamis sparsis, lanceolatis, nigrescentibus; frondulis lanceolatis, acutis, basi breve petiolatis; mesonevro squamoso; segmentis oblongis, obtusis; nervillis simplicibus, curvatis, numerosis, tenuibus, oculo nudo perspicuis; sporotheciis centralibus, indusio tenui.

Habitat in Serra os Orgaos *Brasiliensium* (Glaziou, n° 1764).

Filix a me visa juvenis et cum sporotheciis immaturis.

(Longueur des frondules, 14-16 centim. sur 3,2 de largeur.)

La nervation, toute particulière, de cette plante la fera facilement reconnaître. Ses nervilles courbes, au nombre de 10 à 12 paires, quoique fort déliées, se dessinent nettement sur la marge. Elle prend, par la dessiccation, une teinte jaune-verdâtre agréable à l'œil; les segments pinnulaires sont entiers, très-rapprochés (24 environ) et libres seulement dans les deux tiers de leur étendue. Les sporothèces naissent au centre de la nerville.

15. ERIOCAULON, F.

Frondibus oblongis; petiolo longo, robusto; squamis flavidulis, lanatis, nec non rachibus abunde vestitis; frondulis patulis, profunde pinnatifidis, inferioribus oppositis, centralibus alternis, longe acuminatis, sessilibus, teneris, rachi breve piloso; segmentis elongato-oblongis, arcuatis, obtusissimis, ciliatis, brevissime pilosis; sporotheciis rufis, indusio crasso, persistente, 8-9 seriatis, distinctis; sporangiis magnitudine mediocri, rotundis; annulo pellucido, 12-14 articulato; sporis vitreis, ovoideis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2369).

Filix magna, longe petiolata, petiolo rachique squamis lanatis abunde vestitis; nervillis simplicibus.

ICON.: *Tab. XLIV, fig. 1.*

(Longueur : frondules, 18-20 centim. sur 3 centim. de largeur; pétiole de la grosseur d'une plume de cygne, mesurant 50 centim.)

Cette espèce, que nous n'avons pas entière, est suffisamment caractérisée par les écailles jaunâtres, d'aspect laineux, très-longues, à marge entière, portant

seulement quelques dents, sous lesquelles disparaissent, dans toute leur étendue, le pétiole et le rachis qui en est la continuation; le mésonèvre des frondules est écailleux, mais les écailles sont plus petites et moins abondantes.

† 16. AMAUROLEPIS, F.

Frondibus oblongis, glabris, petiolo rachique robustis, squamosis, squamis brunneis, lanceolatis, acuminatis; frondulis breve petiolatis, profunde pinnatifidis, lanceolatis, acuminatis, patulis, racheolo rufescente, tomentoso; segmentis ovoideis, curvatis, obtusissimis, teneris, nervillis simplicibus, marginibus integris, ciliolatis; sporotheciis parvulis, 8-10 seriatis; sporangiis rotundis, 12-14 articulatis, sporis ovoideis, episporiatis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, nos 1680, à Tijuca, et 2370, 2371 et 2372).

Filix magna, petiolo tricanaliculato, squamis fuscis, linearibus, rachique abunde coopertis.

ICON.: *Tab. XLIV, fig. 2.*

(Longueur: frondules, 17-20 centim. sur 3-4 de largeur; pétiole de la grosseur d'une plume de cygne.)

Cette espèce a le pétiole et le rachis abondamment couverts d'écailles étalées, brunes, étroitement lancéolées, un peu luisantes; le pétiole est fortement canaliculé; frondules parfois sous-opposées; sporothèces petits, situés entre la marge et le mésonèvre.

† 17. ISABELLINUM, F.

Frondibus amplis, basi decrescentibus, stipite trisulcato; rachi subquadrangulari, supra canaliculato, rufescente; frondulis intermediis lanceolatis, profunde pinnatifidis, acutis, infimis abbreviatis, palmatis; segmentis oblongis, crenatis, apice repandis, sinu angusto separatis; sporotheciis 10-11 seriatis, rufis; sporangiis subrotundis, annulo 12-14 articulato, perfacile soluto; sporis ovoideis, episporiatis.

Habitat in Brasilia fluminensi, ubi colligebat Dona Isabella, Petri II, imperatoris Brasiliæ, filia (Glaziou, no 2368).

ICON.: *Tab. XLV, fig. 2.*

Cette espèce est distincte entre toutes ses congénères par les frondules inférieures, qui affectent une forme palmée; nous la dédions à Mme la princesse Isabelle d'Eu, qui l'a recueillie à Pétropolis; cette dame se plaît dans les études de

la botanique, et la cryptogamie a ses préférences; c'est donc avec empressement que nous lui faisons cet hommage et que nous rattachons son nom à cette fougère curieuse.

† 18. NEPHRODIOIDES, F.

Frondibus oblongis, glaberrimis, petiolo longo, lævi, depresso, rachique helveolis, apice pinnatifidis; frondulis lanceolatis, curvatis, caudatis, mesonevro albescente; segmentis oblongis, integerrimis, apice dentatis, infima longiore, supra rachim imbricata; nervillis tenuissimis, simplicibus, liberis, fortuito in segmentis fertilibus conniventibus; sporotheciis 6-7 seriatis; indusio cordiformi, glabriusculo, crasso; sporangiis pyriformibus, annulo 14 articulato; sporis ovoideis, nigrescentibus, papillosis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2359).

Filix elata, glabra, frondulis inferioribus longitudine aliis æqualibus, sed apice acutis.

ICON. : *Tab. XLVI, fig. 1.*

(Longueur: 1 mètre et plus, dont le pétiole fait le tiers; frondules, 16-18 sur 1,8 centim. de largeur; entre-nœuds mesurés au centre, 4 centim.)

Cette fougère appartient, par le *facies*, au petit groupe des *A. patens, molle, violascens, Kaulfussii* et *ctenitis*, mais elle est glabre dans toutes ses parties; les frondules sont arquées, alternes, avec deux segments inférieurs aigus, plus longs que les autres et dont le supérieur s'imbrique sur le rachis; les nervilles sont serrées et fort déliées. On trouve, quoique très-rarement, les basilaires conniventes, circonstance qui justifie le nom spécifique.

3. Frondes triternées.

19. CICUTARIUM, Willd., *Filic.*, p. 215; *Nephrodium funestum*, Hook., *Spec. filic.*, IV, p. 129, tab. 259. Martius, *Herb. Bras.*, n° 321; Spruce, Gardner, etc. — Les frondes sont ternées par le bas, avec pareille tendance, pour les principaux rameaux; elle a un indusium glabre; les segments sont sinueux et assez larges; elle prend, dans les herbiers, une couleur d'un vert sombre. Cette fougère a un habitat très-étendu.

4. Frondes bi- ou multipinnées.

† 20. FLEXUOSUM, F.

Frondibus bipinnatis, pilosulis; rachibus flexuosis, tomentosis squamosisque; frondulis primariis apice pinnatifidis; frondulis secundariis plus minusve

deflexis, inferioribus breve petiolatis, intermediis sessilibus, supremis adnatis, segmentis oblongis, sinu angustissimo separatis, ultimo ovoideo distincto; sporotheciis parvis, 6-7 seriatis; sporangiis mediocri crassitudine; annulo 12-14 articulato; sporis breve ovoideis, papillosis, nigrescentibus.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2458).

Filix habitu proprio, rachibus flexuosis et frondulis deflexis.

Icon. : *Tab. XLVII, fig. 2.*

(Longueur: frondules primaires, 40 centim.; secondaires, 8 centim. sur 2,5 de largeur.)

Le port de cette plante est tout spécial. Certaines frondes ont un rachis en zigzag, chez d'autres il n'est que fortement flexueux; il porte, ainsi que ses subdivisions, des écailles dorées, pellucides, lancéolées, acuminées et ciliées. Le port de cette curieuse fougère semble indiquer une espèce ramifiée, grimpante, mais sans crampons; dans le spécimen à rachis en zigzag, les frondules sont oblongues, dentées, et assez semblables aux folioles du *Poterium Sanguisorba*, L.

† 21. biforme, F.

Frondibus sterilibus bipinnatis, glabris, rachi helveolo, squamuloso; frondulis primariis oblongis, acutis; secundariis ovatis, obtusiusculis, basi pinnatis, segmentis ovatis, denticulatis, opacis; frondibus fertilibus tripinnatis, partitionibus angustioribus, ultimis elongatis; sporotheciis submarginantibus; indusio cordiformi, tenui; sporangiis rotundis, annulo 16-18 articulato.

Habitat in Brasilia fluminensi, loco dicto Altomacahe (Glaziou, n° 2393).

Filix frondosa, frondibus sterilibus et fertilibus diversis.

(Longueur : frondules primaires inférieures des frondes stériles, 24 centim., avec des entre-nœuds de 6,5 centim. Nous comptons une vingtaine de paires de frondules, et sur celles-ci autant de frondules de 2e ordre.)

Les pétioles et les rachis ont une couleur paille; ils portent des écailles brunâtres, très-étroites. Les frondules des frondes fertiles sont divisées en segments irréguliers assez étroits. Le port de cette plante se rapproche de celui du *Polystichum coriaceum*, Schott.

22. acutum, Hook., *Spec. filic.*, IV, 147, *sub nephrodio*, t. 271. Sellow (H. Hook.); Spruce, n° 4662. — Grande espèce à segments aigus, oblongs, dentés en scie; indusium cordé-réniforme et de couleur brune. (N. V.)

† 23. crenulans, F.

Frondibus amplis, tripinnatis, patulis, rachi primario robusto, sulcato, minutim villoso; frondulis primariis oblongis, breve petiolatis, rachi basi incras-

sato, tomentoso; frondulis secundariis lanceolatis, acuminatis, brevissime pedicellatis; mesonevro tenui, squamuloso; segmentis inferioribus sessilibus, coadunatis, crenulatis, villosulis, ad apicem integris; sporotheciis rufis, partem superiorem segmentorum occupantibus; indusio glabro, coriaceo, succineo colore, persistente; sporangiis parvis; annulo 14-16 articulato, sporis subtrigonoideis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, nos 1781 et 2351).

Filix dilatata, aperta, brachiata, petiolo robusto, pilis simplicibus, subulatis parce vestita; siccitate viridis.

Icon. : *Tab. XLVII, fig. 1.*

(Longueur des frondules primaires, 50 centim.; les secondaires, 14-16 sur 3 centim. de largeur ; elles sont inégales; la rangée interne en a de plus courtes.)

Très-grande espèce, fort souple, laissant facilement voir la nervation; la base du pétiole est entourée d'écailles dorées, linéaires et rubanées, qui forment un coussinet très-épais; le rachis primaire est gros, sillonné, revêtu de poils grisâtres, très-courts; le rachis secondaire est bicanaliculé; le mésonèvre des frondules de 3e ordre est hérissé de petites écailles piliformes plus développées que sur les autres parties de la plante; les segments sont dressés, crénelés, mais en approchant du sommet ils deviennent entiers; la pointe est longuement ondulée. Le rachis principal est parcouru par 6 faisceaux vasculaires cylindriques, auxquels viennent s'ajouter 4 autres faisceaux plus petits. Les segments sont chargés de 6-8 sporothèces pour chacune des rangées.

24. consobrinum, F., *Hist. foug. et lycop. des Antill.*, p. 85. Glaziou, Rio-Janeiro, nos 979 et 2350; H. Gauthier, à Desterro; île Sainte-Catherine. — Très-grande espèce; très-divisée; glabriuscule sur les lames, velue tomenteuse sur les rachis. Les indusium sont roussâtres, cordiformes, assez grands, persistants, épais, et s'imbriquent parfois par leurs bords. Nous l'avons décrite (ouvrage cité) sur une plante de la Guadeloupe. Le pétiole est robuste et porte à la base un coussinet d'écailles fauves, linéaires-rubanées, un peu crépues et fort longues.

† 25. phæochlamys, F.

Frondibus 3-4 pinnatis, patulis, squamulosis, rachibus helveolis; frondulis primariis oblongis, basi subtripinnatis, apice decrescentibus, petiolatis; frondulis secundariis lanceolatis, acutis, petiolatis, apertis; frondulis ter-

tiariis decurrentibus; segmentis superioribus ovatis, crenulatis; sporotheciis crassis, submarginantibus; indusio glabro, crasso, rufo, persistente; annulo 16-18 articulato; sporis atris, ovatis, episporiatis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 1782).

Filix effusa, ampla, partitionibus remotiusculis; frondulis tertiariis decurrentibus; indusio rufescente.

Icon. : *Tab. XLVII, fig. 2.*

(Longueur des frondes primaires, 45 centim., avec des frondules de 2e ordre, qui atteignent 15-16 centim., et des frondules de 3e ordre, qui mesurent 4 centim.)

Cette fougère est très-ample, glabre, avec des écailles éparses, lancéolées et brunâtres; les frondules primaires sont tripinnées à la base, bipinnées au centre et simplement pinnées au sommet. Toutes les divisions de la fronde sont écartées les unes des autres. Le rachis est bi-canaliculé du côté supérieur. Elle est nettement caractérisée par ses sporothèces, dont les indusium, de couleur rousse, épais et à marge entière, ont un tissu à mailles d'apparence quadrangulaires, sous le microscope.

† 26. RAMOSUM, F.

Frondibus tripinnatis, squamosis, ramosis; stipite undulato, squamis adpressis, angustis, vestito; pinnis primariis pyramidatis; frondulis secundariis oblongis, petiolatis, rachi depresso, squamuloso; tertiariis semipinnatis, oblongis; segmentis crenatis, obtusis; sporotheciis marginantibus, semiglobosis; indusio cordiformi, sinu brevi; sporangiis ovatis, annulo latissimo, 10-12 articulato; sporis brunneis, subtrigonis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2391).

Filix magna, glabra, stipite ramoso insignis.

Icon. : *Tab. XLVII, fig. 3.*

(Longueur des frondules primaires, 40 centim. sur 26 d'envergure; les frondules tertiaires de la base, 3,5 centim.)

Cette plante est suffisamment caractérisée par des souches rameuses, ondulées, couvertes d'écailles roussâtres imbriquées ; les frondules secondaires sont très-ouvertes et leurs derniers segments obtus, glabres et fortement crénelés.

† 27. MACRUM, F.

Frondibus tripinnatis, glabris, rachibus laxe squamosis; frondulis primariis oblongis, patulis, secundariis basi bipinnatis, tertiariis obovatis, basi decur-

rentibus, segmentis crenulatis, obtusis, apice dentatis; fertilibus angustioribus; sporotheciis fuscis, remotiusculis; sporangiis ovatis; indusio crasso, annulo 14-16 articulato, sporis crassiusculis, polymorphis, raro trigonis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2390).

Filix magna, glabra, frondulis tertiariis crenulatis, decurrentibus.

Icon.: *Tab. XLVIII, fig. 1.*

(Longueur des frondules, 50 centim.; ce qui donne à la fronde entière 1 mètre d'amplitude.)

Le nom spécifique attribué à cette espèce ne consacre pas un caractère unique; la décurrence des frondules de 3e ordre sur leur rachis a plus de valeur. La fronde fertile et la fronde stérile diffèrent notablement. Dans cette dernière les frondules tertiaires sont beaucoup plus étroites et paraissent plus écartées; elle a enfin, dans tout son ensemble, un aspect appauvri, que n'a pas l'autre.

† 28. LATISSIMUM, F.

Frondibus quadripinnatis, rigidis, glaberrimis, rachibus helveolis, squamulosis, opacis; frondulis primariis triangularibus; frondulis secundariis remotis, petiolatis; tertiariis semipinnatis; segmentis ovoideis, crenato-dentatis; sporotheciis marginantibus, rufis, satis magnis; indusio crasso, persistente; sporangiis succineis; annulo concolore, 12-14 articulato; sporis reniformibus, rotundis, lævibus, vitreis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, nos 979, 2389 et 2394. Vauthier, Serra os Orgaos [1833], n° 623).

Filix ampla, dilatata; frondibus sterilibus et fertilibus diversis.

Icon.: *Tab. XLVIII, fig. 2.*

(Longueur totale, 1 mètre 50 centim. et plus; des frondules primaires, 40 centim.; des secondaires, mesurées à la base de celles-ci, 20-24, sur 8-9 d'envergure.)

Très-grande espèce, qu'il est difficile de décrire assez clairement pour qu'il soit possible de la reconnaître; remarque qui s'étend aux espèces pluripinnées, lesquelles, très-distinctes pour les yeux du botaniste qui les décrit, ne permettent aucune diagnose suffisante par des mots; il faut s'aider de figures et tout au moins de détails capables de fixer les incertitudes. Il n'y a pour cette espèce et la suivante, très-voisines l'une de l'autre, que la dissimilitude des frondes stériles et des frondes fertiles, qui s'accompagne de l'étroitesse des segments fructifères; ceux-ci portent de 2 à 4 sporothèces. Le port de cette espèce est spécial; il s'éloigne de nos espèces européennes et même du facies de ses congénères exotiques.

† 29. DICKSONIOIDES, F.

Frondibus tenerrimis, tripinnatis, in ambitu triangularibus; petiolis et rachibus rufescentibus, tenuibus, brevissime tomentosis, frondulis primariis oblongis, longe acuminatis, secundariis obtusis, tertiariis crenatis, basi cuneatis; sporotheciis apicilaribus; indusio crasso, suborbiculari fusco.

Habitat prope San-Gabriel *ad* Rio-Negro [*Brasilia borealis*], (Glaziou, n° 2129).

Filix tenera, aspectu Dicksoniarum.

ICON. : *Tab. XLIX, fig. 1.*

(Longueur : 70 centim. sur 10 centim. de développement à la base; les segments fructifères, ovoïdes et crénelés, ne dépassent pas 7 millim. de hauteur.)

En disant que cette espèce a le port d'un *Dicksonia*, on l'a suffisamment caractérisée. Elle diffère de toutes les autres par des sporothèces marginaux, situés à l'extrémité des nervilles; cette particularité en ferait un *Amauropelta* (Kze., *Die Farrenkr.*, I, p. 109, t. 51), mais avec un port très-différent. L'*A. dicksonioides* pourrait devenir le type d'un genre spécial.

30. FURCATUM, Klotz., *Linn.*, XX, p. 371 ; Hook., *Sp. filic.*, IV, p. 136. Serra os Orgaos, Gardner, n° 189. — Espèce tripinnée, largement ovale, aiguë, pétiole brunâtre; segments oblongs, obtus, pinnatifides, dentés; indusium réniforme, glabre, brunâtre. Elle est indiquée au Brésil sur l'autorité de M. Hooker.

** *Indusium villeux ou glabriuscule.*

31. PATENS, Radd., *Filic. Bras.*, p. 32, t. 48; Willd., *Filic.*, p. 244; *Polypodium nymphale,* Schkh., *Crypt.*, p. 36, t. 34. Rio-Janeiro, Radd., *l. c.* Brésil, Gardner, n°s 2989 et 5220; Twedie, Milne; Martius, *Herb. Bras.*, n° 390, *synon. exclus.;* Rio, Gaudichaud, n° 194, et Glaziou, n° 389 (*partim*). — Espèce facile à reconnaître à ses frondules sessiles, dont les deux segments inférieurs, plus grands que les autres, sont pinnés. Elle est très-voisine de l'espèce suivante, avec laquelle on la confond souvent; les indusium sont plans, minces, blanchâtres et glabriuscules.

32. CONSPERSUM, Schrad., *Gœtt. gel. Anz.*, 1864, p. 869. *A. macrourum*, Klfss. *Enum.*, p. 239. Martius, *Herb. Bras.*, n° 314. Rio-Janeiro, Glaziou, n° 2360. — Se rapproche de l'espèce précédente. Ses segments sont arqués et terminés en pointe fort longue, entière. Elle est velue et atteint plus d'un mètre de hauteur, avec des frondules centrales qui mesurent 13-15 centim. Les indusium sont hérissés de poils courts.

33. OLIGOCARPON, Willd., *Filic.*, p. 201, *sub polypodio.* Rio-Janeiro, Glaziou, n° 389 (*partim*). Ile Sainte-Catherine, H. Gauthier. — Toute la plante est revêtue de poils grisâtres, fort courts, le rachis est tomenteux. Elle a le port des deux espèces précédentes.

34. GERMANI, L'Hermin., *in litteris.* F., *Hist. foug. et lycop. Antill.*, p. 82, t. 23, f. 3. Glaziou, Rio-Janeiro, n° 392. — Elle se rapproche de l'*A. patens,* Sw. Les frondes sont molles, villeuses et réunies en assez grand nombre sur une même souche.

35. VIOLASCENS, Lk., *Spec. filic.*, p. 101. Brésil, Lk., *l. c.* — Cette espèce est presque spontanée dans les serres à fougères; elle a, particulièrement sur le stipe, une couleur violâtre assez prononcée; le pétiole porte des poils dirigés en arrière; c'est une plante robuste, très-velue, pouvant s'élever à 75-80 centim.

36. KAULFUSSII, Lk., *Filic. sp.*, p. 101. Brésil, Lk., *l. c.* — Elle a le port et les dimensions de l'espèce précédente; les frondes sont moins velues, ainsi que l'indusium. Nous ne l'avons pas vue spontanée.

37. CTENITIS, Lk., *l. c.*, p. 101. Brésil, *teste* Lk., *l. c.* — Frondules lancéolées, très-obtuses, avec des segments dentés en scie; un pétiole et des rachis auxquels s'attachent des poils écailleux. Elle se rapproche du *Polypodium* (*phegopteris*), *falciculatum,* de Raddi. (N. V.)

38. TETRAGONUM, Hook., *Spec. filic.*, IV, p. 103, *synon. exclus.* Gardner, n°s 16 et 190? Glaziou, Rio-Janeiro, n° 389. — Frondules glabriuscules; pétioles et rachis quadrangulaires. Cette espèce a quelque rapport avec l'*A. conspersum,* Schrad. M. Hooker, *l. c.*, dit que les nervilles basilaires sont conniventes, ce qui en ferait un *Nephrodium.* (N. V.)

† 39. SERICEUM, F.

Frondibus pinnato-pinnatifidis, oblongis; petiolo longiusculo, basi squamis fuscis, lanceolatis, acuminatis obsito; rachi supra late canaliculato; frondulis lanceolatis, patulis, longe acuminatis, sessilibus, usque ad apicem fertilibus, supra et infra pilis brevibus, sericeis coopertis; segmentis ovoideis, aliquando mucronulatis; sporotheciis marginantibus, approximatis sed dis-

tinctis, 7-9 per seriem, in segmentis inferioribus frondularum nascentibus; indusio villoso, pilis simplicibus; sporangiis parvulis; annulo angusto, 18-20 articulato, sporis ovoideis, episporiatis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n°s 957 et 1658).

Filix, pilis sericeis, cinereis notata, circa A. patentem *collocanda.*

Icon. : *Tab. XLII, fig. 1.*

(Longueur, 60 centim., dont le pétiole fait le tiers; frondule, 10-12 centim., mesurée à la base de la fronde, sur 2,2 centim. de largeur.)

Cette espèce, quoique fort distincte dans son ensemble, n'a pas une physionomie spéciale; les frondules sont fructifères jusqu'au sommet de la pointe qui les termine; les sporothèces dépriment légèrement la lame, qui est ciliée; les nervilles sont simples. Toute la plante est couverte de poils strigilleux.

† 40. RIVULARIOIDES, *F.*

Frondibus lanceolatis, elongatis, glaberrimis, acuminatis, basi sensim decrescentibus; petiolis longiusculis, rachibusque debilibus, helveolis læviusculis; frondulis alternis, sessilibus, lanceolatis, caudatis, pinnatifidis; segmentis ovatis, fructiferis angustioribus; sporotheciis marginantibus, parvulis; indusio ovoideo (Oochlamydeo) parvulo; pilis marginantibus, rigidis; sporangiis globulosis, annulo 14-16 articulato; sporis subreniformibus.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2358).

Filix elata, lanceolata, nervillis simplicibus, tenuibus. Affinis cum A. rivulorum Radd., *sed frondibus angustioribus et indusio villoso.*

Icon. : *Tab. L, fig. 1.*

(Longueur, 80 centim. sur 7-8 centim. d'envergure; entre-nœuds, 2 centim. Le pétiole, qui est presque filiforme, se charge, dans la plus grande partie de son étendue, de frondules écartées, à l'état rudimentaire.)

Les frondes fertiles portent des segments plus étroits; les pétioles sont écailleux et villeux à la base; nous comptons jusqu'à 30 paires de frondules.

† 41. QUADRANGULARE, F.

Frondibus patulis; rachi quadrangulari, infra late canaliculato, cinereo, pilis brevissimis cooperto; frondulis lanceolatis, vix petiolatis, caudatis, cauda sterili, mesonevro angustissimo, tomentoso; segmentis oblongis, leviter arcuatis, inferne pilosis; pilis stellatis, brevibus, ala connectente angusta; sporangiis rubellis, parvis, approximatis, sed distinctis; indusio glabres-

cente, ad marginem pilos stellatos ferente; sporangiis rotundatis; annulo angusto, 20 articulato; sporis ellipticis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 962).

Filix cinerascens, apertissima, frondulis horizontalibus, sæpe excurvatis.

Icon. : *Tab. L, fig. 2.*

(Les plus grandes frondules atteignent 20 centim. à la base de la fronde, sur 3 centim. de largeur, avec des segments de 5 millim. de largeur.)

Cette fougère prend place à côté des *A. patens, Kaulfussii* et *conspersum;* elle est caractérisée par un rachis parfaitement quadrangulaire, par des poils étoilés, que l'on retrouve jusque sur l'indusium, par de longues frondules à segments, libres jusqu'aux deux tiers de leur longueur, portant des séries composées de 9-11 sporothèces de couleur rougeâtre. Nous ne possédons pas la plante entière; elle doit atteindre ou même dépasser 1 mètre; elle conserve, après dessiccation, une couleur verte intense. Les segments pinnulaires portent, au point supérieur de leur jonction, une petite membranule blanchâtre et pellucide, que l'on observe surtout chez les *Nephrodium*, dont elle a le port, mais avec des nervilles libres.

††† *Espèces se rapprochant, par le port, des* Polystichum.

† 42. gracilipes, F.

Frondibus triangularibus, glaberrimis; petiolo longissimo, tenui, gracili, helveolo, basi nigrescente, squamoso; squamis anguste lanceolatis, rufis, margine integerrimis; frondulis basilaribus majoribus, omnibus curvatis, alternis; segmentis ovatis, sæpe monocarpidibus, argute dentatis, ad apicem frequenter bi- tridentatis, dentibus remotiusculis; sporotheciis magnis, læte rufescentibus; indusio glabro, orbiculari, sinu angusto, ambitu integro; receptaculo prominente, punctiformi; sporangiis rotundatis; annulo 16-18 articulato, sporis rotundis, nigrescentibus.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n°s 2053, 2382, 2364 et 2462).

Filix gracilis, flexibilis, triangularis; petiolo longissimo, gracili, squamoso; squamis angustis, fulvis, patulis; siccitate colorem viridem servat.

Icon. : *Tab. XLIX, fig. 2.*

(Longueur: 45-48 centim., dont le pétiole fait les deux tiers ou même la moitié; les frondules basilaires ont de 15 à 18 centim. de développement.)

Cette jolie espèce est pinnée dans toutes ses parties, avec des segments longuement dentés; elle appartient à un petit groupe qui renferme 4 plantes distinctes; savoir: 1° *A. tenerum*, F., *Gen. filic.*, p. 280, à sporothèces fort petits, dont l'indusium

est tellement exigu et si facilement caduc, qu'il est presque hypothétique; les frondules et les segments, notablement rapprochés, sont portés en grand nombre sur une souche brune assez grosse; 2° l'*A. formosum*, F., *l. c.*, p. 296, à segments allongés, à dents très-obtuses; le pétiole, courbé à la base, est couvert de belles écailles jaunâtres, rubanées; 3° l'*A. jucundum*, F., 10e *Mém.*, p. 41, t. 42, f. 1; Cuba, Linden, n° 2115; Mexique, Galeotti, n° 6563, à segments longuement aristés; 4° et enfin l'*A. gracilipes*, que nous venons de décrire.

43. TENERUM, F., *Polystichum tenerum*, F., *Gen. filic.*, p. 280; Brésil, Claussen. (H. F.) — L'indusium est cordiforme et non pelté, circonstance qui décide du genre. Les rapports de facies avec les *Polystichum* sont manifestes. La souche est fort grosse et couverte d'écailles linéaires très-allongées et brunâtres.

44. DENTICULATUM, Sw., *Syn. filic.*, p. 57; Willd., *Filic.*, p. 272; *A. Klotzschii*; Hook., *Icon. pl.*, t. 923. Brésil, Gardner, nos 1881, 5953, etc. Cette plante a tout à fait le port d'un *Polystichum*. — Frondes surdécomposées, quadripinnées, à frondules ovales, cunéiformes, incisées-dentées, et comme épineuses.

45. AMPLISSIMUM, Hook., *Spec. fil.*, IV, 145. *Polystichum*, Presl. Brésil, Sellow; Gardner, nos 191 et 5946. — Segments obtus, ciliés, une ou deux fois dentés; ils ne portent qu'un sporothèce; le pétiole et le rachis sont paléacés.

64. CYSTOPTERIS, Bernh., *in Schrad. N. Journ.*, 1806, p. 49, t. 11, f. 7.

1. BRASILIANA, Presl., *Tent. pt.*, p. 93. *Aspidium Brasilianum*, Spreng., *Syst.*, IV, p. 109 (*nomen tantum*). — Plante de genre douteux.

2. EMARGINULATA, Presl., *l. c.*, I, 93; *ejusd. Epim. bot.*, p. 65. — Même observation.

NB. De ces deux espèces ci-dessus énumérées, l'une étant incertaine et l'autre mal connue, il est permis de croire, jusqu'à présent, que le genre *Cystopteris* n'existe pas au Brésil.

65. LEPIDONEVRON, F., *Genera filicum*, p. 301, t. 23 C, f. 1.

1. LONGIFOLIUM, F., *l. c. Aspidium longifolium*, Pohl. (H. F.) Brésil, Martius.

2. OBTUSATUM, F., *l. c. Aspidium exaltatum*, Blanchet, *non auct.* La Jacobine, Blanchet. — Remarquable par les dents aiguës des segments de la fronde.

3. RUFESCENS, F., *l. c. Aspidium rufescens,* Schrad., *Gœtt. gel. Anz.*, 1824, p. 869. *Nephrolepis ensifolia,* var. β, Th. Moor. Brésil, Mart., *Herb. Brasil.*, n° 322, Blanchet, la Jacobine; Rio-Janeiro, Glaziou, n° 2353. — Elle est villeuse sur la lame inférieure et sur les mésonèvres, écailleuse sur le pétiole et le rachis; elle peut atteindre jusqu'à 1 mètre de longueur.

4. SESQUIPEDALE, F., *Aspidium sesquipedale,* Willd., *Filic.*, p. 230. Brésil, Hoffmannsegg, *teste* Willdenow, *l. c.* — Plante pinnée; à frondules lancéolées, aiguës, à marge ponctuée sur la lame supérieure, à base tronquée, auriculée vers le haut et tronquée inférieurement; les sporothèces sont marginaux et les stipes paléacés.

66. OLEANDRA, Cavanill., *Prælect.*, 1801, n° 623.

1. NODOSA, Presl., *Tent. pterid.*, p. 78. *Aspidium nodosum,* Willd., *Filic.*, p. 211. *A. articulatum,* Schkh., *Crypt. Gew.*, p. 28, t. 27. Rio-Janeiro, Glaziou, n°s 2153 et 3163, Serra do Couto (1869). — Belle fougère, pellucide, luisante, à sporothèces épars, à stipe rampant, hérissé d'écailles, atteignant souvent une longueur considérable.

67. NEPHRODIUM, Rich. *in* Mich., *Fl. Amer. bor.*, II, p. 266.

1. MOLLE, Schott., *Gen. filic.*, Desv., *Mém. soc. Linn.*, VI, p. 258; Brésil, Gardner, n°s 1107 et 1902, Sellow; Sainte-Catherine, à Desterro, H. Gauthier.

2. POHLIANUM, Presl., *Tent. pterid.*, p. 81. *Aspidium goggylodus,* Schkh., *Crypt. Gew.*, p. 193, t. 33 C. Martius, *Herb. Bras.*, n° 311; Glaziou, Rio-Janeiro, n°s 1224, 2362, forme plus étroite, et n° 2363, plus grande et plus dilatée; Mme Fanny Gauthier, île Sainte-Catherine, à Desterro. C'est le *Goniopteris cheilocarpa,* F., *Gen. filic.*, p. 251; l'*Aspidium obtusatum*, Willd., *Filic.*, p. 241, et l'*A.* (*cyclosorus*) *consanguineum,* Kze. (H.F.). — Cette espèce, parfaitement distincte, très-commune au Brésil, peut atteindre jusqu'à 1 mètre, avec des frondules qui mesurent de 10 à 15 centim.; elles sont étroites, élégamment lobées, pointues et fructifères jusqu'à leur extrémité; la consistance est légèrement cartilagineuse; les sporanges, glabres et ovales, portent de 16 à 18 articulations à leur anneau; les spores sont ovales et comme vitreuses. Elle varie par des frondes plus ou moins étroites et plus ou moins dressées. Le rhizome est assez délié et rampant.

3. CHRYSOLOBUM, Lk., *Filic. sp.*, p. 102, *sub aspidio.* Brésil (Lk., *l. c.*). — Frondes atteignant 35-60 centim., avec des frondules de 8-9 centim. sur 5 centim. de largeur; elle est pubescente, squameuse, avec un indusium glabrescent. Cette fougère est encore peu connue.

68. SAGENIA, Presl., *Tentam. pterid.*, p. 86.

1. SORBIFOLIA, Presl., *l. c.*, p. 87. *Aspidium,* Venten. *in Willd. Filic.*, p. 223. Brésil, de Gestas (H. F.). Stipe rampant, glabre; pétiole assez court; rachis écailleux; frondules lancéolées, alternes, dentées, sous-auriculées; le mésonèvre est couvert de petites écailles ventrues.

69. CARDIOCHLÆNA, F., *Gen. filic.*, p. 314.

1. MACROPHYLLA, Sw., *Syn. filic.*, p. 43; *sub aspidio;* Willd., *Filic.*, p. 217. *Cardiochlæna macrophylla,* F., *l. c.*, p. 315, t. 24 B. Rio-Janeiro, Glaziou, n°s 986 et 2352. — Cette fougère, extrêmement répandue sous les tropiques et l'équateur, mériterait l'épithète de *varians,* tant elle change ses formes; polymorphe à ce point de permettre, si on le voulait bien, de faire un grand nombre d'espèces d'un type unique; nous allons indiquer les principales variations, telles qu'elles se trouvent dans notre herbier, sans distinction de localités.

β *pinnata.* La Martinique, Mlle Rivoire. — C'est la seule forme qui ne soit pas divisée à la base; frondules rapprochées; sporothèces très-gros.

γ *lata.* Guadeloupe, L'Herminier; la Martinique, Hahn; Brésil, Glaziou, n°s 986 et 2352. — Frondules très-amples; la terminale mesurant jusqu'à 35 centim.; sporanges très-grosses.

δ *distans.* Brésil; Glaziou, n° 969; Martius, *Herb.*, n° 312; Bahia, Blanchet. — Frondules étroites, distantes; sporothèces gros.

ε *decrescens.* Rio-Janeiro, Glaziou, n° 971. — Les frondules décroissent vers le haut et la terminale est lancéolée, assez étroite; sporothèces assez gros, naissant près de la marge.

ζ *acuminata.* Rio-Janeiro, Glaziou, n°s 405 et 406. — Frondules terminales très-longues, sinuées; toutes longuement acuminées; sporothèces assez petits.

η *sinuata.* Rio-Janeiro, Glaziou, n° 1682; Claussen, n° 123; Moritz, Caraccas, n° 112 (H. F.). — Frondes sinuées, lobées, tendant à la forme pinnatifide; sporothèces assez gros.

ϕ *discreta.* Jamaïque, par Wilson. — Frondules très-longues, à marge ondulée; sporothèces très-gros et très-écartés.

Quoique nombreuses, ces formes ne sont pas les seules.

2. PILOSA, F., 10e *Mém.*, p. 45, t. 40, f. 4. Rio-Janeiro, Weddell, nº 656; Sainte-Catherine, à Desterro, par Alburquerque. — C'est la seule espèce qui porte des poils sur les lames et le rachis; ils y sont très-abondants.

NB. Le genre *Aspidium,* type de ce groupe, réunit à lui seul plus des trois quarts des fougères qui le composent. Il est représenté en Europe par une dizaine d'espèces. Le facies des *Aspidium* exotiques rappelle tout à fait les nôtres. La diagnose présente certaines difficultés; elles se rattachent parfois aux *Phegopteris* et n'en diffèrent, en effet, souvent que par la présence de l'indusium; ce tégument se présente sous des formes assez variées, qui permettraient l'établissement de plusieurs sous-genres; la plus distincte est celle des *Oochlamys* (*Indusium ovoideum*); elle s'accompagne de quelques particularités dans la manière dont se terminent les frondes. Les *Cystopteris* se rapprochent beaucoup des nôtres; le *C. fragilis* est propre aux deux continents. Les genres *Lepidonevron, Oleandra, Sagenia, Cardiochlæna* et *Faydenia,* qui n'a point été trouvé au Brésil, ont une physionomie qui leur est propre; quelques *Nephrodium* se rapprochent des *Polypodium,* et le *Lepidonevron* a tout à fait le port des *Nephrolepis.* Le Brésil possède 58 espèces d'aspidiées, réparties très-inégalement dans 6 genres bien distincts; les Antilles, qui comptent deux genres de plus, n'ont pas moins de 73 espèces; le Mexique n'en a que 39; mais ce nombre est destiné à s'accroître, les fougères de cette vaste contrée étant soumises à des études sérieuses, auxquelles se livre avec succès M. le docteur Fournier.

XIX. NÉPHROLÉPIDÉES.

70. NEPHROLEPIS, Schott., *Gen. filic., reduct.*

1. EXALTATA, Schott., *l. c.* Presl., Hook., F.; *Aspidium,* Sw., *Syn. filic.*, p. 45. Schkh., *Crypt. Gew.*, t. 32 *b.* Raddi, *Fil. Bras.*, p. 30, t. 46. Brésil, Raddi, Sellow, Gardner, Spruce; Martius, *Herb. Bras.*, nº 317; Glaziou, Rio-Janeiro, nº 937.

2. SCHKUHRII, Lk., *Sp. filic.*, p. 109, *sub nephrodio. Aspidium pectinatum*, Willd., *Filic.*, p. 223; Glaziou, Rio-Janeiro, nº 412.

3. PENDULA, F., *l. c. Aspidium pendulum,* Radd., p. 30, t. 45. Raddi, Mandiocca; Brésil, Rio-Janeiro, n° 411, Claussen.

4. INTERMEDIA, F., *Catal. meth. foug. Mexic.*, p. 32; Glaziou, Rio-Janeiro, n° 938. Sainte-Catherine, Alburquerque. — Peut-être est-ce là une simple forme du *N. pendula.*

5. NEGLECTA, Kze., *Linn.*, XIII, p. 149. Brésil, Claussen. — Kunze renvoie à la planche 32 *b*, de Schkuhr, et à la planche 46 de Raddi, qui conviennent bien mieux au *N. exaltata,* Schott.

71. SACCOLOMA, Klfss., *Enum. filic.*, p. 224.

1. ELEGANS, Klfss., *in Berol. Jahrb. f. die Pharm.*, 1820, p. 51. *Enum. filic.*, p. 224, t. 1, f. 12; Kze., *in Schkh., Supp.*, I, p. 83, t. 41. Brésil, Langsdorff, Sellow, Beyrich, Gardner, n°s 159 et 5325; Glaziou, Rio-Janeiro, n°s 1746 et 2376. — La planche, éditée par Kunze, donne aux frondes une couleur jaune qui n'est pas celle de la plante. Nos spécimens ont des frondules plus larges et plus longues; les feuilles radicales atteignent jusqu'à 25 et même à 30 centim.; nous avons reçu, de M. Glaziou, sous le n° 2376, un spécimen unilatéral, sinistrogyre.

NB. Le petit groupe des Néphrolépidées ne diffère des Aspidiées que par la structure de l'indusium; aucune espèce ne se rattache par le facies à nos fougères européennes, mais le genre type du groupe a le port des *Lepidonevron;* le *saccoloma* est des plus distincts.

XX. DAVALLIÉES.

72. MICROLEPIA, Presl., *Tent. pterid.*, p. 124.

* *Frondes bipinnées.*

1. FLUMINENSIS, F.

Frondibus bipinnatis, in ambitu oblongis, rachi tomentoso, viscoso? frondulis approximatis, oblongis, patulis, semipinnatifidis, inferioribus deflexis; segmentis ovatis, grosse crenatis, apice obtuso, denticulato, sæpe dimidiatis, glabris; sporotheciis angustis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2378).

Filix frondulis alternis, numerosis, inferioribus deflexis.

Icon. : *Tab. LI, fig. 1.*

(Longueur, 60 centim.; pétiole, 24 centim.; frondule vers la base, 10 centim. sur un peu plus de 3 centim.)

Cette espèce bien distincte serait-elle le *Microlepia Brasiliensis* que Presl, *Epim. bot.*, p. 95, rapporte aux espèces de Gardner portant les n°s 60 et 200, plante qui aurait été récoltée aussi par Pohl ? C'est là ce que nous ne pouvons décider, aucune figure et aucune description ne pouvant nous venir en aide.

2. Lindsayæformis, F.

Frondibus bipinnatis, glabris; frondibus sessilibus, lanceolatis, semipinnatis; segmentis ovoideis, obtusissimis, inferioribus sessilibus, basi cuneatis, superioribus adnatis, marginibus paucilobatis; sporotheciis angustis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2379, Saint-Louis et Serra os Orgaos, n° 3332).

Filix rachi rubescente; striato; frondulis suboppositis, nervillis tenuibus.

Icon. : *Tab. LI, fig. 2.*

(Longueur des frondules, 20 centim. sur 4 centim. d'envergure ; entre-nœuds, 7 centim.)

Cette plante sera facile à reconnaître à ses frondules longuement acuminées, pinnées dans leurs deux tiers inférieurs, puis pinnatifides; à ses segments ovales, terminés en coin, obtus, parfois même comme tronqués; les inférieurs crénelés, avec un lobe gibbeux à la base de la marge supérieure; elle a une teinte verte-foncée après dessiccation.

** *Frondes tri- et multipinnées.*

3. inæqualis, F., *Davallia inæqualis*, Kze., *Synop. pl. Pœpp.*, p. 87. Rio-Janeiro, Glaziou, n° 386. (La plante n° 379, de Martius, constitue une espèce distincte, le *M. nigrescens*, Kze.)

4. distans, F., *Davallia distans*, Klfss., *Enum. filic.*, p. 223. Martius (*Herb. Bras.*). (N. V.) — Plante douteuse.

5. polypodioides, Presl., *Tent. pterid.*, p. 125. *Dicksonia polypodioides*, Sw., *Syn. filic.*, p. 137. Brésil, Swainson et Macrae, *teste* Hook., *Spec. filic.*, t. 1, p. 182.

73. DAVALLIA, Sm. Sw., *Syn. filic.*, p. 5.

1 ? Corcovadensis? Lodd., *Catal.*; Kze., *Linn.*, XXIII, p. 248. — Il est très-douteux que cette fougère, au reste très-peu connue, soit un véritable *Davallia.*

74. STENOLOMA, F., *Gen. filic.*, p. 330, t. XXVII ² A.

1. BIFIDA, Klfss., *Enum. filic.*, p. 222, *sub davallia;* H. et Grev., *Icon.*, n° 238. *Stenoloma bifida*, F., Brésil; Chamisso (Kaulfuss), Langsdorff, Minas-Geraes; Serra os Orgaos, Gardner, n° 155. Rio-Janeiro, Glaziou, n° 2325; île Sainte-Catherine, Macrae.

† 2. GLAZIOVI, F.

Frondibus herbaceis, decompositis, glaberrimis, in ambitu triangularibus, siccitate viridibus, erectis, rigidis; petiolo adiantino, lævi, roseo; rhizomate brevi, repente; frondulis primariis alternis, secundariis pinnatifidis; segmentis bifidis, uninervatis, monosporangiiferis; sporotheciis parvulis, terminalibus, indusio membranaceo, tenuissimo; sporis trigonis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2326).

Filix delicatissima, segmentis vix cuneatis, linearibus.

ICON. : *Tab. LII, fig. 1.*

(Longueur: 20-22 centim., dont le pétiole fait environ la moitié; frondules secondaires, 6-7 centim., avec une envergure d'environ 3 centim.; les derniers segments n'ont que 3 à 4 millim. de longueur; les sporothèces sont ponctiformes.)

Cette espèce, d'une grande élégance, rappelle le *S. Schlectendalii*, F., mais le port et la forme générale des frondes ne permettent pas de les confondre; notre plante est dressée, tandis que l'autre est flexueuse et grimpante; les derniers segments sont ici moins divariqués et un peu plus larges, quoique très-étroits; au lieu de noircir, elle conserve, après dessiccation, une belle couleur verte.

3. GRATISSIMA, F.

Frondibus glaberrimis, delicatissimis, in ambitu oblongis, tripinnatis; petiolis filiformibus, glabris, albidulis, frondulis primariis segmentis unilateralibus, reflexis, sæpe bifidis, fertilibus curvatis, apice dilatatis; indusio tenui; sporis trigonis.

Habitat prope San-Carlos, *ad* Rio-Negro *Brasiliæ borealis* (Spruce, n° 2988).

Filix facie peculiari; segmentis parvissimis, in novellis reflexis, sæpe bifidis.

ICON. : *Tab. LII, fig. 2.*

(Longueur, 20-25 centim.; frondules secondaires, 2 centim.; segments, 2 millim. sur 0,2 millim. de large. Les pétioles sont aux frondes : : 2 : 1.)

Fougère remarquable par son extrême délicatesse; elle est glabre et les frondes naissent en faisceau sur une petite souche dressée, très-fibrilleuse.

NB. Le genre *Stenoloma*, réduit aux espèces à segments bifides, plus ou moins divariqués et linéaires, a un port très-spécial, tel qu'on le trouve dans les deux espèces brésiliennes et dans le *S. Schlectendalii*, F.; mais lorsque ces segments s'élargissent et qu'ils portent deux ou trois sporothèces sur leur marge, les *Stenoloma* se rapprochent des *Lindsaya*, avec lesquels on peut les placer sans trop d'inconvénients, mais en faisant d'eux une section distincte.

XXI. DICKSONIÉES.

75. DICKSONIA, L'Herit., *Sertum anglicum*, p. 30.

1. CICUTARIA, Sw., *Syn. filic.*, p. 137; Plumier, *Filic.*, p. 39, t. 31. *Dennstædtia*, Th. Moor., *Ind.*, p. 305. Brésil, Gardner, n° 5327; Glaziou, Rio-Janeiro, n° 358, et au Corcovado, n° 1221.

   β *tenera*, Presl., *Del. Prag.*, I, p. 189. *D. adiantoides*, Lk., *Hort. Berol.*, II, p. 9, *non* Hook.; Martius, *Fil. Bras.*, p. 380; Gardner, n° 62.

   γ *cornuta*, Th. Moor., *Ind.*, p. 304. Brésil, Claussen, n° 2109 *a*, Serra os Orgaos. Gardner, n° 201.

   δ *erosa*, *Ejusd.*, *l. c.* Brésil (sans autre indication).

   ε *remota*, F. Glaziou, n° 3172, Serra do Couto. — Variété remarquable par la grandeur des segments, leur écartement des rachis et le petit nombre de sporothèces (1-2) sur chaque segment. Peut-être est-ce une espèce distincte?

2. RUBIGINOSA, Klfss., *Enum. filic.*, p. 226; Hook., *Sp. filic.*, I, p. 79, t. 27 A. Brésil, Claussen, n° 118; Martius (H. F.), Rio-Janeiro, Glaziou, n° 2381, au Corcovado.

3. DISSECTA, Sw., *Syn. filic.*, p. 136; Schkh., *Crypt. Gew.*, p. 120, t. 130 B. Brésil, Regnell, II, 322; Claussen, n° 109.

4. CICUTARIOIDES, F., *Hist. foug. et lyc. des Antill.*, p. 95, t. 25, f. 2. Brésil, Claussen, n° 140. (H. F.) — Espèce très-ample; à dernières frondules et à segments oblongs, très-obtus, crénelés; sporothèces fort petits. La fructification la rapproche des *Stenoloma.*

5. APIIFOLIA, Sw., *Syn. filic.*, p. 137; Hook., *Spec. filic.*, I, p. 77, t. 26 *c*, Brésil, Martius, *sub nomine Dicksonia flaccida*, Sw. (H. F.)

76. BALANTIUM, Presl., *Tentam. pterid.*, p. 134 (*reductum*).

1. SELLOWIANUM, Presl., *Tent. pterid.*, p. 134; Kze., *Linn.*, XXIII, p. 239; *Dicksonia Sellowiana;* Hook., *Spec. filic.*, I, p. 67, t. 22 B. *Balantium*, F. Brésil, Riedel, n° 317; Regnell, II, 321. Rio-Janeiro, n° 2824. — Fougère très-divisée; à derniers segments dentés; valves des sporothèces presque égales. (N. V.)

2. MARTIANUM, Klotz., mssc., *in Herb. Berol.* et *in Herb. Hookeri, sub dicksonia. Dicksonia Martiana*, Hook., *Spec. filic.*, I, p. 70, t. 24 B. Brésil, Glaziou à Saint-Louis, n°s 1787 et 2281; Serra do Couto, n° 3171. — Les frondes sont surdécomposées, coriaces, glabres, acuminées, à derniers segments oblongs, dentés en scie; le stipe atteint de 2 à 3 mètres sur 60 à 70 centim. de circonférence. Elle se distingue de ses congénères à trois caractères principaux : 1° à sa ressemblance avec les *Polystichum* et comme eux à segments rigides portant des pointes aristées au sommet et à la marge des segments; 2° à sa teinte un peu glauque, 3° et enfin aux longs poils dorés, intestiniformes, qui forment un épais coussinet à la base des pétioles; ceux-ci sont inermes, jaunes-paille et portent, vers la base, des frondules dégradées dans leurs dimensions. Les caractères génériques déduits de l'indusium bivalvaire sont très-marqués.

NB. Les Davalliées et les Dicksoniées se rapprochent les unes des autres par la frondaison; elles ne sont pas nombreuses et se trouvent éparses sous l'équateur et les tropiques. En général, ce sont de grandes fougères herbacées, très-découpées, pluripinnées. Dans les Dicksoniées, l'indusium a une origine propre et prend souvent la forme d'une petite coupe, d'une pyxide, d'un calice, tantôt univalve et tantôt bivalve, clos dans la jeunesse ou bien ouvert dès le premier âge; ayant quelquefois une disposition operculaire. Sous le rapport des organes fructi-

fères, ces deux petits groupes s'éloignent plus des autres Polypodiacées que les Alsophilées et les Cyathées, groupes qui tirent surtout leur dignité de la condition arborescente, mais qui, par les frondes, ne diffèrent pas des *Aspidium* et des *Phegopteris*. Par la consistance des frondes, plusieurs Davalliées et certaines Dicksoniées se rapprochent des Hyménophyllacées.

XXII. ALSOPHILÉES.

A. Eualsophilées.

77. ALSOPHILA, R. Br., *Prod. Fl. Nov. Holl.*

* *Segments pinnulaires à marge entière, à peine dentés au sommet.*

1. Miersii, Hook., *Sp. filic.*, I, p. 38. *A. acuminata*, J. Sm., *Lond. Journ. bot.*, I, 667. Serra os Orgaos, Gardner, n° 117; Claussen, n° 110 (H. F.); Tejuco, Miers; Glaziou, Tijuca (Rio-Janeiro), n° 1702. — Cette espèce n'a point été figurée; elle sera facile à reconnaître à ses frondules portées sur un pétiole arrondi, de 5 millim. de longueur; elles sont longuement acuminées; l'acumen est stérile et denté en scie. Les segments sont obtus, très-rapprochés et unis entre eux dans la moitié de leur longueur. Cette fougère est glabre, assez raide, opaque, très-prolifique; à sporothèces dorés; pétiole épineux à épines droites, très-aiguës, longues d'un centimètre; écailles lancéolées, luisantes, acuminées, à marge entière et de couleur de succin. Le rachis et ses divisions sont blanchâtres; il porte çà et là de petites épines courtes.

2. procera, Klfss., *Herb.* Desv., *Prodr.*, 319. *Polypodium procerum*, Willd., *Filic.*, p. 206. Brésil, Rio-Negro, Spruce, n° 2115. Sainte-Catherine, Gaudichaud, n° 68, et à San-Paolo, n° 27; Durville (H. Bory). Rio-Janeiro, Glaziou, n° 2300, et n° 3168, Serra do Couto (1869). — Glabre, à segments oblongs, un peu arqués, dentés au sommet, mais entiers à la marge. Sporothèces terminaux, presque ronds; le tronc s'élève environ à 4 mètres. Le rachis porte quelques courtes épines; elle n'a point été figurée.

3. arbuscula, Presl., *Tent. pterid.*, p. 61. Kze., *Bot. Zeit.*, II, 313. *Alsophila procera*, Mart., *Icon. Crypt. Bras.*, p. 64, t. 40 (fig. 1 exclus., *non* Kaulfuss). Martius, Para, Saint-Paul, Minas-Geraes; Gardner, n°s 114 et 5637; Spruce,

n° 32, à Para. — Stipe aiguillonné. M. Hooker, *Sp. filic.*, I, p. 38, réunit cette espèce à la précédente.

4. PUNGENS, Klfss., *Herb.* Presl., *Tentam. pterid.*, p. 61. *Polypodium pungens*, Willd., *Filic*, p. 206. Brésil, Hoffmannsegg. — Stipe glabre, brillant, armé d'épines aiguës, courtes; segments ovales, aigus, très-entiers; elle n'a pas encore été figurée. (N. V.)

5. HOOKERIANA, Klotz., *in Herb. Reg. Berol.;* Hook., *Sp. filic.*, I, p. 39. Brésil mérid., Sellow; Sainte-Catherine, Lay et Collie. — Peut-être n'est-ce là qu'une variété de l'*A. procera.* Cette plante est peu connue et n'a point encore été figurée. Ses pétioles sont épineux, le stipe et le rachis écailleux, les segments courts et entiers, les sporothèces bisériaux.

† 6. SCROBICULATA, F.

Frondibus amplissimis, pilosulis; petiolo lævissimo, helveolo, spinis concoloribus, robustis armato; squamis linearibus, basi dilatatis, longis, fulvis lucidulisque; frondulis primariis lanceolatis, subpetiolatis, rachi striato; frondulis secundariis lanceolatis, curvatis, abrupte acutis, subtus glaucescentibus, supra viridibus, segmentis oblongis, leviter curvatis, marginibus integris; sporotheciis per tota segmenta 8-10, scrobiculos parvos super laminam inferiorem determinantibus.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n°s 378, 2293, 2294 et 2295).

Filix magna, petiolo lævissimo, spinoso; segmentis arcuatis, integris.

ICON.: *Tab. LIII, fig. 1.*

(Longueur : frondules primaires, 64-70 centim.; les secondaires, 10 centim. sur 8 millim. de largeur.)

Elle est caractérisée par des rachis primaires glabriuscules, par des rachis secondaires poilus, par des pétioles très-lisses, ayant des épines les unes rapprochées, les autres écartées, et surtout par les petites fossettes que déterminent les sporanges sur la lame supérieure. Le rachis des frondules secondaires et le mésonèvre des segments sont chargés de petites écailles blanchâtres. La particularité organique, indiquée comme caractère spécifique, n'est que faiblement marquée.

7. PŒPPIGII, Hook., *Spec. fil.*, I, 43. *A. villosa*, Kze., *Syn. pl. Crypt. Pœpp.*, p. 99. Brésil, *Herb. Klfss.* (*fide Kunzei*). Mariana, Vauthier, n° 655. — Les rachis

primaires sont glabriuscules, tandis que le reste de la plante est villeux et même tomenteux sur la lame inférieure ; les pinnules secondaires sont sessiles et se terminent assez brusquement par une pointe entière ; les longs poils qui entourent les sporothèces les dérobent à la vue et leur donnent une fausse apparence de *Cyathea*.

8. VILLOSA, Desv., *Prodr.*, 319; Presl., *Tent. pterid.*, p. 62. *Cyathea villosa*, Humb. et Bonpl., *in* Willd., *Filic.*, p. 495. Brésil, Gardner, n°s 5332 et 5334? Martius, à Saint-Paul.

Elle est inerme, villeuse, surtout du côté inférieur. Les sporothèces n'occupent que les deux tiers inférieurs du segment; ils ne sont entourés de poils qu'à la base. Cette espèce a d'évidents rapports avec la précédente.

9. RIGIDULA, Mart., *Icon. Crypt. Bras.*, p. 74, t. 51. Province de Saint-Paul, Mart., *l. c.* — Fronde bipinnée, ferme, pubescente, floconneuse inférieurement; la base du stipe est munie de longues écailles rousses (*in icone*), blanches (*in textu*); les sporothèces sont très-gros, avec 30 ou 40 sporanges portées sur un mince réceptacle. Nous croyons avec M. Hooker, *Sp. fil.*, I, p. 45, qu'elle est distincte de l'*A. villosa*, à laquelle espèce la réunit M. Th. Moore (*in indice*).

† 10. APERTA, F.

Frondibus glabris, rachibus flexibilibus, lucidis, fuscis; petiolis robustis, helveolis, basi striatis; spinis concoloribus, longis, rectis; squamis albidulis, lanceolatis, longe acuminatis, tenuibus, basi fuscescentibus; frondulis primariis oblongo-lanceolatis, satis longe petiolatis, fere omnino pinnatis; rachi fusco, supra 2-3 canaliculato; frondulis secundariis lanceolatis, patulis, petiolatis, basi rotundatis, apice longe caudatis, cauda crenato-dentata; segmentis creniformibus; mesonevro atro-purpurascente; sporotheciis 4-6 per tota segmenta; annulo completo, lato.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2301).

Filix glabra; frondulis secundariis ad apicem frondium integerrimis, omnibus apertis.

ICON. : *Tab. LIV, fig. 2.*

(Longueur : frondules primaires, 36-40 centim., avec un pétiole d'un peu moins de 2 centim.; les secondaires, 8 centim. sur 12 millim. de largeur.)

Cette espèce est bien caractérisée par ses frondes, dont toutes les partitions, assez étroites, sont très-ouvertes et pétiolées. La partie supérieure de la fronde porte des frondules primaires écartées, dont les frondules secondaires, simplement dentées, sont entières vers le sommet; les rachis sont assez grêles. Le pétiole est robuste, strié longitudinalement dans sa partie inférieure, jaunâtre et armé d'épines linéaires, qui atteignent 7-8 millim. de longueur; les écailles sont jaunâtres et gramineuses.

11. FLEXUOSA, F.

Frondibus pluripinnatis, glaberrimis; rachi robusto, rufescente, flexuosissimo, sulcum latum, inferne et superne ferente; frondulis tertiariis lineari-lanceolatis, rigidis, crassis, acuminatis, crenatis, crenis integris; sporotheciis diffusis; sporangiis magnis, annulo lato, vix obliquo, 24-32 articulato.

Habitat in Brasilia meridionali circa Saint-Paul, *amicissimus* Guilleminus *colligebat anno 1839.*

Filix robusta, crassa, rachi undulato notata.

(Longueur des frondes secondaires, 24-28 centim.; des frondules tertiaires, 3 centim. sur 5-6 millim. de largeur; les entre-nœuds 6 centim. pour les frondules secondaires et 9-11 millim. pour les frondules tertiaires.)

Plante vigoureuse, épaisse, coriace, brunissant par la dessiccation; elle est très-frondescente et ses rachis primaires sont extrêmement flexueux. Les frondules secondaires ont un pétiole épaissi à la base et noirâtre; les frondules tertiaires sont étroites, acuminées, sessiles, élégamment crénelées, à crénulations réfléchies en dedans; nervilles simples, sporanges éparses.

12. GARDNERI, Hook., *Sp. filic.*, I, p. 40. Brésil, San-Gaetano, Gardner, n° 5330. M. Hooker indique une variété β, qui serait le *Cyathea nigrescens,* Klotzsch (H. Berol.), non encore figurée. — Frondules secondaires, courtement pétiolées, terminées en une longue pointe ondulée; segments entiers, oblongs, très-obtus; rachis rudes au toucher.

13. INFESTA, Kze., *Linn.*, IX, p. 98; Presl., *Tent. pterid.*, p. 61, t. 1, f. 19 (*fragm.*). *A. præcincta,* Kze., *Comm. Fl. Bras.*, *Flora*, 1839; Mart., *Herb. Bras.*, n° 391. Para, Spruce, n° 22. — Stipe aiguillonné. Espèce facile à reconnaître à ses sporothèces très-gros, rougeâtres, semi-globuleux, exactement marginaux, rapprochés, mais toujours distincts, à sporanges très-nombreuses et très-serrées.

14. RADENS, Klfss., *Enum.*, p. 248; Hook., *Sp. filic.*, I, p. 46; Presl., *Die Gefæssb.*, p. 32, t. 6, fig. 5 et 6 (coupe du stipe). Sainte-Catherine. — Pétiole aiguillonné; frondes à pinnules linéaires, lancéolées pinnatifides; segments oblongs, obtus, entiers; sporothèces petits et globuleux. N'a point été figurée.

15. SETOSA, Klfss., *Enum.*, p. 249; Hook., *Sp. filic.*, I, p. 46. Brésil, Chamisso. — Elle est inerme; pinnules linéaires, courbées légèrement en faux; segments entiers, denticulés au sommet; les mésonèvres sont pileux. Kaulfuss (*l. c.*) parle d'un indusium très-mince et déchiqueté, qui recouvrirait les sporothèces; ce serait donc une Cyathée. (N. V.)

16. PLAGIOPTERIS, Mart., *Icon. Crypt. Bras.*, p. 73, t. 50; Hook., *Sp. filic.*, I, 44. Saint-Paul, A. Saint-Hilaire, *Catal.* C², n° 1394; Martius, Brésil mérid., Sellow et Claussen; Rio-Janeiro, Glaziou, n° 988. — Le stipe est aiguillonné. Les sporothèces deviennent confluents et recouvrent complétement les segments pinnulaires. Les écailles abondantes, imbriquées, luisantes et de couleur fauve, sont lancéolées linéaires et atteignent une longueur de 3 centim. Leur pointe est étroite et très-longue.

17. PYCNOCARPA, Kze., *Linn.*, IX, p. 97. *Ejusd.*, *Suites à Schkh.*, I, p. 208, t. 86; Hook., *l. c.*, I, p. 46. Sainte-Catherine. — Elle est aiguillonnée, très-peu élevée sur tige, à fronde coriace, à la manière des Gleichéniacées, bipinnée, à pétioles articulés. Cette espèce a été fondée par Kunze sur une fougère péruvienne, et c'est sur l'indication donnée par M. Th. Moore que nous lui donnons une place parmi les *Alsophila* du Brésil.

18. PHALERATA, Mart., *Icon. pl. Crypt. Bras.*, p. 67, t. 42; Presl, *Tent. pter.*, p. 62. *Cyathea*, Spreng., *Syst.*, II, p. 320. Bahia, par Martius, n° 392. — Le nom spécifique s'applique aux capsules, dont l'anneau forme comme une sorte de capuchon sur le sacculus. Le stipe est épineux.

β *squamulosa*, Hook., *Spec. fil.*, I, p. 42. Ilheos, par Moricand.

† 19. GLAZIOVI, F.

Frondibus amplis; petiolo longo, lævi, nudo, intus medulloso, extus fissuris longis, perpendicularibus, angustissimis percurso, basi squamuloso; squamis ovoideis, acuminatis, marginibus piloso-tomentosis; frondulis primariis oblongo-lanceolatis, curvatis, longe petiolatis; petiolo basi nigrescente; fron-

dulis secundariis lanceolatis, approximatis, alternis, cauda longa, sterili, argute dentata, inferne rotundis; segmentis oblongis, obtusissimis, oligocarpicis; sporotheciis globulosis, congestis; receptaculo punctiformi, piloso; sporangiis magnis; annulo obliquo; sporis ovoideis, episporiatis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2155, et n° 3167, Serra do Couto) [1869].

Filix jucunda, lævis, squamas parvas, concavas ferens.

Icon. : *Tab. LV, fig. 2.*

(Frondules primaires, 32-35 centim. de longueur; pétiole, 2-3 centim.; frondules secondaires, 7-8 centim. sur 9-11 millim. de largeur. Le stipe dépasse rarement 2 mètres 50 centim. sur 18-20 centim. de circonférence.)

Cette espèce a un aspect agréable; toutes ses parties sont assez rapprochées. Le rachis des partitions supérieures est flexueux. Les segments ne sont fructifères que dans leur moitié inférieure et ne portent, de chaque côté de la lame, que deux et très-rarement trois sporothèces; leur point d'évolution est indiqué sur la lame supérieure par une petite fossette, ce qui est fréquent dans toutes les espèces de ce beau genre. Il est digne de remarque de trouver dans cette fougère une particularité qui n'existe, à notre connaissance, dans aucune autre : les écailles de la base du stipe sont bordées de petits poils serrés qui les encadrent et leur donnent un aspect tomenteux.

† 20. LEPTOCLADIA, F.

Frondibus tripinnatis, rachi primario et partitionibus secundariis aculeis acutissimis armatis, brevissime villosis, petiolis spinosis, spinis validis, rectis, longis, acutis; frondulis primariis brevissime petiolatis, acuminatis; frondulis secundariis sessilibus, pinnatifidis, longe acuminato-caudatis, supra glabris, lineari-lanceolatis, rachibus stricte alatis, sporotheciis laxis; sporangiis diffusis, lutescentibus, sporis trigonis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2299).

Filix formosa, armata, feracissima, segmentis integris.

Icon.: *Tab. LV, fig. 1.*

(Longueur : frondules primaires, 25-30 centim.; frondules secondaires, 5 centim. sur 7-8 millim. de large; épines du pétiole, 8-9 millim. Entre-nœuds des frondules primaires, 10 centim.; des frondules secondaires, 9-11 millim.)

Espèce élégante, épineuse, à rachis couverts de poils courts, serrés, presque tomenteux; frondules secondaires terminées par une longue pointe entière. La lame supérieure brunâtre est glabre et impressionnée par les sporothèces à leur point d'attache; la lame inférieure est couverte de poils blanchâtres, mêlés aux sporanges, qui sont diffuses et jaunâtres.

† 21. ERIOCARPA, F.

Frondulis oblongis, apice longe caudatis, breve petiolatis, pilosis; rachi primario compresso, tomentoso, spinis brevissimis armato; rachi secundario depresso, supra canaliculato; frondulis secundariis vix petiolatis, alternis, lanceolatis, cauda sterili terminatis; segmentis oblongis, integerrimis, obtusissimis, leviter curvatis, pilosis; pilis longis, intestiniformibus; sporotheciis aureis aut roseis approximatis, subconfluentibus, laminam superiorem deprimantibus; sporis trigonis, papillosis.

Habitat in Brasilia ad montem Corcovado (Glaziou, n°s 987 et 1706).

Filix tota villosa; petiolo spinoso; spinis validis, curvulis.

ICON.: *Tab. LVI, fig. 1.*

(Frondules primaires, 45-48 centim. de longueur sur 16-17 d'envergure; nous comptons 22-25 paires de frondules secondaires, ayant 9-11 millim. de largeur, avec des entre-nœuds de 2 centim.)

Cette fougère est caractérisée par des frondules terminées en une longue pointe stérile et crénelée; elle a des rachis tomenteux et sur toutes ses parties des poils blancs, assez longs, abondants, surtout à la surface inférieure; les sporothèces, d'une couleur plus ou moins rougeâtre, se touchent tous et n'occupent que les deux tiers supérieurs du segment fructifère; ils déterminent, sur la lame inférieure, une légère dépression qui correspond à leur point d'attache, et sont entourés ou même parfois plongés dans une touffe de poils. La base du pétiole primaire est armée de petites pointes et couverte de belles écailles dorées, lancéolées, très-longuement acuminées, luisantes, jaune d'or, à marge légèrement denticulée; il en est qui mesurent jusqu'à 4 centim. sur un peu moins de 2 millim. de largeur. Le rachis des pinnules de 2e ordre, ainsi que le mésonèvre des segments, sont garnis de petites écailles blanchâtres, étroites, rapprochées, ovoïdes, terminées en pointe et bombées. C'est par là seulement qu'elle se rapproche de l'*A. leucolepis*, Mart.

† 22. CORCOVADENSIS, F.

Frondibus amplis, petiolo spinoso; rachibus primariis viridibus, lævibus, crassis, inermibus, superne profunde canaliculatis; frondulis primariis late lanceolatis, petiolatis, caudatis, glabris, rachi plano, sulcato; frondulis secundariis lanceolatis, basi subcordatis, apice late caudatis, lamina inferiori squamas ovatas, albidulas, ad nervillas simplices adhærentes ferente, segmentis ovatis, obtusissimis; sporotheciis paucis, remotis, ad basim segmentorum sitis; sporangiis crassis; sporis trigonis, opacis, nigrescentibus.

Habitat in Brasilia fluminensi ad montem Corcovado (Glaziou, nos 985 et 1710).

Filix petiolis spinosis, squamosis; squamis formosis, lucidis, lanceolatis, acuminatis; margine erosis.

ICON.: *Tab. LVI, fig. 2.*

(Longueur des plus grandes frondules primaires, 42-46 centim.; le pétiole général, très-écailleux, atteint la grosseur du pouce; les frondules secondaires n'ont que 8 centim. de longueur sur 17-18 millim. de largeur; nous en comptons 18 à 20 paires.)

Cette espèce, quoique distincte, manque de caractère tranché, si ce n'est d'avoir des segments qui ne portent, de chaque côté du mésonèvre, qu'un seul sporothèce; elle est souple, assez transparente pour laisser voir les nervilles, qui sont simples et parfois bifurquées; les frondules sont terminées par une longue pointe dentelée· le pétiole, armé de courtes épines, porte de nombreuses écailles lancéolées, atténuées au sommet, roussâtres, luisantes et étroitement imbriquées.

† 23. CEROPTERIS, F.

Frondibus bipinnatis tripinnatisve, amplis, patulis; stipite (petiolo) universali, spinis brevibus, acutis armato; rachi primario crassissimo, flexuoso, depresso, supra sulcato, subtus canaliculato; frondulis primariis lanceolatis, acuminatis; petiolo brevi, basi dilatato, linea fusca circumdato; frondulis secundariis alternis, anguste lanceolatis, longe acuminatis, crenatis, subsessilibus, basi cordatis; lamina superiori glaberrima, siccitate fuscescente; lamina aversa, secretione albida tecta; granulis, ope vitreo, hexaëdricis; frondulis superioribus marginibus integris; sporotheciis rotundis; receptaculo globoso, crassiusculo; sporangiis crassis; annulo lato, vix obliquo, 12 articulato; sporis trigonis, lævibus.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, nº 981, et Serra do Couto, nº 3169) [1869].

Filix arborescens; stipite squamoso; squamis longis, bicoloribus, lanceolatis, acuminatis, adpressis; margine integris.

Icon. : *Tab. LVII, fig. 1.*

(Frondules primaires, 32-35 centim. de longueur; secondaires mesurées à la base, 5-6 centim. sur 9-11 millim. de largeur.)

Nous avons imposé à cette curieuse fougère le nom spécifique de *Ceropteris*, pour indiquer qu'elle sécrète sur la lame inférieure une matière céreuse, pareille à celle observée sur les *Ceropteris;* cette sécrétion, très-peu adhérente, est composée de molécules assez régulièrement hexaédriques. Les nervilles portent de très-petites écailles caduques, ovoïdes et blanchâtres. Les faisceaux vasculaires qui parcourent le stipe sont très-gros et comme anastomosés. La lame supérieure présente une petite fossette au point qui correspond aux sporothèces. Les écailles des pétioles sont très-grandes, acuminées, d'un blanc jaunâtre en leur pourtour et d'un brun rougeâtre au centre. Nous ne connaissons pas les dimensions du stipe.

† 24. DICHROMATOLEPIS, F.

Frondulis petiolo longo, spinoso, glabro; squamis bicoloribus, marginibus latis, albidulis, striis transversalibus, approximatis notatis, ad centrum purpurascentibus; frondulis primariis oblongis, breve petiolatis; rachi primario virescente, lævi, superne striato; frondulis secundariis remotiusculis, lanceolatis, breve petiolatis, basi subcordatis, apice integerrimis; segmentis brevibus, rotundatis; nervillis simplicibus; squamis albis, ovatis, parvulis, remotis; sporotheciis distantibus, paucis, partem superiorem segmentorum occupantibus; sporis crassis, trigonis.

Habitat in Brasilia fluminensi, Serra os Orgaos (Glaziou, nº 1786).

Filix squamis bicoloribus notata.

Icon. : *Tab. LVII, fig. 2.*

(Frondules primaires, 40 centim. de longueur; frondules secondaires, 7 centim. sur 12-13 millim. de largeur; entre-nœuds, 2 centim. 18-20 paires de frondules.)

Deux caractères rendront facile la diagnose de cette espèce; d'abord et spécialement la couleur des écailles, blanches en leur pourtour, et d'une belle couleur brune au centre, portant de plus sur la marge de petits plis transverses; puis les frondules secondaires, qui se terminent vers le tiers supérieur par une large pointe

anguleuse, très-longue, entière et stérile. Disons encore que les sporothèces, en petit nombre, n'occupent que la partie supérieure du segment fructifère.

† 25. IMPRESSA, F.

Frondibus inermibus; rachi primario lævi, rubescente, supra bicanaliculato; frondulis primariis petiolatis, late lanceolatis, curvatis; rachiolo planiusculo, superne anguste bicanaliculato, pilosulo, inferne glabro; frondulis secundariis sessilibus, alternis, lanceolatis, acuminatis, acumine denticulato, segmentis oblongis, obtusissimis, arcuatis, apice dentatis; sporotheciis confluentibus, læte rubellis, in segmentis imis tantum evolventibus, per tota segmenta 8-10; sporangiis crassis; annulo latissimo, laminam superiorem deprimantibus; sporis trigonis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 983).

Filix venusta, rachibus rubescentibus, lævibus; segmentis manifeste curvatis; segmentis basilaribus ultimis supra rachim sedentibus.

ICON. : *Tab. LVIII, fig. 1.*

(Longueur des frondules primaires, 42-44 centim.; les frondules secondaires atteignent 8 centim. sur 5 millim. de largeur, et les entre-nœuds 2 centim.)

Cette plante est souple, à nervilles simples; les frondules sont terminées en pointe et les segments notablement arqués; la lame supérieure, qui conserve la couleur verte après dessiccation, est fortement impressionnée au point où s'opère le développement du sporothèce, et il en résulte une petite fossette très-marquée; c'est là ce qui la caractérise, ainsi que la courbure des segments pinnulaires, dont les deux derniers s'appuient sur le rachis. Elle a du rapport avec l'*A. plagiopteris*, qui est aiguillonné et dont toutes les parties sont d'un vert livide, tandis que dans notre plante, qui est inerme, elles sont toutes rubescentes.

† 26. UNGUIS CATI, F.

Frondibus oblongis, petiolis squamosis spinosisque; squamis succineo colore, longis, lanceolatis, acuminatis; spinis validis, curvatis, acutis, approximatis; rachibus crassis, spinis curvatis, parvis armatis; frondibus primariis oblongo-elongatis, sessilibus, apice pinnatifido, longiusculo, rachibus trisulcatis, depressis; frondulis secundariis sessilibus, apice acutis; segmentis villosis; oblongis, arcuatis, sinu latiusculo separatis, marginibus integris; mesonevris squamulosis; sporotheciis basilaribus, confluentibus; per tota segmenta 4-6; annulo lato completo.

Habitat in San-Ludovico *Brasiliensium* (Glaziou, n° 2297).

Filix sporotheciis basilaribus paucis; petiolis, spinis curvatis, unguibus catorum similibus, armato.

Icon.: *Tab. LVIII, fig. 2.*

(Longueur: frondules primaires, 55-60 centim.; frondules secondaires, 9-10 sur 2 centim. de largeur; entre-nœuds, 2 centim.)

Les segments, séparés par un assez large sinus, donnent aux frondules un aspect ouvert et comme dilaté; les sporothèces sont basilaires et en petit nombre. Les épines des pétioles sont recourbées, robustes et accrochantes. On les retrouve, mais beaucoup plus petites, sur les rachis primaires.

27. compta, Mart., *Icon. crypt. Bras.*, p. 66, t. 41. *A. atrovirens*, Presl., *Tent. pter.*, p. 61. *Polypodium atrovirens*, Langsd. et Fisch., *Fil.*, p. 12, t. 14; Willd., *Filic.*, p. 88. Prov. Saint-Paul, par Martius; Rio-Negro, Spruce, n° 614. Sainte-Catherine, Langsdorff.

28. nigra, Mart., *Icon. crypt. Bras.*, p. 71, t. 47, Hook., *Sp. filic.*, I, p. 45. Brésil, Rio-Negro, Martius. — Pétiole et rachis aiguillonnés, que la figure citée reproduit en rouge-brun; elle est velue sur les rachis et les nervures; les frondules de 3e ordre sont pinnatifides, lancéolées, acuminées; les segments ont une marge ondulée-crénelée.

** *Segments pinnulaires, dentés ou crénelés.*

29. armata, Presl., *Tent. pterid.*, p. 62, *non* Martius. *A. Swartziana*, Mart., *Icon. crypt. Bras.*, p. 73, t. 49. *Polypodium armatum*, Sw., *Syn. filic.*, p. 41. Brésil, Sellow. — Martius ne l'a pas trouvée au Brésil. Il existe une variété β *Menziesii*, que M. Hooker, *l. c.*, I, p. 40, a figurée d'après un spécimen provenant de la Jamaïque. Gardner, n° 118.

† 30. rufa, F.

Frondibus amplis, petiolo armato; spinis validis, rectis, conicis, approximatisque; frondulis primariis lanceolatis, sessilibus, rachibus rufis, pluricanaliculatis, depressis, villosis; frondulis secundariis sessilibus, lanceolatis, approximatis, longe acuminatis, acumine apice tenuissimo serrato, subtus leviter glaucescentibus; segmentis adnatis, curvatis, oblongis, basi latiori, apice acuto, marginibus dentato-incisis, supra glabris, subtus pilosis, præcipue ad mesonevra; sporotheciis per tota segmenta 18-24, parvulis, maturitate confusis, rufis, ad laminam superiorem leviter impressis; annulo lato.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, nos 2291 et 2292).

Filix frondibus amplissimis, petiolis spinosis, rachibus tactu asperis; segmentis crenato-dentatis.

ICON. : *Tab. LIX, fig. 1.*

(Longueur des frondules primaires, 80 centim. et plus; frondules secondaires, 12-15 centim. Les sinus qui séparent les segments ont environ 3 millim. d'ouverture.)

Très-grande et très-belle espèce à lame supérieure glabre, à lame inférieure très-velue, principalement sur le mésonèvre; écailles pétiolaires, roussâtres, luisantes, lancéolées, longuement acuminées, marge entière, dépassant 3 centim. Toute la plante a la même couleur que les écailles. Elle varie par des segments plus ou moins larges et se rapproche, par le port, de l'*A. Mexicana*, avec des écailles absolument différentes, de forme et de couleur, des frondules secondaires non acuminées et des segments beaucoup plus profonds; elle a aussi quelques rapports avec l'*A. hirsutissima*, F., *Hist. foug. des Antill.*, p. 95, de Saint-Domingue.

† 31. CONTRACTA, F.

Frondibus amplissimis, pilosis, petiolo glaberrimo, brevi, spinis armato, squamis longissimis, lanceolatis, fulvis, lucidis, acumine longissimo terminatis, marginibus integris; frondulis primariis, oblongis, acutis, rachi primario crasso, tomentoso, superne late canaliculato; basi nigricante; frondulis secundariis lanceolatis, pinnatifidis, sessilibus, acuminatis, alternis, approximatis, patulis; segmentis obovatis, marginibus contractis, apice acuminatis, mesonevro squamis parvulis, imbricatis vestito; sporotheciis basilaribus, rufis; per tota segmenta 6-8; annulo sporangiarum completo.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, nos 2288 et 2296).

Filix ampla, segmentis pilosis, crenato-dentatis, basi angustioribus notata.

ICON.: *Tab. LIX, fig. 2.*

(Longueur: frondules primaires, 60-68 centim. sur 20-24 centim. d'envergure. Les écailles mesurent jusqu'à 6 centim.; le rachis primaire atteint la grosseur du doigt.)

Le pétiole, dans une grande partie de son étendue, est chargé d'écailles très-longuement acuminées, dorées, luisantes et d'une grande beauté; elles s'accompagnent de très-courtes épines coniques. Nous comptons jusqu'à 36 et 40 paires de frondules secondaires sur chaque frondule primaire, séparées par un entre-nœud de 2 centim. Les segments ne sont fructifères que dans leur tiers ou leur moitié inférieure, qui est sensiblement contractée; les segments stériles n'offrent pas ce caractère.

32. ACULEATA, J. Sm., *Lond. Journ. bot.*, I, 667. *A. armata*, Mart., *Icon. crypt. Bras.*, p. 72, t. 48. *Polypodium aculeatum*, Radd., *Fil. Bras.*, p. 27, t. 42 (*syn. exclus.*). *A. ferox*, Presl., *Tent. pter.*, p. 62. Brésil, Gardner, n° 27; la Jacobine, Blanchet; Glaziou, Rio-Janeiro, n°s 380 et 982. — Écailles luisantes, étroitement imbriquées, longues d'environ 2 centim., brunâtres, à marge légèrement déchiquetée, terminées en une longue pointe linéaire, rubanée. Stipe mince, ayant 18-20 centim. de circonférence. Croît en plein soleil, au niveau de la mer; monte rarement au delà de 400 mètres et n'a guère que de 1 à 3 mètres de hauteur.

33. LEUCOLEPIS, Mart., *Icon. Bras. crypt.*, p. 70, t. 46. Hook., *Sp. fil.*, I, p. 41. Brésil, Martius, Minas-Geraes; Gardner, n°s 5329 et 5331. — Très-distincte; le stipe est aiguillonné. Les écailles blanches qui se trouvent sur le mésonèvre des frondules secondaires et sur le mésonèvre des segments, sont plus ou moins écartées, ovoïdes et un peu bombées.

34. PALEOLATA, Mart., *Icon. crypt. Bras.*, p. 68, t. 43. *A. munita*, Presl., *Tent. pterid.*, p. 62. *Cyathea Sellowiana*, Hook., *Sp. filic.*, I, p. 23. Martius, Saint-Paul, Sebastianopolis, Bahia.

35. HIRTA, Klfss., *Enum.*, p. 249; Martius, *Icon. crypt. Bras.*, p. 69, t. 44. Gaudich., *Voy. Freyc.*, p. 366. Brésil, Martius, Prov. de Saint-Sébastien; Rio-Janeiro, Raddi; Glaziou, n°s 381, 984, 1004, 1708 et 1709. — Les écailles, qui sont luisantes, jaunâtres, étroitement lancéolées, portent à la base une petite tache rougeâtre. Le rachis et ses principales divisions sont aiguillonnés; la consistance du stipe est fort dure, sa densité considérable et sa couleur d'un rouge ochracé intense. Stipe s'élevant de 4 à 6 mètres sur 18-20 centim. de circonférence.

36. AXILLARIS, Radd., *Filic. Bras.*, p. 27, t. 41, *sub polypodio; Alsophila axillaris*, Th. Moor., *Ind.*, p. 48 (*synonym. plurib. exclusis*). *Phegopteris axillaris*, F., *Gen. filic.*, p. 243. Brésil, Raddi, Rio-Janeiro. Glaziou, même localité, n° 1711, et n° 2298 à Cova do Onça. Stipe épineux; écailles lancéolées, minces, longuement acuminées, de couleur rougeâtre, avec une tache brune au point d'attache; épines assez longues, droites, aiguës, sur un stipe rougeâtre.

† 37. PECTINATA, F.

Frondibus bipinnatis, tripinnatisve? rachi primario depresso, virescente, supra sulcato, piloso; frondulis primariis petiolatis; apice acuto; petiolo inferne

tomentoso, racheolo superne piloso; frondulis secundariis lanceolatis, profunde pinnatifidis, caudatis, sessilibus, cauda eleganter crenata; segmentis anguste oblongis, satis distantibus, crenatis; segmento basilari minori; nervillis simplicibus; sporotheciis distinctis; sporangiis laxe unitis; annulo lato; sporis trigonis, lævibus, vitreis, numerosissimis.

Habitat in Brasilia fluminensi, circa Tijuca (Glaziou, n° 1704).

Icon. : *Tab. LX, fig. 1.*

Filix arborescens; petiolis lævibus, spinosis; spinis sparsis, leviter curvatis.

(Frondules primaires, 50-56 centim., avec un rachis gros comme le petit doigt; le pétiole et les entre-nœuds mesurent 3 centim. Les frondules secondaires atteignent 12-14 centim. de longueur et les segments 2 centim. sur 3-4 millim. de largeur.)

Le pétiole général est lisse et épineux; il porte de magnifiques écailles argentées, satinées, pellucides, de 2 centim. de longueur, à marge entière, montrant à la base un petit point noir, arrondi, par lequel elles adhèrent à leur support. Cette espèce est caractérisée par des segments écartés, crénelés, dont les inférieurs atteignent presque la côte, enfin par la longue pointe, élégamment crénelée, qui termine les frondules secondaires, pointe qui ne se montre pas à l'extrémité des frondules primaires. Les deux lames sont discolores par dessiccation; la supérieure est brune et l'inférieure d'un beau vert; les écailles ont aussi un caractère tout spécial.

† 38. Ludoviciana, F.

Frondibus amplis; petiolo spinis brevibus, rectis, acutis armato, ad basim squamas magnas, lucidas ferente; intus fasciculis vasorum, angustis, parallelis, perpendicularibus peregrato; frondulis primariis oblongo-elongatis, abrupte terminatis, petiolatis; petiolo rachique striato depressis, villosis; frondulis secundariis lanceolatis, vix petiolatis, alternis, approximatis; mesonevro laminæ inferioris squamoso; squamis parvis, ovoideis, subimbricatis, segmentis oblongis, curvatis, repandis, villosulis; sporotheciis pallidis, costa approximatis, 3-5 per seriem, partem medianam et inferiorem segmentorum occupantibus; sporangiis crassis; sporis trigonis.

Habitat in Brasilia fluminensi [Saint-Louis] (Glaziou, n° 1785).

Icon. : *Tab. LX, fig. 2.*

Filix magna, flexibilis, squamoso-villosa.

(Frondules primaires, 50 centim. de longueur; frondules secondaires, 9-10 centim., séparées par un entre-nœud de 15 millim. Il en existe au moins 24 paires, parfois légèrement imbriquées par les bords.)

Cette plante se rapproche de l'*A. plagiopteris*. Les sporothèces, au nombre de 4, et plus rarement de 5 par rangée, sont très-rapprochés, mais non confluents; les écailles qui entourent la base du pétiole général, lequel, dans notre spécimen, est rougeâtre, sont très-raides, lancéolées, acuminées, à marge denticulée, brunâtres, imbriquées et très-luisantes; elles peuvent atteindre jusqu'à 3 centim. de longueur. Les sporothèces sont blanchâtres; ils impressionnent la lame inférieure à leur point de développement. Les pétioles portent une assez grande quantité d'épines éparses, droites et courtes.

† 39. GLUMACEA, F.

Frondibus glabris, rachibus sulcatis, robustis; frondulis primariis petiolatis, oblongis, apice pinnatifido elongato, rachi sulcato, sulco lato, tomentoso; frondulis secundariis sessilibus, lanceolatis, in acumine longo terminatis; segmentis oblongis, basi leviter dilatatis, marginibus basi ad apicem crenatis, sinu latiusculo separatis, inferioribus paululum minoribus; sporotheciis per tota segmenta 12-16, satis parvis, centralibus; annulo completo.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2290).

Filix ampla, petiolis exasperatis, squamosis; squamis helveolis, lanceolatis, acuminatis, scariosis, albis, ad basim punctum fuscum ferentibus.

ICON.: *Tab. LXI, fig. 2.*

(Longueur: frondules primaires, 70 centim.; secondaires, 12-14 sur 2,5 de largeur. Nous comptons au delà de 30 paires de frondules, séparées par un entre-nœud de 2 centim. Le pétiole atteint la grosseur du doigt.)

Cette espèce est caractérisée par des segments légèrement arqués, crénelés dans toute leur étendue, élargis brusquement à la base; ils forment des sinus dont la base est anguleuse. Les écailles sont ovales, médiocrement acuminées, scarieuses et ressemblant aux glumes de quelques espèces de graminées, celles qui en portent de très-grandes, l'avoine, par exemple.

† 40. NIGRESCENS, F.

Glaberrima, rachibus primariis, aculeis brevibus armato, secundariis inermibus, omnibus nigrescentibus, lævibus; frondulis primariis lanceolatis, petiolatis, acuminatis, rachi depresso, pilosulo; frondulis secundariis petiolatis,

alternis, lanceolatis, acutis, segmentis obovatis, marginibus et apicibus crenatis, mesonevro squamulas ovatas ferente; sporangiis parvis, per tota segmenta 10-12.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2289).

Filix nigrescens, petiolis aculeatis, squamis helveolis, lanceolatis, longe acuminatis, integris lucidisque.

Icon. : *Tab. LIV, fig. 1.*

(Longueur des frondules primaires, 40-46 centim.; frondules secondaires, en moyenne, 8-10 sur un peu moins de 10 centim. de largeur; écailles, 2 centim.; entre-nœuds, 2 centim.)

Elle se rapproche, par la couleur, de l'*A. nigra*, de Martius; elle en diffère par des poils étalés, des rachis secondaires et des nervilles velues (*hirsutæ*). Les frondules secondaires ne sont pas non plus pinnatifides; l'auteur annonce aussi, comme se trouvant sur les rachis partiels, des écailles que nous ne voyons pas ici; enfin, les pinnules secondaires, très-manifestement pétiolées dans notre espèce, sont sessiles dans la plante à laquelle nous la comparons.

41. Mexicana, Martius, *Icon. crypt. Bras.*, p. 70, t. 45; Hook., *Sp. filic.*, I, 47. Rio-Janeiro, d'Orbigny, n° 14. (H. F.) — Frondes tripinnatifides, çà et là villeuses; pétiole et rachis hérissés et couverts de grandes écailles et de paléoles fugaces. Les frondules sont linéaires-oblongues, sessiles, aiguës, terminées en pointe, avec des segments qui atteignent la marge et qui sont très-fortement crénelés et obtus; les sporothèces ont une couleur rougeâtre. Le spécimen recueilli par d'Orbigny, à Rio-Janeiro, ne diffère pas de l'espèce mexicaine.

42. Blanchetiana, Presl., *Epim. bot.*, p. 28. Blanchet, *Herb. Bras.*, n° 77. — Fronde coriace, bipinnée, à frondules courtement pétiolées; à segments ovales-oblongs, obtus, denticulés, courbés en faux; rachis inermes; le stipe n'est pas connu.

† 43. Tijucensis, F.

Frondibus glaberrimis; rachibus primariis pallide fulvis, lævissimis, profunde trisulcatis, spinas acutas, breves, sparsas ferentibus; frondulis primariis elongato-oblongis, breve petiolatis, pinnatis, rachibus gracilioribus, canaliculatis, rubescentibus; frondulis secundariis lanceolatis, pinnatifidis, sessilibus, apice caudatis, cauda tenui, leviter crenata; segmentis oblongis, curvatis, marginibus integris, vix ad apicem crenatis; sporotheciis basilaribus, partem medianam segmentorum occupantibus; receptaculo villosissimo.

Habitat in Brasilia fluminensi, ad Tijuca (Glaziou, n°s 1221 et 1707).

Filix rigida, glaberrima, squamis lutescentibus, lanceolatis, longe acuminatis, basi nigrescentibus.

Icon. : *Tab. LXIII, fig. 1.*

(Longueur : frondules primaires, 42-45 centim.; frondules secondaires, 7-9 sur 12-13 millim. de largeur; les écailles, presque capillacées, mesurent 2 centim.)

Cette espèce est caractérisée par l'absence de poils, par son opacité, sa rigidité et par la nature de ses écailles; elle est élastique et très-ferme; le réceptacle est chargé de poils intestiniformes, dans lesquels les sporanges sont comme plongées; le rachis a une saveur sucrée.

78. LOPHOSORIA, Presl., *Die Gefässb.*, p. 37.

Ce genre, créé par Presl, *l. c.*, a été formé aux dépens des genres *Cyathea* et *Alsophila;* il repose sur des caractères assez légers, que pourtant vient confirmer le port. Ce sont des fougères à larges frondes, très-divisées, couvertes plus ou moins abondamment de poils roux cotonneux et articulés; Presl, parlant des nervilles, dit que près de la marge elles s'unissent en arc, ce que nous n'avons pu voir. Les spores sont grosses et trigones; les sporanges sessiles et fort grandes; l'anneau, qui n'est point oblique, devrait faire placer ces plantes à la suite du genre *Phegopteris;* il compte de 20 à 30 articulations, suivant les espèces; celles-ci sont très-étroitement unies entre elles.

1. pruinata, Presl., *l. c.*, p. 37. *Polypodium glaucum*, Sw., *Prodr.*, p. 134. *P. griseum*, Schkh., *Crypt. Gew.*, p. 25, t. 25 *b*, *reduct. Alsophila pruinata*, Klfss., *Herb.* et *auct. plurim. Cyathea discolor;* Bory, *Voy. Duperrey*, p. 281. Glaziou, Rio-Janeiro, n°s 377, 1232 et 1705. Ile Sainte-Catherine, à Desterro, Mme Fanny Gauthier. — Sporothèces de couleur rouge, formés de sporanges sessiles, lâchement unies, entremêlées de poils courts, de même nuance; anneau portant 28-30 articulations; segments étroits, crénelés, médiocrement convolutés après dessiccation. Elle s'élève, au Chili, à 4 mètres environ.

2. cæsia, Presl., *l. c.? Polypodium cæsium.* Presl., *Reliq. Haenk.*, I, 27. Glaziou, Brésil, fertile, n° 1232, Rio-Janeiro. — Elle a inférieurement une teinte bleuâtre très-prononcée; les poils sont peu nombreux; la lame supérieure est brunâtre et luisante. La consistance est moins raide que dans l'espèce précé-

dente. Au lieu d'écailles, la base des frondes est couverte de longs poils, mous et dorés, intestiniformes vus sous le microscope.

† 3. DORSALIS, F.

Frondibus amplissimis, glaberrimis; petiolo aspero, brevibus spinis armato, basi turgido; rachibus lævibus, helveolis; frondulis primariis discoloribus, supra intense viridibus, subtus glaucescentibus, lanceolatis, sessilibus; rachi depresso; frondulis secundariis lanceolatis, sessilibus, caudatis, caudata crenata, segmentis oblongo-elongatis, opacis, duris, obtusis, crenatis; sporotheciis dorsalibus, per tota segmenta 12-14, in senectute confusis, bases segmentorum tectantibus.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2287; *in loco v. d.* Novo-Friburgo, *ad ripas rivulorum*).

Filix rigida, dura, opaca, multifrondulosa, glaberrima. An species Alsophilæ?

ICON. : *Tab. LI, fig.* 3.

(Longueur : frondules primaires, 45-50 centim.; les secondaires, 7-8 sur 15-17 centim. de largeur; nous comptons 20 paires de frondules secondaires et autant de segments sur chacune d'elles.)

Cette plante est fort belle et très-ample, glabre comme toutes ses congénères. Les poils qui recouvrent la base du pétiole, étroitement appliqués, sont sétacés et très-raides. Les lames supérieures sont couvertes de petites écailles de carbonate de chaux. Est-ce accidentel? — Les sporothèces semblent s'appuyer contre le mésonèvre; quoique très-rapprochés, ils sont distincts les uns des autres et assez petits.

† 4. PROSTRATA, F.

Frondibus tripinnatis, rigidis, amplis, petiolo crasso, basi curvato, nudo, pilis lanatis obsito; frondulis secundariis late lanceolatis, apice acuminatis, rachi plano, squamoso; frondulis tertiariis alternis, approximatis, petiolatis, petiolo brevi, squamoso; squamis rufis, basi pinnatis, superioribus pinnatifidis; segmentis oblongis, glaucescentibus, crenatis; sporotheciis crassiusculis, rufescentibus; sporangiis sessilibus, magnis, annulo 20-24 articulato; sporis trigonis, crassis, semitranslucidis.

Habitat in Brasilia fluminensi, Serra do Couto (Glaziou, n° 3165) [1869].

Filix formosa, glaucescens, superne glabra, subtus plus minusve squamulosa; pilis longissimis, succinoideis, intestiniformibus.

(Longueur des frondules primaires, 52-54 centim.; des frondules secondaires, 12-16 centim. sur 4 centim. d'envergure.)

Cette fougère ressemble beaucoup à l'*A. pruinata;* M. Glaziou nous écrit que le stipe est toujours couché sur le sol, circonstance qui décide de sa spécificité, le stipe de l'*A. pruinata* étant dressé et pouvant atteindre 2-3 mètres ou même davantage.

† 5. ACAULIS, F.

Frondibus tri-quadripinnatis, rachibus glabris, depressis, bi-tricanaliculatis; frondulis primariis oblongis, in acumine longo serrato terminatis, patulis, remotis, longe petiolatis; frondulis secundariis lanceolatis, petiolatis, profunde pinnatifidis, longe attenuatis, rachi tenui depresso, in cauda argute dentata terminatis; segmentis glaucescentibus, sublinearibus, acutis, superne glaberrimis, inferne lanatis; sporotheciis laxis, ad basim superiorem dentium solitariis; sporangiis ut supra.

Habitat in Brasilia fluminensi [Serra do Couto] (Glaziou, n° 3164).

Filix acaulis, rigida, omnibus partitionibus remotis, satis flexibilibus.

(Longueur des frondules primaires, 50 centim., avec des entre-nœuds de 6-8 centim; des frondules secondaires, 20-24 centim.; des tertiaires, 6 centim. sur 9-10 millim. de largeur.)

C'est la seule espèce qui soit acaule; elle est très-ouverte, souple, à segments assez écartés, crénelés, presque linéaires. M. Glaziou ne dit pas s'il existe un rhizome.

6. AFFINIS, Presl., *Die Gefässb.*, p. 37. Brésil, Glaziou, n° 1692; au Moro do Midozi, à 1,000 m. — Déterminé sur le spécimen authentique de Caraccas, recueilli par Moritz et cité par Presl (H. F., n° 9). Rhizome rampant; couleur glauque manifeste; rachis canaliculé, glabre, flexueux. Plante cartilagineuse, opaque.

79. TRICHOPTERIS, Presl., *Delic. Prag.*, I, 172.

1. EXCELSA, Martius, *Icon. crypt. Bras.*, p. 63, t. 37, *sub alsophila* (*Chnoophora*). *Trichopteris*, Presl., *Del. Prag.*, I, p. 172. *Polypodium Tænitis*, Klfss., *Enum.*, p. 119. *Polypodium Corcovadense*, Radd., *Fil. Bras.*, p. 26, t. 40. Martius, au Corcovado et aux Minas-Geraes; Rio-Janeiro, Glaziou, n°s 382 et 1220. Serra do Couto, n° 3166? (*sterilis*). Gardner, n°s 5335 et 5336; docteur Miller,

île Sainte-Catherine, à Desterro, H. Gauthier. — Écailles jaunes, dorées, lancéolées, très-longuement acuminées, mesurant 5 centim. de longueur; épines courtes et robustes.

2. ELEGANS, Presl., *Tent. pterid.*, p. 59. *Alsophila* (*Chnoophora*) *elegans*, Mart., *Icon. crypt. Bras.*, p. 63, t. 38. Prov. Saint-Paul, Minas-Geraes, par Martius; Sellow. Serra do Couto, Glaziou, n° 3166 (1869) [stérile].

3. CRENATA, Pohl, mss. *Alsophila crenata*, Kze., *Bot. Zeit.*, II, p. 212. Brésil. (N. V.)

80. AMPHIDESMIUM, Schott., *Gen. filic. in notis.*

1. PARKERI, Schott., *l. c. A. Blechnoides*, Kze., *Linn.*, XXI, p. 233. *Metaxya rostrata*, Presl., *Tent.*, p. 60, t. 1, fig. 5 (*nervatio*). San-Gabriel, Spruce, n° 2404; à Para, par le même, n° 35.

   Var. β *majus*. *Alsophila* (*Chnoophora*) *rostrata*, Mart., *Icon. crypt. Bras.*, p. 64, t. 39. Para et Rio-Negro.

B. HÉMITHÉLIÉES.

81. HEMITHELIA, Presl., *Die Gefässb.*, p. 41.

1. GARDNERIANA, Presl., *l. c. Alsophila Capensis*, Hook., *Sp. filic.*, I, p. 36 (*synon. excl.*). *Amphicosmia riparia*, Gardner, *in Hook. Lond. Journ. bot.*, I, p. 141, t. 12 (*syn. excl.*). Brésil, Serra os Orgaos, Gardner, n° 5954.

2. SELLOWIANA, Presl., *l. c.*, p. 45. *Cyathea Sellowiana*, Presl., *Tent. pterid.*, p. 55; Hooker, *Sp. filic.*, I, p. 23. Brésil, Sellow. Serra d'Estrella, Weddell, n° 871; Glaziou, n° 980.

3. MACROCARPA, Presl., *l. c.*, p. 44. *Cyathea Moricandiana*, Kze., *in littera ad Cl. Moricandium*. Bahia, Blanchet, *Pl. Bras.*, n°s 17 et 3227. (H. F.)

82. HEMISTEGIA, Presl., *Die Gefässb.*, p. 46.

1. INSIGNIS, F., *Hist. des foug. et lycop. des Antill.*, p. 98, f. 26. Rio-Janeiro, Glaziou, n° 2420. — Cette belle espèce est tout à fait identique avec la plante de la Guadeloupe. Elle est arborescente et inerme; les écailles du pétiole, blanchâtres et assez semblables à des glumes, sont lacérées à la marge, longue-

ment acuminées et traversées par une ligne brunâtre. Les frondules se présentent parfois opposées ; leurs segments portent des denticulations en scie dans les trois quarts de leur étendue; les nervilles sont souvent unies à la base.

XXIII. CYATHÉES.

83. CYATHEA, Sm., *Act. Taur.*, V, p. 417.

* *Segments pinnulaires à marge entière.*

1. ARBOREA, Sm., *l. c.* Sw., *Prodr.*, p. 139. *Hemithelia arborea*, F., *Gen. filic.*, p. 350. *Polypodium arboreum*, L., *Sp. pl.*, 1554. Plum., *Fil.*, tab. 1 et 2. Descourtils, *Antill.*, I, t. 63. *Dict. sc. nat.*, éd. Levrault, t. 57, Brésil.

   Var. β *Sternbergii*, Pohl, *in Sternb. Fl. der Vorw.*, 47, t. G. — F., *Hist. foug. et lyc. des Antill.*, p. 101, t. 27, fig. 1 (fronde et stipe). Blanchet, Igreja-Velha, Bahia, n° 2506. *An spec. distincta?* — Sporothèces en petit nombre, attachés à la base des segments pinnulaires. L'indusium est large, persistant et membraneux, flasque à l'état de dessiccation. Les pétioles sont inermes.

2. GARDNERI, Hook., *Sp. filic.*, I, p. 21, t. 10 A. Gardner, Arrial das Merces, n° 5328, et Morro-Velho, n° 5333. Weddell, Minas-Geraes, n° 1062. Rio-Janeiro, n° 2282. — Cette plante est glabre, à frondules de 2e ordre sessiles, longuement acuminées, avec un acumen denté; les segments sont arqués, séparés par un sinus de 2 millim.; ils portent de 6 à 8 sporothèces distincts, parfaitement globuleux; on voit au sommet un point coloré en brun qui les surmonte. Le pétiole est assez robuste, canaliculé, chargé à la base de magnifiques écailles dorées, luisantes, linéaires, pouvant atteindre jusqu'à 5 centim.; elles y sont lâchement appliquées et forment d'épais coussinets. Le stipe atteint environ 3 mètres de hauteur sur 60-70 centim. de circonférence. Il est inerme et plus ou moins garni de racines adventives.

† 3. MAMILLATA, F.

Frondibus oblongo-lanceolatis; rachibus glabris; frondulis primariis remotis, sessilibus, lanceolatis, semi-pinnatis, acutis; frondulis secundariis sessilibus, linearibus, pinnatifidis; segmentis subtriangularibus, cauda longa, angustissima, terminatis; supra, mesonevro excluso, glaberrimis; infra

longos pilos molles, albidulos ferentibus; sporotheciis rotundis, segmentum totum tegentibus, sed semper distinctis, clausis, ad apicem mamillatis.

Habitat in Serra-Carassa *Brasiliæ* (Galeotti, n° 247). [H. F.]

Filix elata, sporangiis globulosis, mamilla fusca notata.

Icon. : *Tab. LXIII, fig. 2.*

(Fronde, 70 centim., avec des frondules primaires centrales de 16 à 17 centim.; frondules secondaires, 4 centim. sur 5 centim. de largeur; le rachis est jaunâtre, déprimé et canaliculé; les entre-nœuds mesurent 8 centim.)

Cette plante est caractérisée par des frondules primaires beaucoup plus courtes que dans presque toutes les espèces connues de fougères en arbre et par des frondules secondaires linéaires, dont les segments ressemblent à de grosses dents; en outre, les sporothèces, au nombre de 4-6 sur chaque segment, sont clos et surmontés d'un pore rougeâtre, ce qui leur donne tout à fait l'apparence de certaines espèces de *porina* exotiques. Ce dernier caractère se retrouve dans le *Cyathea Gardneri*, Hook., *Sp. filic.*, I, p. 21, t. 10 *a*, mais c'est là le seul rapport qui existe entre les deux espèces.

† 4. ACANTHOMELAS, F.

Frondibus petiolo basi turgido, squamis angustis, numerosis, hirto, spinis assurgentibus, acutissimis, rectis, nigris, basi late dilatatis; rachibus primariis depressis, inermis, fulvis, sulcatis; frondulis primariis elongatis, lanceolatis, rachi depresso, superne tricanaliculato; frondulis secundariis sessilibus, apertis, lanceolatis, cauda obtusiuscula terminatis, perfacile delapsis; segmentis oblongis, prope laminam terminatis; sporangiis paucis, basilaribus; pilis rigidis, fuscis, simplicibus aut bifurcatis immixtis; sporis irregulatim trigonis, nigrescentibus.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 379).

Filix pinnulis articulatis, caducis; sporangiis paucis, ad imum segmentorum evolventibus.

Icon. : *Tab. LXIV, fig. 1.*

(Longueur des frondules primaires, 65-70 centim.; des frondules secondaires, 7-8 centim.; elles sont larges de 1,3 centim. et séparées par un entre-nœud de même dimension.)

Deux caractères distinguent nettement cette plante : 1° un long pétiole, renflé à la base, très-abondamment couvert d'écailles linéaires, frangées à la marge, dressées et d'aspect hérissé; du milieu de cette espèce de bourre s'élèvent des épines

éparses, très-aiguës, luisantes, très-noires, plus abondantes du côté externe que du côté interne; 2° la facilité avec laquelle les frondules secondaires, qui sont horizontales et articulées, se détachent du rachis. Cette espèce a, par ses frondes, du rapport avec le *C. arborea*, Sm., qui est inerme.

† 5. TAUNAYSIANA, Glaziou, *in litter.*

Frondulis extensis, glabris, inermibus; petiolo crasso, rufescente, in utroque multistriato; frondulis primariis distantibus, remotis, alternis, oblongis, acutis, rachi superne breve piloso; frondulis secundariis linearibus, acuminatis, patulis, sessilibus; segmentis oblongis, marginem attingentibus; sporotheciis totam laminam invadientibus et confluentibus; sporangiis crassis; sporis trigonis.

Habitat in Brasilia fluminensi, circa Tijuca (Glaziou, n° 1701).

Filix formosa; frondulis decrescentibus, remotissimis, basi squamosa, squamis longissimis, flavis, linearibus, capilliformibus.

ICON.: *Tab. LXIV, fig. 2.*

(Frondes, 1 mètre et plus de longueur; frondules primaires, 25-27 centim.; frondules secondaires, 6 centim.; les segments, aussi larges que hauts, ont à peine 3 millim. Le stipe atteint 3 mètres sur 60-70 centim. de circonférence; la base est couverte de racines adventives.)

Cette belle espèce, que M. Glaziou a dédiée à la mémoire d'un peintre célèbre, qui avait trouvé une seconde patrie au Brésil, est remarquable par la beauté des écailles qui entourent les jeunes pousses et la base des pétioles d'un duvet délicat; vues au microscope, elles apparaissent comme d'étroites membranes portant quelques dents à la marge; le réseau est formé de mailles étroites et très-allongées. Toutes les parties de la plante sont assez écartées les unes des autres; les frondules se dégradent en dimension du sommet à la base, où elles se montrent rudimentaires. Les frondules secondaires ressemblent à la fronde du *Polypodium moniliforme*, Sw.; elles sont sessiles, à nervilles très-rapprochées, fort déliées, assez épaisses et fructifères à ce point de ne rien laisser voir de la surface envahie; les pétioles portent des stries nombreuses.

† 6. ATTENUATA, F.

Frondibus amplis, rachibus inermibus, flavidulis lævibusque; frondulis primariis glabris, petiolatis, oblongo-lanceolatis; rachi depresso, sulcato, apice elongato, longe attenuato; frondulis secundariis sublinearibus, pinnatifidis,

sessilibus, rigidis, segmentis oblongis, obtusis, crassis, opacis; sporotheciis majusculis, globosis, in quavis lacinia 8-10; sporangiis crassis, cum squamis laceratis immixtis; annulo lato 24-28 articulato; sporis inæqualiter trigonis.

Habitat in Brasilia (Weddell, n° 1062).

Filix frondibus secundariis et tertiariis ad apicem longissime attenuatis notata.

Icon.: *Tab. LXVI, fig. 1.*

(Longueur des frondules primaires, 42-45 centim., avec des entre-nœuds de 10 centim.; les secondaires mesurent 8 centim. sur 7-8 millim. de large, avec des entre-nœuds de 10-12 millim.)

Il sera facile de reconnaître cette espèce à ses frondules primaires et secondaires, terminées au sommet par une très-longue pointe, pouvant atteindre 2 à 2,5 centim. de longueur. Cette pointe devient flexueuse par la dessiccation; les segments qui s'y attachent et qui sont entiers, se replient sur eux-mêmes par dessiccation. Quoiqu'elle soit glabre, on trouve mêlées aux sporanges des espèces d'écailles sinueuses, déchiquetées, dont les partitions sont étroitement linéaires.

** *Segments pinnulaires dentés.*

† 7. Feei, Glaziou, *in litter.*

Frondibus amplis, patulis, rachibus primariis crassis, glabris; petiolo fusco, spinis brevibus cribrato, squamis lanceolatis, acuminatis, fulvis; frondulis primariis frondulosis, pinnatis, petiolatis, oblongis, rachi tomentoso, superne tricanaliculato, inferne unicanaliculato, apice vix pinnatifidis; frondulis secundariis lanceolatis, subpetiolatis, pinnatifidis, patulis, apice longe caudatis; segmentis oblongis, crenatis, curvatis, caudatis, in parte superiori sterilibus; sporotheciis ad maturitatem confusis, rufidulis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Claussen, n° 114, et Glaziou, n° 2286).

Filix magna; frondulis et segmentis in parte inferiori tantum fructiferis, sporotheciis supra laminam superiorem impressis.

Icon. : *Tab. LXVI, fig. 2.*

(Longueur des frondules primaires, 70 centim.; les secondaires, 11-13 centim. sur 2 centim. de largeur; le sinus qui sépare les segments a 2 millim. de largeur: nous comptons près de 40 paires de frondules secondaires, séparées par un entre-nœud de 2 centim. Le stipe, qui est dépourvu de racines adventives, est le plus élevé des espèces de cette tribu.)

Cette espèce est fort grande et de très-beau port; les rachis primaires atteignent la grosseur du petit doigt; ils sont lisses et portent quelques épines courtes. Le rachis de la frondule primaire est déprimé et comme strié du côté supérieur de la

lame, impressionnée par les sporothèces au point qui correspond à leur attache; ils ne couvrent que les deux tiers des frondules secondaires et laissent libre le tiers supérieur des segments.

8. SERRA, Willd., *Fil.*, p. 491; Hook., *Sp. filic.*, I, p. 17, t. 9 A. — F., *Hist. foug. et lycop. des Antill.*, p. 101. Brésil, Gardner, n° 2990; Claussen, n° 258. — Segments linéaires, légèrement courbés, crénelés, mais à marge entière au sommet dans quelques variétés.

9. VESTITA, Mart., *Icon. crypt. Bras.*, p. 75, t. 52. *C. Delgadii*, Pohl, *in Sternb. Flor. der Vorwelt*, t. B. Brésil, province Saint-Paul et Saint-Sébastien, Martius; Brésil, province de Ceara, Gardner, n° 1907.

10. MEXICANA, Schlecht., *Linn.*, V, p. 616; Mart. et Galeotti, *Filic. Mexic.*, p. 79, n° 6335. Tijuca, dans les forêts, L'Hotschy? — Arbre de 5 à 7 mètres; frondules secondaires sessiles, acuminées-caudées; segments assez petits, obtus, à marge fortement crénelée et abondamment chargée de sporothèces connivents, de couleur roussâtre.

11. SCHANSCHIN, Mart., *Icon. crypt.*, p. 77, t. 54. *C. oligocarpa*, Kze., *Linn.*, IX, p. 101. *Syn. pl. crypt.*, Pœpp. Prov. Saint-Paul et Minas-Geraes, Martius; Sellow; Serra os Orgaos, Gardner, n° 5955? Claussen, à la Nouv.-Fribourg, n° 257; Rio-Janeiro, Glaziou, n°s 986, 1703, 1707 (*partim*) et 2285. — Les rachis principaux, munis de très-petites épines, sont glabres. Les écailles, dorées, luisantes, très-lisses, à marge entière, portent quelques longs poils déliés; elles atteignent jusqu'à 3,5 centim. de longueur. Le pétiole est roussâtre, lisse et épineux; ses épines, assez déliées et flexibles, ont environ 4-5 millim. de longueur.

12. HIRTULA, Mart., *l. c.*, p. 76, t. 53. Serra do Mar, Bahia. — Frondes bipinnées; rachis brunâtres, légèrement *hérissés;* frondules linéaires aiguës, poilues sur les deux faces, pinnatifides; segments ovales lancéolés, obtus, faiblement crénelés; sporothèces peu nombreux; pétioles armés d'aiguillons.

† 13. SPHÆROCARPA, F.

Frondibus patulis, pilosis, rachibus ferrugineis, tomentosis; petiolo fusco, glabro, spinis conicis, fuscis; frondulis pinnatis, lanceolatis, petiolatis, rachi depresso, superne et inferne canaliculato, pilosissimo, apice brevissime pinnatifidis; frondulis secundariis lanceolatis, sessilibus, apice crenato;

segmentis oblongo-elongatis, subtiliter crenatis, inferioribus minutis, omnibus curvatis, obtusissimis, mesonevro squamoso, marginibus integris; sporotheciis globosis, distinctis, per tota segmenta 7-8.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2283).

Filix villosa; petiolis spinosis squamosisque; squamis rigidis, opacis, lucidis, lanceolatis, acuminatis.

Icon. : *Tab. LIII, fig. 2.*

(Longueur : frondules primaires, 48-54 centim.; frondules secondaires, 8-9 centim. sur 10 millim. de largeur; nous comptons une trentaine de paires de frondules secondaires; squames, en moyenne 1 centim.)

Cette espèce est velue; elle manque de caractères saillants; ses sporothèces globuleux, assez petits et de couleur dorée, la forme de ses écailles et celle de ses épines, la feront facilement reconnaître. Les segments atteignent presque le mésonèvre.

14. incurvata, Kze., *Linn.*, XXIII, p. 579. Brésil, Minas-Geraes, Regnell, I, 477. — Frondes coriaces, discolores; frondules secondaires courtement pétiolées, courbées au sommet; segments triangulaires ovales, oblongs, en faux, obtus, à marge crénelée. Le stipe est inconnu. (N. V.)

15. monticola, Presl., *Die Gefässb.*, p. 39, t. 7, f. 12 (coupe du stipe). *Alsophila monticola*, Mart., *Crypt. Bras.*, p. 75; Hook., *Spec. filic.*, I, 45. Minas-Geraes; Villafranca, Freireis; Martius, *l. c.* — Fronde bipinnato-partite; rachis et nervilles inférieurement pileux, tomenteux en dessous; les frondules secondaires sont oblongues, lancéolées, avec des segments linéaires, oblongs, sous-pinnatifides et denticulés; les sporothèces, presque solitaires, occupent chaque côté des segments.

† 16. Beyrichiana, Presl., *Tentam.*, p. 55; Hook., *Spec. filic.*, I, 21, et *Icon. pl.*, n° 623. *Amphicosmia Beyrichiana*, Th. Moor., *index.*

Frondibus amplis; frondulis primariis oblongis, sessilibus, apice abrupte terminatis; rachibus primariis robustis, inermibus, brevissime tomentosis, supra late canaliculatis, depressis; rachibus secundariis supra fuscis, viscosis? frondulis secundariis lanceolatis, mesonevro squamuloso; segmentis in tota longitudine liberis, apice obtusissimis, dilatatis; apice subcrenulato; sporis trigonis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Gardner, n° 135; Weddell, Serra d'Estrella, n° 871; Glaziou, n° 980).

Filix arborescens, stipite spinoso, spinis nigrescentibus, squamis linearibus, margine denticulato circumdatis.

Nous décrivons cette plante d'après le spécimen n° 980 de M. Glaziou. Il nous a semblé qu'il fallait en présenter les caractères d'une manière précise.

Cette espèce controversée a passé successivement dans divers genres; elle est caractérisée par des segments pinnulaires, notablement élargis au sommet; par des épines noires, coniques, cachées dans une sorte de coussinet formé d'écailles linéaires à marge denticulée, ayant l'apparence du foin desséché; elles sont marginées de blanc; le rachis primaire est lisse, inerme, déprimé, largement sillonné en dessus et bombé en dessous. La plante est discolore, brunâtre en dessus et verdâtre en dessous. Cette dissimilitude de couleur est surtout remarquable chez le rachis des frondules primaires.

† 17. LEUCOSTICTA, F.

Frondibus longe petiolatis; petiolo squamoso; squamis cinereis, curvatis, linearibus, albo marginatis; spinis nigris, brevibus, basi incrassatis; frondulis primariis oblongo-lanceolatis, subsessilibus; rachi crasso, inermi, glabrescente, apice abrupte terminatis; frondulis secundariis patulis, lanceolatis, alternis, acutis, glabris, mesonevro squamuloso; segmentis oblongis, crenulatis, ad basim et apicem dilatatis, costam attingentibus; sporotheciis per tota segmenta 5-6, apice sterili; sporangiis rotundis; annulo lato, vix obliquo, 14 articulato, perfacile soluto; sporis trigonis, lutescentibus.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 1700) [Tijuca].

Filix inermis, glabra, rachibus glabriusculis; squamis cinereis; spinis validis, basi incrassatis.

ICON.: *Tab. LXV.*

(Frondules primaires, 45-47 centim. de longueur; frondules secondaires, 9 centim. sur 15-17 millim. de largeur; entre-nœuds distants d'environ 2 centim.)

Cette espèce est caractérisée par des frondules primaires brusquement terminées en une pointe, dont les segments supérieurs sont entiers, et surtout par sa squamation, qui consiste en un amas d'écailles linéaires, rubescentes, assez souples; les segments, très-obtus, sont légèrement crénelés; les sporothèces n'envahissent que la moitié inférieure de chaque segment. Les pétioles sont très-longs, verdâ-

tres, à épines écartées; ils portent, vers le bas, de très-petites frondules très-découpées, à segments oblongs, pétiolulés. Les lames sont tiquetées de petites plaques blanchâtres, irrégulières, légèrement boursouflées; elles adhèrent à l'épiderme, dont il est difficile de les séparer.

† 18. ABRUPTE CAUDATA, F.

Frondibus pilis ferrugineis, obsitis; petiolis fuscis, spinis brevibus et squamis lanceolatis, auratis, acuminatis vestitis; frondulis primariis oblongis, villosis, rachi tomentoso, unicanaliculato; frondulis secundariis sessilibus, lanceolatis, abrupte caudatis, cauda subtiliter crenatis; sporotheciis 6-8 per tota segmenta, ad maturitatem confusis et tunc faciem acrostichorum referentibus.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2284).

Filix ferruginea, tota villosa, rachibus primariis tomentosis, spinescentibus, secundariis inermibus; sporotheciis confluentibus.

ICON. : *Tab. LXII, fig. 2.*

(Longueur des frondules primaires, 36-40 centim.; des secondaires, 7-8 centim. sur 12 millim. de largeur avec des intervalles de 11-13 millim., nous comptons 22-25 paires de frondules; les écailles ne dépassent guère 1 centim.)

Elle est facile à reconnaître à la couleur ferrugineuse-roussâtre de ses rachis et de leurs subdivisions; les frondules secondaires sont rapprochées les unes des autres; les segments ont une marge crénelée et ne produisent de sporothèces que dans leur moitié inférieure; ils sont ordinairement confluents. Le pétiole, qui est rougeâtre, porte à sa surface de petites aspérités.

19. DENTICULATA, Goldm., *N. act. N. C.*, XIX, suppl. 466. Brésil. — Elle nous est inconnue.

NB. Ce beau groupe renferme les fougères en arbre, celles qui attirent les regards des voyageurs et qui donnent, avec les palmiers, une physionomie toute spéciale au paysage. Les frondes prennent un développement considérable, 2 à 4 mètres; à très-peu d'exceptions près elles ont, en grand, l'aspect de nos *Phegopteris* et de nos *Aspidium*. Les pétioles sont très-fréquemment épineux, le tronc pouvant être inerme. Toutes ces plantes n'ont pas la majesté de port que semble indiquer l'épithète de fougères en arbre. En ce qui concerne les espèces brésiliennes de ce groupe, M. le docteur Glaziou nous écrit qu'elles peuvent être divisées en trois groupes: 1° les minces, de 18-20 centim. de circonférence, qui dépassent

rarement 400 mètres d'altitude au-dessus de la plaine; 2° les moyens, qui atteignent de 30 à 35 centim. de circonférence sur 6 à 8 mètres de hauteur; c'est la taille de la majorité des fougères brésiliennes; 3° les gros, qui ont de 60 à 70 centim. de circonférence, avec de nombreuses racines adventives; ils sont toujours dépourvus d'épines, et leur stipe mesure rarement plus de 3 mètres. Quelques espèces sont herbacées et ne produisent qu'un gros rhizome fibrilleux. Parmi les *Lophosoria*, il existe une espèce acaule et une autre qui rampe sur le sol. On voit que si l'on trouve l'élégance du port, la majesté des proportions n'existe pas.

Les Alsophilées et les Cyathées sont de détermination difficile; on n'a pu les figurer que partiellement. Il faut s'aider du port du stipe, de la présence ou de l'absence des épines sur les pétioles et surtout des écailles très-différentes de forme, de couleur et de proportions.

II. HYMÉNOPHYLLACÉES.

I. TRICHOMANOIDÉES.

84. HYMENOSTACHYS, Bory, *Dict. classiq. hist. nat.*, t. 8, p. 462.

1. DIVERSIFRONS, Bory, *l. c.*, *cum icone. Feea Boryi*, V. den Bosch. *Hym.*, p. 7. — Récolté pour la première fois à Cayenne, par Poiteau, botaniste aussi savant que modeste; puis vers Saint-Gabriel, de Rio-Negro, Brésil septentrional, par Spruce, n° 2182. C'est pour Presl, *Hymen.*, p. 11, le *Trichomanes osmundoides*, de Poiret. — Les frondes stériles sont pinnatifides; les fructifères, beaucoup plus longues, étroitement linéaires et à marge entière, portent autant de pyxidules qu'il y a de nervures. Cette plante a été imparfaitement connue de Rudge, qui en avait fait un *Trichomanes elegans*. La fronde fertile est exactement celle du *Feea polypodina*, Bory.

2. HUMBOLDTII, V. den Bosch, *Hymenoph.*, p. 7, *sub Feea. Trichomanes heterophyllum*, H. Bonpl. et Kth., *Nov. Gen.*, I, p. 25. Dans les environs de Santarem, prov. de Para (sans numéro). — Nous ne croyons pas que cette espèce appartienne en réalité au genre *Hymenostachys*. Les frondes stériles ont une autre consistance; elles sont pinnées et attachées sur un rhizome rampant; les pétioles et les frondules portent de longs poils, faiblement adhérents; les

frondes fertiles, au lieu d'être formées de parties soudées, simulant un épi contracté, constituées par des segments arrondis imbriqués, largement attachés sur le pétiole. — Ce serait peut-être un genre à former et il serait intermédiaire entre le *Feea* et l'*Hymenostachys*.

85. NEVROPHYLLUM, Presl., *Hymenoph.*, p. 18, t. IV, fig. *c*.

1. Hedwigii, V. d. Bosch, *Hymen.*, p. 8. *Trichomanes pinnatum*, Hedw., *Gen. et spec. fil.*, fasc. 1, t. 4, f. 1. F., *Hist. foug. et lycop. des Antill.*, p. 104. *Nevrophyllum pinnatum*, Presl., *l. c.*, p. 19. Claussen, Brésil, n° 432.

2. pennatum, Klfss., *Enum. fil.*, p. 264, *sub trichomanoide. Trichomanes floribundum*, H. et B., *in Willd.*, *Fil.*, p. 505; Hook. et Grev., *Icon.*, n° 9; Mart., *Herb. Bras.*, n° 432; Luschnath, n° 33. Rio-Janeiro, Glaziou, n° 2245.

3. abruptum, F., *Mém.*, I, p. 14, t. 1, f. 5. *N. Hostmannianum*, Kl., *in Linn.*, XVIII, p. 532. Brésil (*teste* Kze.).

86. TRICHOMANES, Presl., *Hymenophyll.*, p. 13.

* *Frondes dressées, souples.*

1. incisum, Klfss., *Enum.*, p. 261. *T. cognatum*, Presl., *Hymen.*, p. 16 et 41. Brésil mérid., Chamisso, Tweedie, Macrae, Beechey. Glaziou, Rio-Janeiro, n°s 460, 918, 1648, 1672, 2257 et 2466; Sainte-Catherine, H. Gauthier. — Cette espèce est-elle bien celle qui a été figurée par Bory, tab. 38, fig. 1, du *Voyage de Duperrey* et ne semble-t-elle pas plutôt se rapporter au *T. sinuosum?* Le *T. incisum*, Minas-Geraes, Gardner, n° 5326, tel que nous l'avons sous les yeux, est facile à reconnaître aux pyxidules, dont les marges sont extrêmement divariquées. La plante est ciliée d'assez longs poils, souvent étoilés; elle varie par des frondes plus ou moins larges.

2. Bancroftii, Hook. et Grev., *Icon.*, n° 204. *T. coriaceum*, Kze., *Linn.*, IX, p. 105, et *Analecta pterid.*, p. 46, t. 29, f. 1. Brésil, Pœppig.

3. bicorne, Hook., *Centur. of ferns*, t. 82. San-Gabriel de Rio-Negro, Spruce, n° 2334. — Les pyxidules portent, sur le côté, deux prolongements simulant deux cornes, particularité qui caractérise nettement cette espèce.

4. SINUOSUM, Willd., *Filic.*, p. 502. *T. quercifolium*, Desv., *in Berol. mag.*, V, p. 328, *non* Hook. et Grev. *T. Pœppigii*, Presl., *Hym.*, p. 16 et 41? Ile Sainte-Catherine, à Desterro, H. Gauthier. — Translucide, très-souple, portée sur un rhizome très-délié, et rampant. Dimensions variables. Elle a été figurée par Lamarck, *Illustr.*, t. 871, f. 1, et par Hooker et Greville, *Icon.*, n° 13, sur un grand spécimen. Les columelles sont flexueuses et fort longues.

5. PELLUCENS, Kze., *Linn.*, IX, p. 104, et *Suites à Schkh.*, p. 158, t. 68. Brésil, Martius; M'Rae. — Elle est villeuse et les lèvres des pyxidules sont entières.

† 6. AURATUM, F.

Frondibus pinnato-pinnatifidis, lanceolatis, acutis, petiolo rachique purpureis, pilis longiusculis, auratis, obsitis; frondulis villosissimis, oblongis, pellucidis, approximatis, sæpe imbricatis, infimis minoribus, segmentis undulatis; surculo erecto; pyxidulis ore dilatato inclusis, columella crassiuscula, setacea; nervillis tenuibus; areolis telæ cellulariæ minutis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2465).

Filix formosa, pilis longissimis, auratis fulvisque; petiolo et rachi purpureo.

ICON. : *Tab. LXVII, fig. 1.*

(Longueur des plus grandes frondes, 25-30 centim. sur 3-4 centim. d'envergure; le pétiole fait environ la moitié ou les deux cinquièmes de la longueur totale.)

Cette espèce est très-délicate, dressée sur une souche assez grosse; toutes ses parties sont couvertes de longs poils, étalés, flexueux, les uns dorés, les autres fauves; sur les jeunes frondes ils prennent un aspect soyeux; la transparence est parfaite. Les mailles du tissu sont fort petites et allongées; les pyxidules entourées dans toute leur étendue par le tissu des segments sur lesquels elles naissent.

7. CRISPUM, L., *Sp. pl.*, 2e édit., p. 1560; V. d. Bosch, *Hym.*, p. 18, *nec* Hedw., *nec* Hook. Barra, Rio-Negro; Spruce, Vauthier, Minas-Geraes, n° 675. — Frondes pinnatifides, lancéolées, à frondules parallèles, un peu denticulées.

8. CRISTATUM, Klfss., *Enum.*, p. 265. Gardner, Rio-Janeiro; Glaziou, n° 2051. Sainte-Catherine, H. Gauthier. — Les pyxidules sont bidentées.

Var. *macrothrix*, F. Rio-Janeiro, Glaziou, n° 2246. — Elle ne diffère du type que par des columelles d'une longueur considérable, pouvant atteindre jusqu'à 3 centim.

9. PILOSUM, Radd., *Filic. Bras.*, p. 63, t. 79, f. 1. *T. laxum*, Klotz., *Linn.*, XVIII, p. 530. Brésil, Raddi, Martius, Prince de Neuwied. — La figure donnée par Raddi se rapporte à une plante qui mesure une dizaine de centimètres seulement; elle n'est pas rampante.

10. MARTIUSII, Presl., *Hymen.*, p. 15 et 36. *T. pilosum*, Mart., *Icon. crypt. Bras.*, p. 105, t. 68; *ad dextram, non* Radd. Brésil. — Souche dressée. Espèce à frondes pinnées, à frondules entières, très-rapprochées, pileuses, à pétiole villeux et à spores trigones. (N. V.)

11. PLUMULA, Presl., *Hymen.*, p. 15 et 36. *T. pilosum*, Mart., *l. c.*, t. 68, *ad sinistram*. Martius, Brésil. — Elle a le facies de l'espèce précédente; mais elle est plus ample et le rhizome est rampant. (N. V.)

12. SELLOWIANUM, Presl., *l. c.*, p. 15 et 37. Brésil, Sellow et Gardner. — Grande espèce: 40 centim. de hauteur, dont le stipe fait environ le quart; les segments mesurent 4 centim. au centre sur 6 millim. de largeur; les nervilles sont assez grosses et noirâtres.

† 13. TRANNINENSE, F.

Frondibus erectis, arbusculum parvulum referentibus, petiolatis, bipinnatis; petiolis rachibusque alatis; segmentis linearibus, obtusiusculis, glabris, caudice longo, repente; pyxidulis axillaribus, ore contracto; columella longissima.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2251).

Filix petiolata, pyramidata; areolis telæ cellulariæ minutissimis.

ICON.: *Tab. LXIX, fig. 1.*

(Longueur : 8-9 centim. sur 2 centim. dans la plus grande largeur. Le pétiole fait environ le tiers de la longueur totale.)

Les frondules naissent très-espacées sur un rhizome filiforme, tomenteux; elles ont la forme d'un petit arbre; les plus grandes frondules terminent la fronde. La columelle excède trois fois la longueur de la pyxidule. Le nom spécifique rappelle celui de M. Trannin, cultivateur habile du Brésil, qui aime les sciences naturelles.

14. PYXIDIFERUM, L., *Sp. pl.*, 1561 (*synonym. excl.*). Plum., *Fil.*, p. 74, t. 50 E. Rio-Janeiro, Glaziou, n° 2052. — Frondes pinnées, parfois bipinnées; frondules à segments linéaires, obtus, très-entiers; le rachis et le pétiole sont ailés.

† 15. ACROCARPON, F.

Parva, pinnatifida, repens; frondibus oblongis, viridibus, sessilibus, segmentis late linearibus, undulatis, penicillos pilorum albidos longos ferentibus et præterea pilis stellatis sparsis, præcipue ad margines; pyxidulis elongatis, liberis, apicem segmentorum occupantibus; areolis telæ cellulariæ rotundis; columella atra, longiuscula.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2248).

Filix ramulos arborum vestiens; rhizomate crasso, fusco, tomentoso; pyxidulis terminalibus.

ICON. : *Tab. LXX, fig. 1.*

(Longueur : 3 centim. sur 15 millim. de largeur.)

Cette espèce est simplement pinnée; ses segments ondulés ou lobés sont légèrement crépus. Des pyxidules assez longues terminent les segments sur lesquels elles s'attachent. Indépendamment de poils étoilés, on trouve çà et là de petits faisceaux de poils dressés assez longs, production peut-être accidentelle.

16. EMARGINATUM, Presl., *Epim. bot.*, p. 11, t. V, B. Serra d'Estrella, Beyrich et Pohl; Serra os Orgaos, Glaziou, n°s 1717 et 2464. (Indiq. comme très-rare.) — Elle n'a pas de caractères tranchés.

17. BRASILIENSE, Desv., *Mém. Soc. Linn. Par.*, VI, p. 328, t. 7, f. 4. *T. pyxidiferum*, Hedw., *Gen. fil.*, t. III, f. 2. Brésil, Martius; Weddell. — Il règne beaucoup de vague sur cette espèce, qui peut-être ne diffère pas du *T. pyxidiferum*, L.

18. LEPTOPHYLLUM, V. d. Bosch, *Hymenoph.*, p. 23. *T. pyxidiferum*, H. et Grev., *Icon. filic.*, p. 206, *non* Hedw. Glaziou, Rio-Janeiro, n°s 919, 2250, 2252 et 3179, à Serra do Couto (1869). — Glabre, rampante, segments linéaires; columelle assez longue.

19. SCHIEDEANUM, C. Mull., *Bot. Zeit.*, 1854, p. 716.

Var. β *Brasiliana;* Glaziou, Saint-Louis, Serra os Orgaos, n° 1716, et Rio-Janeiro, n° 2249. — Plante d'une grande délicatesse, à segments étroitement linéaires; pyxidules allongées, légèrement bordées par une membranule, l'orifice est un peu dilaté; la columelle manque très-souvent.

Le type et la variété prennent place à côté du *T. trichoideum*, Sw.

20. TENERUM, Spreng., *Syst.*, IV, p. 129. Brésil, Martius, Blanchet, Regnell, Beyrich. — Frondes bipinnatifides, linéaires-lancéolées, glabres, bidentées parfois au sommet. Cette espèce est confuse dans les herbiers.

** *Frondes dressées, raides, toujours pluripinnées.*

21. RIGIDUM, Sw., *Fl. Ind. occid.*, III, 1738. Hedw., *Gen. filic.*, t. 11. *T. Mandioccanum*, Raddi, *Fil. Bras.*, t. 79, f. 2. *T. firmulum*, Presl., *Hymen.*, p. 46? Serra d'Estrella, Claussen; Rio-Janeiro, Glaziou, n° 456, et Serra do Couto, n° 3178? (petite forme) 1869. *Rachibus nudis; segmentis linearibus, acutis; sæpe siccitate crispis.*

22. PRIEUREI, Kze., *Fl. Bras. Martii*, n° 387, et *Analect. pterid.*, p. 48. Ilheos et ailleurs. San-Gabriel de Rio-Negro, Spruce, n° 1398. Serra do Couto, n° 3176; Glaziou (1869). — Elle est plus ou moins divisée, plus ou moins raide; la souche est très-grosse, avec des radicelles fort dures, perpendiculaires et brunâtres, presque nues et fort longues.

† 23. SERRICULA, F., Barra, province de Rio-Negro. — Nous n'avons sous les yeux cette espèce qu'à l'état stérile; aussi nous contenterons-nous de la décrire sommairement. Elle est rampante et à stipe filiforme; les frondules sont pinnatifides, linéaires, obtuses; elles se terminent par un très-court pétiole; leur marge est en scie, avec des dents souvent bifides. Leur dimension ne dépasse pas 7 centim. sur 8-9 millim. de largeur.

ICON. : *Tab. LXVIII, fig. 3.*

24. ANCEPS, Hook., *Sp. filic.*, I, p. 135, t. 40 *c* (*syn. excl.*). Brésil, Sellow. Barra, prov. de Rio-Negro, Spruce. — Se rapproche du *T. rigidum*, Sw. (N. V.)

*** *Frondes radicantes.*

25. RADICANS, Sw., *Fl. Ind. occ.*, p. 1736. *T. scandens*, Hedw., *Gen. fil.*, t. 6, *non* L. Bahia; Rio-Janeiro, Glaziou, n°s 457, 458, 922, 1219, 1678 et 2253, Serra do Ariro, et 3177, Serra do Couto (1869). — Cette espèce est fort controversée et, en général, confondue avec d'autres espèces dans les herbiers; nous la distinguons du *T. Luschnathianum*, Presl., par de longs pétioles, étroitement ailés. Le n° 457 de M. Glaziou est normal, ainsi que le n° 922; le n° 1219 est une variété à segments étroits et écartés, var. β *macilentum*, remarquable par l'exiguïté de ses pyxidules; le n° 1678 est remarquable par les grandes dimensions de ses frondes et par ses frondules primaires dressées et plus courtes que dans les autres formes. Il arrive quelquefois que les pyxidules manquent.

26. BRACHYPUS, Kze., *Linn.*, IX, p. 105. *T. radicans*, H. et Gr., *Icon.*, n° 218, *non* Sw. Brésil, de Gestas; Blanchet; Martius, *Herb. Bras.*, n° 387.

27. LUSCHNATHIANUM, Presl., *Hymen.*, p. 46. *T. radicans*, Kze., *in Fl. Bras.*, Mart., *Herb. Bras.*, Martius, n° 389. Bahia, Luschnath, n° 32 (H. F.); Claussen, n° 103, *sub nomine T. radicantis*, Sainte-Catherine, H. Gauthier. Glaziou, Rio-Janeiro, n°s 459, 2255? et 2256. — Frondes sessiles; pétiole nu, d'un vert livide, prenant une teinte brune-verdâtre par dessiccation.

28. ABROTANIFOLIUM, V. d. Bosch, *Hymen.*, p. 27. Brésil, Martius, *in Herb. Sond.*

† 29. FRONDOSUM, F.

Frondulis sessilibus, oblongo-lanceolatis, apice acutis, glaberrimis; rachi late alato; frondulis primariis lanceolatis; segmentis linearibus, obtusis, bifidis; pyxidulis infundibuliformibus, truncatis, aut leviter ore dilatato; columella indusio duplo minori; sporangiis rotundis; annulo vix obliquo, 20 articulato; sporis triedricis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n°s 917, 1647, 1715 et 2254).

Hymenophyllum rupestre, Radd., *Filic. Bras.*, p. 67, t. 80? *Trichomanes Luschnathianum*, V. d. Bosch, *Hymen.?*

Filix radicans, stipite recto; frondibus approximatis, sessilibus; frondulis basilaribus sæpe flabelliformibus.

ICON.: *Tab. LXVIII, fig. 1* (*pinnatum*) *et fig. 2* (*bipinnatum*).

(Longueur des frondes, 20-22 centim.; des frondules secondaires, 3 centim.)

Les frondules de cette espèce, quelquefois allongées, étroites, très-souples et pendantes, naissent sur un stipe assez raide, s'attachant aux écorces dans toute son étendue; il est arrondi, lisse et glabre en dessus. On pourrait, sans inconvénient, ainsi que la plupart des espèces radicantes, le regarder comme un rachis, sur lequel s'attacheraient des frondules alternes; il existe une telle corrélation entre le support (le rhizome) et les frondes, toujours espacées de même et régulièrement alternes, qu'il semble convenable de regarder toutes ces parties comme constituant un tout harmonique. Cette fougère est d'un aspect agréable; elle fructifie volontiers. Elle a quelques rapports avec le *T. Luschnathianum*, Presl., mais dans l'espèce de cet auteur les mailles du tissu sont d'une telle ténuité, qu'elles sont à peine visibles avec une forte loupe; tandis qu'ici on peut les voir sous un très-faible grossissement. Raddi n'avait vu son *H. rupestre* que stérile; nous sommes plus heureux et pouvons avec certitude en faire un *Trichomanes*.

† 30. LÆTE VIRENS, F.

Frondibus stipitatis, lanceolatis, bipinnatis, glabris, debilibus; rachi alato; rhizomate flexuoso, cylindrico, fusco; frondulis primariis lanceolatis, assurgentibus; segmentis apice integris linearibusque; pyxidulis lateralibus, ore aperto; columellis longis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 1677).

Filix venusta, lanceolata, siccitate colorem viridem servans.

ICON. : *Tab. LXVII, fig. 2.*

(Longueur des frondes, 32-35 centim., avec un pétiole de 1,5 centim.; les frondules secondaires ne dépassent guère 5 centim.; elles sont chargées de segments linéaires relativement assez longs.)

Cette espèce est très-élégante; les frondes sont plus étroites et plus régulières que dans la plupart des *Trichomanes* radicants; les pyxidules sont sessiles à l'aisselle d'un segment allongé avec une columelle qui le dépasse beaucoup. Dans les spécimens jeunes manque la columelle, dont l'élongation serait postérieure à la formation de la pyxidule.

87. DIDYMOGLOSSUM, Presl., *Hymenoph.*, p. 22, t. 8, f. A.

1. PUMILUM, V. d. Bosch, *Hymen.*, p. 40. *Trichomanes pumilum*, Sw., *Syn.*, p. 142. *Hemiphlebium pusillum*, Pr., *l. c.*, p. 25, t. 9. Brésil (*teste* V. d. Bosch).

2. NUMMULARIUM, V. d. Bosch, *Hymen. supp.*, p. 52. Brésil septentr., à Barra, près Rio-Negro, par Spruce.

† 3. QUERCIFOLIUM, Hook. et Grev., *Icon.*, n° 115, *sub trichomanoide. Trich. montanum, ejusd. Icon. plant.*, t. 187. *Didymoglossum*, Presl., *l. c.*

Frondibus glabris, inæqualibus, pinnatifidis; petiolo brevi, nigrescente, tomentoso; surculo longo, repente, filiformi, nigro, tomentoso; nervillis secundariis tenuissimis, liberis, leviter flexuosis, a margine mesonevroque sæpe remotis, centro laminarum nascentibus; pyxidulis terminalibus aut axillaribus, bilabiatis, elongatis, columella vix exserta.

Habitat in Brasilia fluminensi (Serra os Orgaos, n° 3352, Glaziou, juin 1869).

Filix cæspitosa, frondulis pinnatifidis, segmentis irregularibus.

ICON. : *Tab. LXXI, fig. 1. Nervatio aucta.*

(Dimensions : longueur, 4 à 5 centim., avec des segments dont les plus longs mesurent 9-10 millim.)

Cette espèce, trouvée pour la première fois à Esmeraldas, à plus de 2,800 mètres d'altitude, par Jameson, croît en touffes; les rhizomes, très-déliés et très-longs, sont couverts d'un épais tomentum, sur lequel naissent les frondes espacées les unes des autres, très-vertes, pinnatifides et remarquables par des segments très-inégaux; le sommet s'allonge en pointe obtuse. Elle a, par la nervation, tous les caractères des *Microgonium*, dont elle est la plus grande forme, et c'est pour en justifier que nous la figurons.

II. HYMÉNOPHYLLÉES.

88. LEPTOCIONIUM, Presl., *Hymenoph.*, p. 26, t. 11, f. D.

1. FUCOIDES, Presl., *l. c.*, Sw., *Fl. Ind. occid.*, p. 1747, et *Syn. filic.*, p. 146. *Trichomanes fucoides*, Hedw., *Fil. cum icone.* Serra os Orgaos, Gardner, n° 5951. — Presl ne rattache cette espèce au genre *Leptocionium* qu'avec doute.

2. ATTENUATUM, Hook., *Sp. filic.*, I, 99, t. 36 A. Brésil, Gardner. (N. V.)

89. HYMENOPHYLLUM, *Smith. et auct. emendatorum.*

* EUHYMENOPHYLLUM.

1. STURMII, V. d. Bosch, *Hymen. nov.*, p. 68. *H. polyanthos*, Sturm., *in Fl. Bras.*, Mart., 23, p. 288, *non* Sw. Rio-Janeiro et Serra os Orgaos, Gaudichaud, Vauthier, Beyrich, etc. — Frondes lancéolées ou ovales lancéolées, tripinnatifides, glabres; pyxidules arrondies, à lobes égaux arrondis, réceptacle filiforme, inclus; rhizome relativement assez gros. — Longueur, 8 centim. sur 3-4 de largeur.

2. ASPLENIOIDES, Sw., *Syn. filic.*, p. 145; Hedw., *Filic. cum icone;* Lmrk., *Illustr.*, t. 8, f. 1; Willd., *Filic.*, p. 516; V. d. Bosch, *Hymen.*, p. 46. Rio-Janeiro, Glaziou, n° 2259.

   Var. β *palmatum*, Klotz., *Herb. Berol.* et *in* H. Hook. Glaziou, n° 2258. — Frondes pinnées pinnatifides, très-glabres, segments inégaux, monocarpiques; pyxidules arrondies; pétiole sétacé; rachis nigrescent; elle est notablement dilatée au sommet. Cette forme se rapproche de l'*H. macrocarpon*, F., et Schaffn., *Catal. foug.* Brésil, p. 39.

   ICON. : *Tab. LXX, fig. 2.*

3. MEGACHILUM, Presl., *Epim. bot.*, p. 22, t. 8 B; V. d. Bosch, *Hymen.*, p. 62, Brésil, Serra os Orgaos, Gardner, n° 212. Valves de la pyxidule très-développées. Petite espèce ayant quelque analogie avec l'*H. Thunbridgense*, Sm. — Fronde bipinnée à segments étroitement linéaires; valves des pyxidules profondément bifides; réceptacle cylindrique. (N. V.)

4. PUSILLUM, Schott., *apud* Sturm, *Fl. Bras.*, 24, p. 289. Brésil, Sellow, Vauthier, Beyrich, etc., à San-Gabriel, Rio-Negro, Spruce, n° 2161.

5. ACULEOLATUM, V. d. Bosch, *Hym. nov.*, p. 95. Brésil septentr., près de Panouri, Rio-Kaupis, Spruce, n° 2974. — Frondes pinnatifides; 2-3 centim. de longueur sur 12-16 millim. de largeur; pyxidules à valves bilobées garnies de poils raides, imitant de petites épines. (N. V.)

6. HIRSUTUM, Sw., *Syn. filic.*, p. 146; Radd., *Filic. Bras.*, p. 19, t. 79, f. 3; Hook. et Grev., *Icon.*, n° 84; *H. venustum*, Desv., *Ann. Soc. Linn. Par.*, VI, p. 332. *H. lanatum.* F., *Hist. foug. Antill.*, p. 116, t. 31, f. 3. Glaziou, Rio-Janeiro, n° 2265, et Serra do Couto, n° 3180 (1869). — Les frondes sont très-régulièrement pinnatifides; elles peuvent atteindre jusqu'à 15 ou 16 centim. Les segments linéaires, dressés, obtus et laineux, sont portés sur un rhizome filiforme. Toute la plante est couverte de longs poils étoilés.

7. WILSONI, Hook., *in Brit. Flor. in E. Bot. supp.*, t. 2686. Glaziou, Rio-Janeiro, n° 2264. — Cette espèce, dont l'aire de développement est très-étendue (Cap, Chili, Angleterre, Bourbon), est regardée comme une simple variété de l'*H. Thunbridgense*, Sm., par Kunze. Le spécimen du Brésil est denticulé comme le type, mais d'une manière moins marquée. C'est une petite espèce à rhizome filiforme rampant.

† 8. NOTABILE, F.

Frondibus oblongis, tripinnatis, glabris, intense viridibus, cauda terminatis; petiolo longo, tenui; rachi alato; frondulis primariis lanceolatis, caudatis, sessilibus; segmentis linearibus, obtusis; areolis telæ cellulariæ ovoideis parvulisque; nervillis atris, crassiusculis, marginem non attingentibus; sporotheciis ovoideis, valvis integris, glabris; sporangiis crassis, polypodioideis; annulo 30 articulato, secedente; sporis subrotundis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n°s 1714 et 2271).

Filix elastica, satis magna, siccitate viridissima; frondulis primariis approximatis, sæpe imbricantibus; rhizomate longissimo, recto, tomentoso ramosoque.

Icon.: *Tab. LXIX, fig. 2.*

(Longueur des frondules, 25-30 centim., dont le pétiole fait environ les deux cinquièmes; les frondules primaires mesurent 5-6 centim. Le rhizome, à peine flexueux, atteint la grosseur d'une très-petite ficelle; il est fort long. Les frondes y naissent très-écartées les unes des autres.)

Cette espèce est élégante; elle se rapproche de l'*H. Organense,* Hook., qui a une souche et non pas un rhizome; les valves des sporothèces ne sont ni dentées, ni ciliées; leur tissu est constitué par des mailles allongées assez épaisses. Le nombre des articulations de l'anneau est considérable, 30 au moins; il se sépare facilement du sacculus et ne semble pas différer alors de l'anneau des Polypodiées. Le sommet du pétiole est ailé. Le rachis et ses subdivisions sont légèrement poilus. Lorsqu'on interpose la fronde entre l'œil et la lumière, on voit qu'elle a une apparence perforée; ces points, assez nombreux, ne sont autre chose que les sinus arrondis que forment les segments en s'imbriquant les uns sur les autres. Cette particularité rend très-facile la diagnose.

9. angustum, V. d. Bosch, *Hymen.*, p. 99. San-Gabriel de Cachoeiras, Spruce, Brésil septentr. — Frondes linéaires, pinnatifides, à segments divergents et rapprochés, parfois dichotomes et tendant à devenir bipinnatifides; poils stipités, bifurqués, en étoile; petites pyxidules terminales urcéolées; rhizome sétacé, rampant, rameux. Longueur des frondes, 6-10 centim. sur 9-11 millim. de largeur.

10. elegans, Spreng., *Syst. veget.*, IV, 133. *H. trifidum,* Hook. et Gr., *Icon.*, n° 196, *ab errore, in Spec. filic.*, I, p. 91, *sub nomine H. bifidi.* Brésil, Sellow, Langsdorff. — Frondes très-délicates, pinnées, à frondules sessiles divisées en 3-5 segments, portant de longs poils; pyxidules petites, longuement poilues. (N. V.)

11. Organense, Hook., *Spec. filic.*, I, 90, t. 32 B; *H. Beyrichianum,* Kze., *Linn.*, IX, p. 108. Brésil, Gardner, n° 210; Beyrich. — Grande fronde pinnatifide, à segments linéaires, obtus, dentés, souvent légèrement ciliés; valves de la pyxidule très-ouvertes, oblongues, denticulées-ciliées.

† 12. viridissimum, F.

Frondibus lanceolatis, glaberrimis, propemodum bipinnatifidis, petiolo longiusculo, capilliformi, segmentis alternis, oblongis, obtusis, bifidis, sinuatis,

areolis telæ cellulariæ atomariis; nervillis paucis, atris; pyxidulis terminalibus orbiculatis; valvis rotundatis, calvis; receptaculo brevissimo.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n°s 1718 et 2050).

Filix siccitate viridissima, repens; rhizomate capilliformi, repente; frondibus bipinnatis, segmentis undulatis.

Icon. : *Tab. XLIX, fig. 3.*

(Longueur des frondules, 7-8 centim. sur 2 centim. d'envergure.)

Cette espèce ressemble, par le port, au *Leptocionium fucoides*, Presl., avec des proportions plus petites; le rhizome est rampant, filiforme et se charge de frondes espacées, portées sur des pétioles aussi déliés que le rhizome; ces frondes, très-élargies au centre, se terminent insensiblement par de petites frondules rudimentaires. Les sporothèces occupent le sommet des segments, presque toujours deux par deux; les valves sont arrondies et s'ouvrent jusqu'à la base pour mettre les sporanges en liberté; celles-ci ont un anneau qui diffère bien peu de celui des polypodiées; il porte une vingtaine d'articulations avec des spores obscurément trigones et opaques. La plante a un aspect légèrement crépu.

13. Jalappense, Schlecht., *Linn.*, t. 5, p. 619. Brésil, Claussen, Rio-Janeiro, Glaziou, n° 2261. — Frondes presque tripinnatifides ou même tripinnées; derniers segments bifides, obtus; pyxidules terminales; valves arrondies, presque entières; les frondes noircissent par la dessiccation. Longueur, 11-13 centim.

14. polyanthos, Sw., *Syn. filic.*, p. 149; Willd., *Filic.*, p. 131. Hedw., *Filic. cum icone.* Rio-Janeiro, Glaziou, n° 2262. — Frondes bipinnées, à frondules pinnatifides, rachis ailé, ainsi que le pétiole. Elle est très-confuse dans les herbiers.

15. crispum, H. B. et Kth., *Nov. gener. Amer.*, I, 90. Glaziou, Serra os Orgaos, n°s 3347 et 3348? — Frondes bipinnées, linéaires, à segments étroits; rachis ondulés, ailés, crépus; elles naissent écartées sur un stipe filiforme. La description donnée par les auteurs la présente comme glabre, tandis que dans notre spécimen elle porte çà et là d'assez longs poils extrêmement déliés; nous en faisons une variété β *Brasiliana*, que nous croyons utile de figurer. Icon. : *Tab. LXXI, fig. 2.*

16. Boryanum, Willd., *Filic.*, p. 518; Hook., *Spec. filic.*, I, p. 89, t. 31 *c*. Rio-Janeiro, Glaziou, n° 2266. — Frondes bipinnées, à segments linéaires fine-

ment denticulés à la marge, couvertes dans toutes leurs parties et sur le rachis, qui est ailé, de poils étoilés; les pyxidules sont petites, terminales, arrondies. Nervilles noirâtres; rhizome filiforme, couvert de poils roux. Longueur, 12-14 centim. sur 2-3 d'envergure. — La figure citée du spécimen de M. Hooker se rapporte très-parfaitement à cette espèce.

† 17. PODOCARPON, F.

Frondibus bipinnatifidis, in ambitu lanceolatis, petiolatis; petiolo glabriusculo, nudo; frondulis secundariis remotis, segmentis linearibus, brevissime argute serrulatis, apice emarginatis; surculo longo, repente, filiformi; pyxidulis crassis, obovatis, axillaribus, pedunculatis, valvis amplis, denticulatis; columella brevi, raro exserta.

Habitat in Brasilia fluminensi (Serra os Orgaos, Glaziou, n° 3350, juin 1869).

ICON. : *Tab. LXXI, fig. 3.*

Filix subrigida, repens, pyxidulis pedicellatis notata.

(Dimensions : longueur, 13-15 centim. Les plus grandes frondules mesurent 2 centim. Le pétiole est aux lames : : 1 : 4.)

Nous avons des rhizomes qui s'étendent à plus de 60 centim. ; ils portent de très-courtes radicelles. Les frondes ont un aspect maigre et toutes les partitions sont écartées les unes des autres. On la reconnaîtra facilement à ses pyxidules pédonculées et fort grosses; les rachis sont étroitement ailés, mais le pétiole est nu. Ce *Trichomanes* est voisin par le port de l'*Hymenophyllum macrothecium*, F., *Foug. Antilles*, p. 115, t. 31, f. 2, à segments entiers et à sporothèces terminaux presque en grappe et qui rentre peut-être dans ce genre.

† 18. PRODUCENS, F.

Frondibus bipinnatis, ovoideis glaberrimis, longe repente; rachi alato, segmentis ultimis linearibus, in cauda terminatis; pyxidulis subrotundis, marginibus integerrimis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Serra os Orgaos, Glaziou, n° 3349).

Filix parva, segmentis linearibus, ultimis extensis.

ICON. : *Tab. LXXI, fig. 4.*

(Longueur : frondes, 8-9 centim. Les plus grandes frondules latérales mesurent 12-14 millim.)

Cette espèce, qui ne se rattache à aucune autre, est remarquable par les segments terminaux prolongés en une longue pointe linéaire stérile. Il serait utile de la revoir.

** SPHÆROCIONIUM (Presl., *Hym.*, p. 33).

19. CAUDICULATUM, Mart., *Icon. crypt. Bras.*, p. 102, t. 67. Martius; Sellow, Os Orgaos, Gardner, n° 211. Glaziou, Rio-Janeiro, n°s 1213 et 2260. — Belle espèce, très-distincte.

Var. β *productum*, Presl., *Hymen.*, p. 61, *sub sphærocionio.* Glaziou, Rio-Janeiro, n° 921.

20. PLUMOSUM, Klfss., *Enum. filic.*, p. 267, *sub hymenophyllo. Sphærocionium aureum*, Presl., *Hymen.*, p. 34 et 57. Brésil. — Frondes tomenteuses sur les deux faces, à frondules imbriquées, lancéolées, dentées.

21. LINEARE, Sw., *Fl. Ind. occid.*, III, p. 1749, *sub hymenophyllo. H. elegans*, Spreng., *Syst.*, IV, p. 133.

Var. *Brasiliense.* Frondes pendantes ciliées, à frondules linéaires et à rachis nu. Brésil, Serra os Orgaos, Glaziou, n°s 1712 et 2263.

22. REMOTUM, V. d. Bosch, *Hymen.*, p. 73, *sub hymenophyllo. H. ciliatum*, H. et Gr., *Icon.*, n° 35, *non* Sw., *Sphærocionium Grevilleanum*, Presl., *Hymen.*, p. 34. Brésil, Sellow; Langsdorff.

23. SURINAMENSE, V. d. Bosch, *Hymen.*, p. 74, *sub hymenophyllo. Sphærocionium ciliatum*, Presl., *Hymen.*, p. 34. Brésil (*teste* V. d. Bosch).

24. COMMUTATUM, Presl., *Hymen.*, p. 34. *Hymenophyllum Boryanum*, Radd., *Fil. Bras.*, p. 66, t. 79, f. 4, *non* Willd. — Frondes bipinnées, les frondules inférieures plus petites, les segments linéaires, obtus; poils étoilés pédicellés. Longueur, 10 centim., avec des frondules de 2-3 centim.

† 25. CAULOPTERON, F.

Frondibus oblongis, bipinnatis; petiolo ferrugineo, alato, rachi pilis stellatis vestito; rhizomate filiformi, repente; sporotheciis valvis ovoideis, ciliatis; parenchymate valvarum e cellulis hexagonoideis, latis constructo; sporis subtrigonis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 1713; Serra da Estrella, n° 920. Rio-Janeiro, forme plus petite, n°s 2269 et 2270).

Filix copiose fructificans; nervillis nigrescentibus, marginem non attingentibus, pilis bi-trifurcatis onustis.

ICON.: *Tab. LXX, fig. 3.*

(Longueur des frondes, 20-24 centim.; frondules primaires, 5 centim. Le pétiole mesure en moyenne 6 centim.)

Cette espèce fructifie assez volontiers; le pétiole, le rachis et ses subdivisions sont roussâtres et, ainsi que les nervilles, couverts de poils pédicellés, bifurqués ou trifurqués au sommet. Les sporothèces occupent l'extrémité de tous les segments supérieurs de la fronde; ces segments sont assez courts, étroits et obtus. Les mailles du tissu sont ovoïdes, extrêmement petites, tandis que celles des valves sont, au contraire, très-grandes et hexagonales, circonstance qui démontre leur indépendance organique. Les dimensions de cette espèce sont assez variables.

† 26. RUFUM, F.

Frondibus tripinnatis, oblongis, pilis rufis, stellatis toto vestitis; rachibus flexuosis; frondulis primariis oblongis, brevissime petiolatis, secundariis ovatis, aliquando pinnatis; segmentis linearibus, approximatis, obtusis; sporotheciis satis parvis, rotundis, pilosissimis; sporis crassis, fuscis, triedricis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2467).

Filix rufa, subtripinnata, tota villoso-tomentosa, rhizomate repente, flexuoso, penicellos pilosos globosos ferente.

ICON.: *Tab. LXX, fig. 4.*

(Longueur, 30 centim.; frondules, 7 centim. sur 9-11 millim. de largeur; pétiole, 8-9 centim.)

Cette espèce est fort belle et nettement caractérisée par les poils roux qui en recouvrent toutes les parties, le rhizome même compris; les frondules inférieures sont de moindre dimension que les autres; les frondules primaires diffèrent entre elles de grandeur et de composition: les unes simplement pinnées, les autres bipinnées; elle se rapproche, par la vestiture, des *Sphærocionium sericeum* et *pulchellum*. Les frondes sont dressées.

III. GLEICHÉNIACÉES.

90. MERTENSIA, Willd., *Act. Holm.*, 1864, p. 165.

* *Segments inférieurs glabres.*

1. PECTINATA, Willd., *Filic.*, p. 73; Langsd. et Fisch., *Icon. filic.*, p. 26, t. 30 (*junior*). *Gleichenia glaucescens*, H. B. et Kth., *Nov. genera*, I, 29. *M. Bra-*

siliana, Desv., *Berol. Mag.*, V, p. 329. *Herb. Bras.*, Mart., 359; Miers, 50*; Blanchet, à la Jacobine; Claussen, Glaziou, Rio-Janeiro, nos 367, 1694 et 2278; Sainte-Catherine, H. Gauthier. — La synonymie de cette plante est inextricable. Elle varie par des frondules plus ou moins glaucescentes et plus ou moins courbes, à sporothèces plus ou moins rapprochés et plus ou moins nombreux. Il existe des spécimens à frondules droites ou arquées; celles-ci s'écartent du rachis presque à angle droit. Elle dépasse en hauteur 1 mètre 25 centim., avec un pétiole assez grêle, rougeâtre, qui mesure 90 centim. dans l'un de nos spécimens.

2. DICHOTOMA, Willd., *Fil.*, p. 71. *M. flexuosa*, Mart., *Icon. crypt. Bras.*, p. 108, t. 60, f. 1, et *M. pumila, ejusd., l. c.*, p. 111, t. 60, f. 2. *Gleichenia Hermanni*, Hook. et Grev., *Icon.*, n° 14. Brésil, Claussen; Martius, dist. des Diamants. — La synonymie de cette espèce est tellement confuse, que nous n'osons la donner ici. Elle réunit des plantes absolument distinctes, par exemple le *Gleichenia flabellata*, de Labillardière, fougère de la Nouvelle-Calédonie; le *Mertensia discolor*, de Martius, etc.; plusieurs autres rapprochements sont tout aussi hasardés. Le type de cette belle espèce appartient à la Flore de Ceylan, à celle de Bourbon et de l'île de France; peut-être les spécimens qui proviennent de ces diverses localités ne sont-ils pas identiques.

3. RUBESCENS, Mart., *in Schedula* (H. F.). Brésil, sans autre indication. — Fronde dichotome, très-glauque; bourgeon axillaire stationnaire; rachis et ses subdivisions roussâtres; sporothèces petits, limités, 12-15 par rangée, se développant sur toute la longueur du segment fructifère, entre le mésonèvre et la marge; nervilles très-nombreuses, très-serrées, visibles seulement à la loupe.

† 4. SCALPTURATA, F.

Frondibus longe petiolatis, glaberrimis; petiolo rotundo, roseo, lævi; frondulis bifurcatis, lanceolatis, sessilibus, pectinatis, apice decrescentibus; in dichotomia gemmam sessilem foliaceam ferentibus; frondulis duabus oppositis, horizontalibus, minoribus ad basim bifurcationum extensis; segmentis integerrimis, obtusis, inferioribus reflexis, longioribus, lobatis, aliquando pinnatifidis; mesonevro plano; nervillis tenuibus; sporotheciis centralibus.

Habitat in Brasilia fluminensi (Claussen, n° 102 *a* [*Herb. F.*]; Glaziou, nos 364 et 1695).

Filix rigida, crassa, glaberrima; nervillis scalpturatis, subtus leviter glaucescens; gemma aliquando evoluta.

ICON. : *Tab. LXXII, fig. 1.*

(Longueur, 70 centim.; frondules, 16-20 centim. sur 4 centim. d'envergure. Le rhizome est horizontal, un peu flexueux et rougeâtre.)

Le caractère qui distingue cette espèce est de porter à la base de toutes les bifurcations deux frondules horizontales, faisant office de bractées; elle a une grande fermeté et des nervilles en relief; elles se rendent à un mésonèvre aplati, assez large, qui n'atteint pas le sommet du segment. Elle se rapproche du *M. spissa*, F.

5. FURCATA, Willd., *Fil.*, p. 71, Sw., *Syn. filic.*, p. 163. *Acrostichum furcatum*, L., *Sp. pl.*, p. 1529. Plum., *Filic.*, p. 22, t. 28. Martius, Minas-Geraes, Goyaz. — Sporanges ataxiques; segments pénicellés; un bourgeon à chaque bifurcation; grande espèce écailleuse, mais non velue.

6. REMOTA, Klfss., *Enum. filic.*, p. 39; Spreng., *Syst. veg.*, IV, 27, *sub Gleichenia; G. tenuis;* Hook., *Sp. filic.*, I, p. 13. Rio-Janeiro, Gaudichaud, n° 142. — Frondes dichotomes, rameuses, avec un bourgeon axillaire qui se développe en frondules; celles-ci sont géminées, allongées, linéaires, avec des paléoles ciliées.

7. RUFINERVIS, Mart., *Crypt. Brasil.*, p. 111. *Gleichenia rufinervis*, Kl., *Linn.*, XVIII, p. 538. *G. Klotzschii*, Hook., *Sp. filic.*, I, p. 13, t. 5 B (*fide* Kl.). Minas-Geraes, Freyreiss. — Pinnules abondamment chargées au centre d'un tomentum formé de poils roussâtres que l'on retrouve sur d'autres espèces.

8. REVOLUTA, H. B. Kth., *Nov. gen.*, I, p. 29. *M. pruinosa*, Mart., *Icon. Crypt. Bras.*, p. 109. Brésil, Claussen, n° 90; Minas-Geraes, Saint-Hilaire, Cat. B', n° 272; Regnell, II, 326 ¼. — Frondes petites, quatre fois dichotomes, frondules linéaires, glauques en dessous, à segments oblongs; le pétiole est très-long, délié; le rhizome atteint la grosseur d'une plume de pigeon.

† 9. SPISSA, F.

Frondibus glaberrimis, bifurcatis, pectinatis, siccitate flavescentibus, spissis, opacis, gemma centrali non evoluta, basi pilis rufis vestita, nervillis rima lineari indicatis, scalpturatis; frondulis lanceolatis, sessilibus, apice caudatis; segmentis lanceolato-linearibus, obtusiusculis, ultimis deflexis, mar-

gine revolutis; sporotheciis centralibus, 24-28 per seriem, mesonevro aliquando lana rufa vestito.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2468).

Filix rigida, glaberrima, magna, crassissima, repetito-dichotoma.

Icon. : *Tab. LXXIII, fig. 2.*

(Dimensions : frondules, 20 centim. jusqu'à la naissance de la dichotomie, sur 5 à 6 centim. d'envergure; le pétiole de la bifurcation mesure 4-5 centim.)

Cette belle espèce est cartilagineuse, jaune par dessiccation; on trouve souvent, à la base de la dichotomie, une bractée linéaire, obtuse et crénelée; elle est légèrement glauque en dessous; les nervilles, très-rapprochées les unes des autres, déterminent sur la lame inférieure de très-petits sillons linéaires, qui lui donnent un aspect ciselé.

† 10. TRIFURCANS, F.

Frondibus trifurcatis, glabris; petiolo robusto, cylindrico, squamoso, squamis appressis; gemmis omnibus evolutis; frondulis lanceolatis, pectinatis, apice caudatis, decurrentibus; segmentis linearibus, patulis, margine leviter revolutis, apice retusis, basi dilatatis; nervillis tenuibus, oculo armato tantum perspicuis; sporotheciis centralibus.

Habitat in Brasilia fluminensi, circa Tijuca (Glaziou, n° 1697).

Filix rigida, trifurcata, gemmis omnibus evolutis.

Icon. : *Tab. LXXIV, fig. 1.*

(Longueur des frondes, 42-46 centim.; des frondules, 18-20 centim. sur 4 d'envergure; le pétiole mesure 12 centim. Le rhizome atteint la grosseur d'une petite plume d'oie.)

Le *M. trifurcans* est caractérisé par la rigidité de ses frondes, dressées et très-rapprochées les unes des autres, particularité qui lui vaudrait, si les dimensions étaient plus considérables, l'épithète de *scoparia;* les bifurcations, dont il existe 3-4 étages, sont très-rapprochées les unes des autres. Tous les bourgeons fournissent leur évolution.

** *Segments tomenteux inférieurement.*

11. NERVOSA, Klfss., *Enum. filic.*, p. 37; Hook., *Spec. filic.*, I, p. 12, t. 5 A, *sub Gleichenia.* Sainte-Catherine, Chamisso et Sellow. Serra os Orgaos, Glaziou, n°s 1752, 2280 et 2827. — Espèce bifurquée, quelquefois simple, s'élevant à 40 ou 48 centim., avec des segments de 4-6 centim. Le pétiole fait la moitié de la longueur totale de la plante; elle est en dessous couverte d'un épais

tomentum d'une très-belle couleur de kermès. Lorsque les frondes sont à l'état complet de développement, les segments roulés sur eux-mêmes donnent à la plante un aspect très-remarquable. Elle ne mérite pas plus, et peut-être moins que d'autres espèces, de porter le nom de *nervosa*.

12. LANUGINOSA, Moric., *in Herb. Candolleano.* Blanchet, Bahia, n° 3706. Claussen, à Carapa, n° 88. Ponte-Acto, Saint-Hilaire, B', n° 273, sous le nom de *Gleichenia ramosissima.* — Petite espèce, très-abondamment couverte en dessous d'un tomentum laineux, entourant les sporanges sans toutefois les cacher; elle est quatre fois dichotome, à rameaux serrés; le bourgeon situé au fond de la principale bifurcation se développe souvent en fronde; les frondules sont linéaires, à segments nombreux, étroits; ils se terminent par une petite pointe chargée de poils; cette espèce prend une teinte rouge-ferrugineuse après dessiccation.

13. RIGIDA, J. Sm., *Enum. Fil. Philipp. in Hook. Journ. of bot.*, IV, p. 420. Brésil, Claussen, n° 102 B; Glaziou, Rio-Janeiro, n° 169 *c.* — Espèce raide, dressée; frondules rapprochées, segments entiers, rachis laineux. Le nom de *scoparia* lui eût été convenablement appliqué. Elle s'éloigne, par le port, de toutes les espèces brésiliennes connues pour se rapprocher de la *M. flabellata*, R. Br., *Prod. Fl. Nov. Holland.*, p. 161. MM. Hooker et Th. Moore la rattachent, comme variété, à la *M. dichotoma*, rapprochement qui ne nous semble pas heureux.

14. PUBESCENS, H. et B., *in* Willd., *Filic.*, p. 73. *Mertensia decurrens*, Radd., *Fil. Bras.*, p. 78, t. 7. *Gleichenia immersa*, Hook. et Gr., *Icon.*, n° 15. Gaudichaud, Rio-Janeiro, n° 142, et Glaziou, n°s 365, 366 et 923, Sud du Brésil, Gardner, n° 29. — La synonymie de cette plante est extrêmement chargée. Le tomentum est ferrugineux.

† 15. SQUAMOSA, F.

Frondulis extensis, lanceolatis, arcte geminis, acutis, basi decrescentibus, rachi, gemma et mesonevris squamis rufis obsitis, segmentis linearibus, obtusis, mucronatis; sporotheciis intermediis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2279).

Filix magna, squamosa, pectinata, rigida, opaca.

ICON : *Tab. LXXII, fig. 2.*

(Longueur des frondules, 40 centim. sur 5 centim. d'envergure; nous comptons plus de 100 paires de frondules.)

Nous ne possédons pas cette plante entière; les frondules sont bifurquées et pétiolées; le bourgeon axillaire est très-gros et très-écailleux; les écailles du rachis sont étroites et longuement acuminées; aucune espèce n'a d'aussi longues frondules.

16. BIFIDA, Spreng., *Syst. veg.*, IV, p. 27, *sub Gleichenia*, Willd., *Act. Holm.*, 1804, 168, t. 5, f. B. Brack., Rio-Janeiro; Schott (H. F.); Glaziou, n° 1693. — Lames inférieures très-velues, ainsi que les rachis; sporothèces adossés au mésonèvre, au nombre de 10-12; frondules et segments portant au sommet un pénicille de poils; frondules bifides, dichotomes; pétioles lisses, arrondis, d'un vert livide.

17. LONGIPINNATA, Kl., *Linn.*, XVIII, p. 537, et XXI, p. 203. *Gleichenia*, Hook., *Spec. filic.*, I, p. 9. Sud du Brésil (Th. Moore, *Ind.*). — Frondes inférieures villeuses.

18. GRACILIS, Mart., *Icon. crypt. Bras.*, p. 107, t. 59, f. 2. *Gleichenia*, Th. Moore, *Ind.*, p. 378. Brésil, Martius. — Les frondes sont paléacées.

† 19. LATISSIMA, F.

Frondibus longe petiolatis; frondulis sessilibus, pinnatifidis, abrupte terminatis, ovoideis; gemma foliacea, latente; segmentis linearibus, approximatis, obtusis; basi dilatata, subcordata; rachi supra squamuloso, subtus nudo; lamina inferiori, lana rufa, spissa vestita; sporotheciis immersis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Serra os Orgaos, Glaziou, n°s 1751, 2825 et 2826; Serra do Couto, n°s 3173 et 3174; ce dernier numéro à segments moins longs) [1869].

Filix magna, rhizomate parvulo, repente, villoso; segmentis lana rufa, spissa, perfacile soluta coopertis.

ICON. : *Tab. LXXIII, fig. 1.*

(Longueur des pinnules, 28-32 centim. Les segments atteignent jusqu'à 7 centim. de longueur sur 3 millim. de largeur; nous en comptons plus d'une soixantaine.)

Cette espèce est nettement caractérisée par la longueur des segments pinnulaires, de beaucoup les plus longs de toutes ses congénères; ils sont presque cordiformes à la base et horizontaux avec une marge un peu roulée par dessiccation.

Les frondes se terminent brusquement en une pointe ondulée à la base et entière vers le haut. Le rhizome est horizontal et couvert de poils roux, très-courts; le n° 2825 a le tomentum laineux grisâtre, circonstance sans doute accidentelle.

20. PENNIGERA, Mart., *Icon. crypt. Bras.*, p. 106, t. 59, f. 1. Minas-Geraes, Martius, *l. c.* — Pétiole anguleux vers le haut; fronde plusieurs fois dichotome; pubescente, légèrement velue sur la lame supérieure; rachis couverts de squames ciliées, pinnatifides; sporanges groupées par 3 ou 4.

β *lanuginosa,* Th. Moor., *Ind.; M. pedalis,* J. Sm., *in Lond. Journ. bot.*, I, 202. Claussen, n° 88. (H. F.)

NB. Toutes les fougères qui appartiennent à cette famille sont exotiques. Les espèces américaines, genre *Mertensia,* ont une même physionomie; les espèces de la Nouvelle-Hollande et des îles de la mer du Sud, genre *Gleichenia,* ont un aspect tout différent. On n'a nulle peine à reconnaître la famille; il n'en est pas ainsi des espèces dont la diagnose est des plus difficiles et la synonymie très-confuse. Elles sont vigoureuses, raides, de grande taille et presque toujours dichotomes. Nous en comptons 20 au Brésil, 11 au Mexique et 8 seulement aux Antilles; du reste, cette famille est numériquement assez restreinte.

IV. SCHIZÉACÉES.

I. Euschizéacées.

91. ACTINOSTACHYS, Wallich., Presl., *Supp. pteridogr.*, p. 72.

1. PENNULA, Hook., *Gen. filic.*, t. 111 A. *Schizæa Pennula,* Sw., *Syn. fil.,* 150 et 379. *S. penicillata,* H. et Bonpl., *in* Willd., *Fil.*, 86. *S. trilateralis,* Schkh., *Filic. Bras.*, p. 137, t. 136. Hook. et Grev., *Icon. filic.,* n° 54. Brésil, Pœppig; Rio-Janeiro, Sellow. Martius, *Herb. Bras.*, n° 190. — Fronde très-simple, nue, raide, filiforme; stipe triangulaire, épis dressés, subulés, au nombre de 5 à 8; les frondes sont fasciculées sur une assez grosse souche. Il n'y a d'autre lame que les épis fructifères, qui sont au stipe : : 1 : 12 ou 14.

2. SUBTRIJUGA, Presl., *l. c.*, p. 117. *Schizæa subtrijuga,* Mart., *Icon. pl. Brasil.*, p. 117. Martius, à Japura. — Frondes très-simples, linéaires, planes, stipe semi-cylindrique; épis, 3 environ.

92. SCHIZÆA, Smith., Presl., *Supp. pterid.*, p. 73.

1. BIFIDA, Sw., *Syn. filic.*, p. 151. Var. β *incurvata*, Presl., *l. c.*, p. 75. *Schizæa incurvata*, Schkh., *Filic.*, p. 138, t. 137. Collares (*teste* Presl.). — Stipe triangulaire, délié, glabre, un peu rude au toucher, épis unilatéraux en panicule, raide et dressée, en nombre considérable; les frondes naissent fasciculées sur une souche fibrilleuse.

93. LOPHIDIUM, Rich., *Act. Soc. Hist. nat. Paris*, p. 112.

1. SPECTABILE, Presl., *Supp. pterid.*, 76. *Schizæa spectabilis*, Mart., *Icon. crypt. Bras.*, p. 117. Japura, Martius, *l. c.* — La fronde est étalée, entière, en éventail et cunéiforme à la base; la marge se charge d'épis flexueux assez courts.

2. PACIFICANS, Presl., *l. c.*, p. 77. *Schizæa pacificans*, Mart., *Icon. crypt. Bras.*, p. 116, t. 56, f. 1. Japura, Martius, *l. c.* — Plante très-élégante, longuement pédicellée, à lame bifide, cordiforme; sporothèces portés sur des nervures exsertes qui simulent des dents.

3. FLABELLUM, Presl., *l. c.*, p. 77. *Schizæa flabellum*, Mart., *l. c.*, p. 115, t. 55, f. 3. Japura et Rio-Negro, par Martius, *l. c.* Ile Sainte-Catherine, H. Gauthier; donnée comme rare. — Plante élégante, longuement pédicellée, à lame bifide, cunéiforme; sporothèces entremêlés de paraphyses, portés sur des nervures exsertes, qui simulent des dents.

4. ELEGANS, Presl., *l. c.*, p. 77. *Schizæa elegans*, Sw., *Syn. fil.*, p. 151; Willd., *Fil.*, p. 88. *Acrostichum elegans*, Vahl, *Symb.*, II, p. 104, t. 50. Brésil, Sellow, Itajahy, prov. de Sainte-Catherine, Gauthier. (H. F.) — Fronde nue, à segments lancéolés, bifides, avec des nervures en relief, déchiquetés au sommet; épis portés sur des prolongements de la marge, simulant de longues dents; elle atteint plus d'un demi-mètre.

II. ANEIMIACÉES.

94. ANEIMIA, Sw., *Sw. Syn.*, p. 195.

* COPTOPHYLLUM (*frondes fertiles et stériles sur le même pied, mais distinctes*).

1. MILLEFOLIUM, Gardn., *sub Coptophyllo millefolio*, *in* Hook., *Lond. Journ. bot.*, I, 133, et *in* Hook., *Icon.*, t. 478. — Goyaz, territoire de Arrayas, n° 4083;

Weddell, province de Matto-Grosso, n° 2925. (H. F.) — C'est une très-petite espèce, nettement caractérisée; multifide, à frondes fasciculées sur une petite souche dressée, mesurant 5-6 millim. au plus.

2. TRINIÆFOLIA, Gardn., *Herb. Cand.* Goyaz, Gardner, n° 4084. — Elle a le port de l'espèce précédente avec des feuilles raides dont les segments sont bifurqués; la souche, fort petite, est couverte de poils roussâtres assez longs.

3. DICHOTOMA, Gardn., *Herb. Bras.*, n° 4084. *Coptophyllum buniifolium, ejusd.* in *Journ. bot. Hook.*, I, 133. — Figurée par le même auteur *in* Hook., *Icon.*, V, t. 477. (N. V.)

** EUANEIMIACÉES (*frondes fertiles naissant à la base d'une fronde stérile*).

† 4. MICROSTACHYS, F., Brésil, entre Goyaz et Cujaba, Weddell, n° 2826. — Bahia, Blanchet, n° 959. — Petite espèce tomenteuse, pinnée à lobes ovoïdes entiers; le pétiole général est robuste, tandis que les rachis fructifères sont presque capillaires; les épis ont leurs rameaux distiques, composés, fort petits, irrégulièrement distants. Elle croît en rosette et ses radicelles forment une grosse touffe.

ICON. : *Tab. LXXIV, fig. 3.*

5. ROTUNDIFOLIA, Schrad., *Gœtt. Gel. Anz.*, 1824, p. 865, n° 8; *A. radicans*, β. Radd., *Fil. Bras.*, p. 70, t. 11; Serra do Mar, par Neuwied; Rio-Janeiro, Raddi, Sellow. — Raddi a représenté cette plante à l'état radicant, circonstance extrêmement rare dans ce genre. — Espèce très-velue, à frondules ovales, arrondies supérieurement et échancrées à la base; chaque fronde en porte une douzaine de paires.

6. HUMILIS, Sw., *Syn. filic.*, p. 156; Willd., *Fil.*, p. 90; Schkh., *Fil.*, p. 142, t. 141; *Osmunda humilis*, Cavan., *Icon.*, VI, 69, t. 592, f. 3; *Aneimia repens* (*minor*), Radd., *Fil. Bras.*, p. 71, t. 9, fig. 2 A; Brésil, Gardner, n°s 2389 et 3560; Claussen, n°s 79, 109, 195; Para, Spruce, n° 948. — C'est l'*A. pilosa*, Mart. et Gal., *Fil. Mexic.*, p. 19, t. 2, f. 1. — Frondes pinnées, frondules obovales en coin, tronquées au sommet, crénelées, villeuses en dessous. Le pétiole est hérissé d'écailles piliformes.

† 7. Glaziovi, F.

Frondibus sterilibus imparipinnatis, glaberrimis; petiolo longiusculo, depresso, canaliculato; frondulis rotundatis, oppositis, brevissime petiolulatis, marginibus denticulatis, dentibus approximatis, cartilagineis; frondulis terminalibus, petiolo longiori donatis; frondibus fertilibus binis, tri-quadripinnatis, glabris, siccitate intense ferrugineis, petiolo anguste canaliculatis. Sporothecia generis.

Habitat in Brasilia fluminensi, Bico de Papagayo (Glaziou, n° 2058), et Serra do Couto (n° 3175) [1869].

Filix robusta, glabra, nervillis approximatis, scalpturatis, surculo crasso, squamis pallide aureis, filiformibus.

Icon. : *Tab. LXXIV, fig. 2.*

(Longueur : 12 centim.; frondules, 2,3 centim. de hauteur sur 2 centim. de largeur; pétiole, 5 centim.; les frondes fertiles naissent à quelques millimètres de la base des frondules pour s'élever à 7-8 centim.)

Espèce très-distincte, qui diffère de ses congénères par des frondules opaques, assez semblables à des feuilles de nummulaire, dentées en leur pourtour. Toute la plante est glabre; la souche est arrondie et très-abondamment couverte d'écailles piliformes qui s'élèvent sur les pétioles. Les épis, d'un vert gai avant la maturité, prennent plus tard une teinte ferrugineuse très-foncée. Les nervilles sont parallèles, très-serrées et en relief.

8. oblongifolia, Sw., *Syn. fil.*, p. 156; Willd., *Filic.*, p. 90; Schkh. *Crypt. Gew.*, p. 142, t. 141; *Osmunda oblongifolia,* Cavan., *Icon.*, VI, p. 69, t. 592, f. 2; Brésil, Gardner, n° 3561; Goyaz, près de Boa, Serra Dourada, Pohl; Claussen et Blanchet à la Jacobine (H. F.). — Elle porte sur une grosse souche globuleuse plusieurs frondes, à segments pileux entiers; nervilles en relief. Les épis sont interrompus; c'est une petite espèce.

9. glareosa, Gardn., *Sert. pl.*, t. 70; *A. Gardneriana,* Presl., *Supp. pteridogr.*, p. 82; Goyaz, Gardner, n° 4086. — Fronde ovale en cœur, obtuse, pinnée, pubescente, presque tomenteuse, à frondules opposées, oblongues, rhomboïdales, très-obtuses, crénelées, décurrentes sur le rachis; épis courtement pétiolés.

10. Gardneri, Hook., *Icon. pl.*, t. 190; Brésil, Gardner, n° 4. (N. V.)

11. RUTÆFOLIA, Mart., *Icon. crypt. Bras.*, p. 112, t. 55, f. 1; Martius, Minas-Geraes et Serra do Caraça. — Frondes glabriuscules, bipinnatifides, frondules pinnatifides, à segments linéaires, les unes radicales et les autres caulinaires; épis turgides. On ne voit guère comment cette petite plante a pu mériter le nom spécifique de *rutæfolia*.

12. DELTOIDEA, Sw., *Syn. fil.*, p. 156; Willd., *Filic.*, p. 92; Schkh., *Crypt. Gew.*, p. 143, t. 142; *Osmunda deltoidea*, Cavan., *Icon.*, VI, p. 70, t. 593, f. 1. Corcovado, Pohl; Serra os Orgaos, Gardner, H., *Bras.*, 5956. — Frondes bipinnatifides, glauques, inférieurement villeuses; frondules ovales, obtuses, crénelées; le rachis est très-velu.

13. RADDIANA, Lk., *Hort. Berol.*, II, 144; *A. flexuosa*, Radd., *Filic. Bras.*, p. 71, t. 13; *syn. exclus.*, Mart., *Icon. crypt. Bras.*, III; Corcovado, Lhotsky, Schott, Mart., *Herb. Bras.*, n° 195; Gardn., n° 7; Minas-Geraes, Gardner, n°s 5340 et 5341; Glaziou, Rio-Janeiro, n°s 444, 935 et 2276; Claussen, n° 179? — Cette plante varie par une villosité plus ou moins abondante, plus ou moins roussâtre, et par des segments pinnatifides plus ou moins élargis; les épis sont géminés et très-allongés, elle peut atteindre un demi-mètre; la souche est rampante et fort grosse; elle se charge d'un très-grand nombre de frondes.

14. TOMENTOSA, Sw., *Syn. fil.*, p. 157; Willd., *Fil.*, p. 93; *A. flexuosa*, Sw. et Willd.; Radd., *Fil. Bras.*, p. 71, t. 13; *A. villosa*, Willd., p. 93; *A. ferruginea*, H. B. et Kth., *Nov. gen.*, I, p. 26; *A. villosa*, var. *Humboldtiana*, Presl., *Supp. pterid.*, p. 83; Brésil, Sellow, Bahia; Blanchet, *Herb. Bras.*, n° 3270, Claussen; Glaziou, Rio-Janeiro, n° 1228, et à Sainte-Catherine, par H. Gauthier. — Elle est assez variable dans ses formes, plutôt villeuse que tomenteuse; les segments sont ondulés, presque pinnatifides et peu nombreux; la souche est couverte d'écailles piliformes de couleur dorée.

15. CHEILANTHOIDES, Klfss., *Enum.*, p. 53; Spreng., *Syst.*, IV, p. 32. *A. villosa*, Presl., *Supp. pterid.*, p. 83, var. ε *cheilanthoides*. Sainte-Catherine, Chamisso; Brésil, Sellow. — Petite espèce villeuse, glabriuscule, à fronde ovale bipinnée, à pinnules presque sessiles et à segments arrondis; les épis sont grêles et 3 à 4 fois plus longs que les frondes.

NB. Les espèces 12, 13, 14 et 15 ont été réunies comme variétés, tantôt à l'*A. villosa*, H. et B., tantôt à l'*A. tomentosa*, Sw., *Syn.*, p. 157.

16. FULVA, Sw., *Syn. filic.*, p. 157; Willd., *Fil.*, p. 93; Schkh., *Crypt. Gew.*, p. 144, t. 142. *A. villosa*, Blanchet, *Herb. Bahia*, n° 3270; Igreja-Velha; au Corcovado, Pohl; Goyaz, Gardner, n° 3559. Une variété β *robusta*, Presl., *Supp. pterid.*, p. 84, à Engenho da Costa et Serra d'Ourada, Pohl. — Elle est pinnée-pinnatifide, abondamment villeuse dans toutes ses parties; le pétiole porte un sillon profond.

17. RADICANS, Radd., *Filic. Bras.*, p. 70, t. 10. *A. caudata*, Klfss., *Enum.*, p. 52, et une var. *evoluta*, Presl., *Supp. pterid.*, p. 86. Au Corcovado, Raddi, Pohl, Schott, Sellow; Gaudichaud, Rio-Janeiro, n° 33. Em. Picard (H. F.). Glaziou, Rio-Janeiro, n°s 441 (*specimen radicans*) et 442. — Frondes fasciculées, très-chargées de frondules, celles-ci dentées, obtuses, supérieurement gibbeuses; stipes gramineux, épis fructifères extrêmement abondants.

18. COLLINA, Radd., *Fil. Bras.*, p. 70, t. 12. *A. vellea*, Schrad., *Gœtt. gel. Anz.*, 1824, p. 865, n° 7. *A. Phyllitidis*, Mart., *Herb. Bras.*, n° 361. Rio-Janeiro, Raddi, Sellow; Bahia, Martius; Glaziou, n° 443; Blanchet, n° 2486. Presl, *Tent. pterid. supp.*, p. 86, reconnaît une variété β *evoluta*. Sellow, Rio-Janeiro.

Espèce très-distincte par ses longues écailles poilues et d'une belle couleur dorée. Les frondules sont écartées, dimidiées, gibbeuses en dessus, cunéiformes, au nombre de 10 paires environ. Les rachis sont chargés de poils écailleux, que l'on ne retrouve plus sur le pétiole des épis qui sont géminés; la souche est très-grosse.

19. PILOSA, Mart. et Galeotti, *Foug. Mex.*, p. 19, t. 2, f. 1; Presl., *Supp. Tent. pterid.*, p. 86. Brésil, Goyaz, Pohl; Gardner, n°s 3560 et 4087; à Piauhy, par le même, n° 2389. — Frondes stériles presque sessiles et radicales, pinnées, oblongues; pétioles des frondes fertiles, légèrement poilus et très-longs; épis assez gros, interrompus; rhizome rampant.

20. FILIFORMIS, Sw., *Syn.*, p. 156; Willd., *Fil.*, p. 90; Presl., *Supp. Tent. pterid.*, p. 87. *A. pulchra*, Pohl., *Herb. Vindob.* Goyaz, Pohl; Piauhy, Gardner, n° 2387. — Les pinnules portent des poils blancs ou blanchâtres; les frondules sont oblongues, terminées en coin, obtuses, incisées-dentées au som-

met; le pétiole est hérissé de poils. Elle est petite et n'a point encore été figurée.

21. CILIATA, Presl., *Del. Prag.*, p. 158. *A. repens b major*, Radd., *Fil. Bras.*, p. 71, t. 9, f. 2 *b*. *A. hirsuta*, var. *achilleæfolia*, Mart. et Galeotti, *Foug. Mexic.*, p. 20. Brésil, Gardner, nos 18, 2388 et 3558; Weddell, no 604 (H. F.); Claussen; Glaziou, Rio-Janeiro, nos 1003 et 3354, Serra os Orgaos. — Petite espèce à pétioles filiformes, glabres; frondules incisées-dentées, au nombre de 5-6 paires; épis géminés assez gros; rhizome oblong.

22. INCISA, Schrad., *Gœtt. gel. Anz.*, 1824, 865. *A. pallida*, Field. et Gardner, *Sert. Pl.*, *sub* t. 70. Gardner, prov. Goyaz, no 3560 *b*. — Espèce élancée, blanchâtre après dessiccation; frondes pinnées, segments sous-opposés, sessiles, dentés, à dents écartées; deux épis floraux longuement pétiolés, portant une fronde à leur base. Longueur, 45 centim.; le pétiole mesure 27 centim. de la base de la fronde à la naissance des épis; la souche est arrondie et petite. Presl (*Supp. pterid.*, p. 93) fait de cette plante un *Aneimidictyon*.

23. TENUIFOLIA, Presl., *Epim. bot.*, p. 10, t. 4. Brésil. — Très-grêle dans toutes ses parties; frondes multifides; rhizome rampant, écailleux.

24. TENELLA, Sw., *Syn. filic.*, p. 156; Schkh., *Crypt. Gew.*, p. 143, t. 141. *A. dissecta*, Presl., *Supp. Tent. pterid.*, p. 88. Brésil, Regnell, II, 340; Claussen. — Petite espèce, glabriuscule; frondes stériles pinnées-pinnatifides; frondes fertiles à pédicelle capilliforme bifide; petite souche arrondie.

25. SCHRADERIANA, Mart., *Icon. crypt. Bras.*, p. 113, t. 58. *A. Vespertilio*, Schrad., *Gœtt. gel. Anz.*, 1824, p. 865, var. *minor*. Dans les forêts de Bahia, Neuwied et près de Almada, Martius. — La plus distincte et la plus curieuse des espèces. Le nom spécifique de *vespertilio* rend très-bien compte de la forme des frondes, dilatées en manière d'ailes de chauve-souris.

26. LANGSDORFFIANA, Presl., *Supp. Tent. pterid.*, p. 89. *A. Phyllitidis*, Langsd. et Fisch., *Icon.*, p. 24, t. 28. Brésil, Sainte-Catherine. — Cette espèce ne diffère de l'*A. Phyllitidis*, Sw., que par des nervilles libres. (Voy. *Aneimidictyon Phyllitidis*, Presl.)

27. BREUTELIANA, Presl., *Supp. Tent. pterid.*, p. 90, *A. Mandioccana*, Hook., *Gen. filic.*, t. 90, *non* Raddi; *A. Phyllitidis*, Mart., *Herb. Bras.*, no 361, *non* Langsd.

et Fisch. Bahia, Blanchet, nos 49 et 50 (H. F.). — Frondes longuement pétiolées, frondules peu nombreuses; épis géminés, rhizome rampant; stipes avec des écailles piliformes.

28. MANDIOCCANA, Radd., *Fil. Bras.*, p. 70, t. 9, f. 1. *A. caudata*, var. γ *abscissa*, Th. Moor. *A. abscissa*, Schrad., *Gœtt. gel. Anz.*, 1824, 864. Rio-Janeiro, Mikan; Pohl.; Gardner, *Herb. Bras.*, nos 2 et 3; Sellow, au Corcovado, Glaziou, nos 1670, 1227 et 934. — Très-belle espèce, pouvant dépasser 90 centim.; souche très-grosse, chargée de belles écailles dorées, portant un grand nombre de stipes, ceux-ci déliés, sillonnés, écailleux; rachis souvent coloré en rouge; segments très-gibbeux supérieurement, élégamment dentés, obtus, dimidiés; marge inférieure entière; épis rameux, fructifères, très-nombreux et très-déliés.

29. TRICHORHIZA, Hook., *Icon. pl.*, t. 876. Brésil, Gardner, no 4080. (N. V.)

95. ANEIMIDICTYON, J. Sm. Presl., *Supp. Tent. pterid.*

1. PHYLLITIDIS, J. Sm., *Lond. Journ. bot.*, II, 387. Presl., Th. Moore, etc. *Aneimia Phyllitidis*, Sw., *Syn. filic.*, p. 155, Willd., Desv., Link, Mettenius, Glaziou, Rio-Janeiro, no 446.

   Var. β *longifolium;* Brésil, Blanchet, no 2279; Gardner.

   Var. γ *cordifolium; Aneimia Haenkei*, Presl., *Reliq. Haenk.*, I, 74. Brésil.

   Var. δ *fraxinifolium;* Brésil, Blanchet, nos 9, 74 et 178; Gardner, no 6; Glaziou, Rio, nos 445, 933 et 2277; Sainte-Catherine, à Desterro, H. Gauthier.

   Var. ε *laciniatum;* Brésil. *Aneimidyction laciniatum*, Presl., *Supp. Tent.*, p. 94.

2. TWEEDIEANUM, Th. Moor., *Index*, p. 72. *Aneimia*, Hook., *Icon. pl.*, no 906, Brésil.

3. HIRTUM, Sw., *sub aneimia, Syn. filic.*, 155; Presl., *Supp. Tentam.*, p. 92. *A. obliquum*, Presl., *l. c. Aneimia hirta*, Sw., *Syn. filic.*, p. 155. Brésil. — Frondes pinnées, à frondules oblongues, lancéolées, dentées, glabres; pétiole et rachis hérissés d'écailles piliformes.

96. TROCHOPTERIS, Gardn., *Journ. botan. de Londres.*

1. ELEGANS, Gardn., Hook., *Lond. Journ. bot.*, I, p. 74, t. 14. *Aneimia elegans*, Presl., *Supp. pterid.*, p. 81. Brésil, Gardner, n° 4035. — Nous avons cette plante de Cuba, Linden, sous le n° 1906. — Frondes bipinnées, pétiolées, portées sur un rhizome ou souche couverte d'écailles piliformes de couleur rouge foncée. Les pétioles sont laineux, ainsi que les lames frondulaires; les épis ont une grande tendance à devenir foliacées. A l'exception de la fructification, cette plante rappelle beaucoup le *Nothochlæna lanuginosa*, Desv.; même vestiture et même port.

NB. Les Schizéacées se composent de deux sous-familles : 1° les Euschizéacées et 2° les Aneimiacées, lesquels, réunis par les organes reproducteurs, les sporanges, sont complétement séparés par le port. Cette famille, qui appartient exclusivement aux régions équatoriales et tropicales, est peu nombreuse en espèces. Presl en décrit 55, savoir 17 Schizéacées et 38 Aneimiacées. La contrée de la terre où ces plantes sont le plus abondantes, est sans contredit le Brésil, qui seul possède 7 Schizéacées et 33 Aneimiacées. Le Mexique compte 14 Aneimiacées, sans Schizéacées, et les Antilles 3 Schizéacées et 15 Aneimiacées. Toutes sont herbacées et de port spécial. Plusieurs espèces d'*Aneimia*, très-variables de forme, ont donné lieu à de nombreuses variétés.

V. LYGODIACÉES.

97. LYGODIUM, Sw., *Synop. filic.*, p. 152.

1. VOLUBILE, Sw., *l. c.;* Radd., *Fil. Bras.*, p. 68, t. 81; Presl., *Supp. Tent.*, p. 103. *L. scandens*, Schkh., *Crypt. Gew.*, p. 138, t. 139 (*synonym. omnib. exclusis*) Blanchet, *Herb. Bahia*, n° 1. Saint-Sébastien, près de Rio-Janeiro; Pohl. Brésil, sans autre indication. — Plante très-répandue dans les herbiers et cultivée dans les jardins botaniques.

2. HASTATUM, Desv., *Prodr. Ann. Soc. Linn. Par.*, VI, 204; Mart., *Icon. crypt. Bras.*, p. 118, t. 57, f. 1 (*exclus. synonym.*, Klfss.). *L. varium*, Lk., *Hort. Berol.*, II, 140. Rio-Janeiro, au Corcovado; Bahia; Serra do Mar, Martius,

H. Bras., n° 368; Luschnath, Pl. Bahia, n° 94; de Gestas; Goyaz, Pohl; Nouv.-Fribourg, Claussen, Blanchet; Rio, Glaziou, n° 448. Sainte-Catherine, à Bignassu, par Alburquerque. — Cette espèce est très-commune au Brésil, où elle a été récoltée par un grand nombre de collecteurs.

3. HIRTUM, Klfss., *Enum. filic.*, p. 47; Presl., *l. c.*, p. 104. Rio-Janeiro, Sellow. Une variété β *lucens*, Klfss., au Corcovado, par Mikan et Sellow. — Les rachis et les pétioles sont cylindriques, tomenteux, mais les mésonèvres sont toujours pileux sur l'un et l'autre côté des lames.

4. VENUSTUM, Sw., *in Schrad. Journ.*, 1801, II, p. 303; Schkh., *Crypt. Gew.*, p. 140 et 139; Mart., *Icon. crypt. Bras.*, p. 119, t. 57, f. 2 (*sterilis*). *L. polymorphum*, H. B. et Kth., *Nov. gen.*, I, 93. *Hydroglossum hirsutum*, Willd., *Fil.*, p. 80. Brésil, rives de l'Amazone, Pœppig; Rio, Mikan; Para, Martius; Villa Boa, Pohl; province Ceara, Gardner, n° 1231.

Var. β *spiciferum*, Presl., *l. c.*, p. 105.

Cette plante a une géographie très-étendue.

5. POHLIANUM, Presl., *l. c.*, p. 105. Serra de San-Jezabel et Santa-Luzia, Minas-Geraes, Pohl. — Frondes glabres, pinnées et bipinnées; les inférieures alternes ne portent point de bourgeon axillaire; les frondules sont ovales cordiformes, divisées en 5 ou 6 lobes, la terminale plus longue; les rachis sont cylindriques.

NB. Les plantes qui composent cette petite famille ont toutes le même port; elles grimpent à la manière de nos clématites, et pour se soutenir elles ont besoin d'appui. La fructification est en épis, comme dans les Ophioglossacées, mais la préfoliation est circinale. Les nervilles sont libres dans le genre *Lygodium* et anastomosées dans l'*Hydroglossum*, genre créé par Presl et qui renferme une espèce mexicaine énumérée par nous, *Catal. pl. Mexic.*, p. 42. Cette famille est représentée au Brésil, aux Antilles et au Mexique par cinq espèces presque toutes de même type. L'anneau des sporanges est complet et apicilaire.

VI. MARATTIACÉES.

98. GYMNOTHECA, Presl., *Tent. pterid.*, *Supp.*, p. 12.

1. CICUTÆFOLIA, Presl, *l. c.*, p. 13. *Marattia cicutæfolia,* Klfss., *Enum.*, p. 32; Mart., *Icon. crypt. Bras.*, p. 119, t. 69, 71 et 72 (*excl. syn.*, Raddi). Serra d'Estrella, Martius; Brésil, Sellow; Rio-Janeiro, Glaziou, n°s 374, 375, 944 et Gaudichaud, 1650 (*junior*); Sainte-Catherine, H. Gauthier. Var. β *heterodon,* F. (*in Hort. Lips.*, *culta ex* Kze.). — Le n° 375 de M. Glaziou présente, à la base des frondules qui ont une marge denticulée, de petites stipules pinnatifides. Ce spécimen, qui devra constituer une variété γ *stipulacea,* est stérile. Cette prolification est-elle normale? On pourrait se demander pourquoi cette plante porte le nom spécifique qui lui a été attribué.

2. RADDIANA, Presl., *l. c.*, p. 13. *Marattia Raddii,* Desv., *Prodr. filic.*, p. 207. Martius, *Icon. crypt. Bras.*, p. 119, t. 70. Gaudichaud, Rio-Janeiro, n° 202; Glaziou, n°s 1229, 1649-1651. — Frondes bipinnées, à frondules opposées, horizontales, lancéolées.

3. POLYODON, Presl., *l. c.*, p. 14. — *Marattia cicutæfolia,* Mart., *Icon. crypt. Bras.*, t. 70. (Les trois paires inférieures de pinnules.) Martius, Rio-Janeiro.

4. OBTUSIDENS, Presl., *l. c.*, p. 15; *M. cicutæfolia,* Mart., *l. c.*, t. 70. (Les deux paires supérieures de pinnules.) Martius, Rio-Janeiro.

NB. Ces deux dernières espèces demandent à être mieux connues.

99. EUPODIUM, Presl., *Supp. Tent. pterid.*, p. 16.

1. KAULFUSSII, J. Sm., *in* Hook., *Journ. bot.*, IV, 190. *Marattia alata,* Raddi, *Filic. Bras.*, p. 74, t. 83 et 84. Pohl et Raddi, au Corcovado et dans plusieurs localités de Rio-Janeiro; Glaziou, n° 376; même localité, n°s 1698, 1699 et 2275, vers Tijuca. — Cette espèce est pellucide, fort délicate, très-élégante et fort mobile dans ses formes; celles qui suivent peuvent être indiquées comme les principales.

β *macropteron*, F.; Rio-Janeiro, Glaziou, n° 2273. — Les rachis sont remarquables par l'ampleur des décurrences.

γ *acuminatum*, F.; même localité, n° 2274. — Frondules primaires longuement acuminées, écartées les unes des autres, ainsi que les frondules secondaires; pyxidules assez grosses.

NB. Les Marattiacées, bien étudiées par Presl, *Supp. pteridogr.*, p. 7, ont des sporothèces sessiles, bivalves; chaque valve porte intérieurement les sporanges qui forment une double série; elles sont privées d'anneau, et s'ouvrent à la maturité, pour mettre en liberté les spores. Ces fougères sont rares en Amérique et vivent de préférence dans l'archipel africain, dans les îles de la mer du Sud, aux Philippines, à Java, etc. Presl en a décrit 35 espèces, réparties en 7 genres; le Brésil a 5 espèces et 2 genres; les Antilles 1 seul genre et 2 espèces; le Mexique 2 genres et 3 espèces; les autres parties de l'Amérique du Sud ne sont pas plus riches ou même le sont encore moins.

VII. DANÆACÉES.

100. DANÆA, Smith., *Act. Taur.*, V, p. 420, t. 9.

* *Frondes simples.*

1. SIMPLICIFOLIA, Rudge, *Pl. Guyan.*, I, 24, t. 36; Willd., *Fil.*, 67; Kze., *in Schkh. contin.*, I, p. 107, t. 50. Para, Spruce, n° 29. — Frondes stériles beaucoup plus grandes et beaucoup plus étroites que les fertiles, dont les lames prennent une direction horizontale.

** *Frondes pinnées.*

2. LONGIFOLIA, Desv., *Berol. mag.*, 1811, p. 307. Serra do Mar, Mart., *Herb. Bras.*, n° 339. Rio-Janeiro, n° 1; Serra os Orgaos, n° 3327. — Ce spécimen est remarquable par des frondules fertiles ouvertes à angle droit. M. Th. Moore réunit le *D. longifolia* au *D. nodosa*, Smith.

3. ELLIPTICA, Sm., *in Rees cyclop.*; H. et Gr., *Icon. filic.*, t. 51. *D. geniculata*, Radd., *Fil. Bras.*, p. 75, t. 5, f. 1. Bahia, Luschnath, n° 14 (H. F.); Gardner, *Pl. Brés.*, n° 87. San-Gabriel, Rio-Negro, *sine numero.* Glaziou, Rio-Janeiro, n° 370.

4. DUBIA, Presl., *Tent. pterid. supp.*, p. 36. Brésil, Rio-Janeiro, par Kulencampf. — Frondes pinnées; les fertiles presque sessiles, linéaires, très-aiguës, très-entières, arrondies à la base, qui est cordiforme. Plante douteuse, qui n'a point été revue.

† 5. CORDATA, F.

Frondibus pinnatis; frondulis sterilibus, sessilibus, oblongo-lanceolatis, papyrinis, basi cuneatis, apice caudatis, cauda longiuscula, lineari, flexuosa; nervillis numerosis, tenuibus, fuscescentibus; fertilibus lanceolato-linearibus, breve petiolatis, suboppositis, basi cordatis, apice caudato, sterili, leviter arcuatis.

Habitat in Corcovado (Glaziou, nos 451 et 1686) [*sterilis*].

Filix magna, robusta, surculo durissimo.

ICON : *Tab. LXXI, fig. 5* (*fragmenta*).

(Longueur, 1 mètre et plus; frondules stériles, 26-28 centim. sur 3 de largeur; fertiles, 15-16 centim. sur 11-12 millim.; l'appendice stérile, 2 centim.)

Les frondes stériles ne diffèrent pas de celles du *D. longifolia;* mais ce qui distingue cette espèce entre toutes, ce sont les frondules fertiles à court pétiole, à base cordiforme et à sommet terminé en un long appendice linéaire et stérile. Presl, *Supp. pterid.*, p. 36, parlant du *D. dubia*, dont il n'a vu que la fronde fertile de son espèce, dit que le rachis est cylindrique; il est aplati dans la nôtre.

6. SELLOWIANA, Presl., *in Corda, Beitr. z. Fl. d. Vorw.*, t. 51, f. 18-23, et *Supp. Tent. pterid.*, p. 37. Brésil, Sellow. — Frondes pinnées; frondules stériles, pétiolées, oblongues-lancéolées, acuminées, très-entières, caudées, aiguës à la base, les fertiles courtement pétiolées, linéaires, acuminées; rachis allongé, continu.

7. ALATA, Sm., *Act. Taur.*, V, p. 420; Sw., *Syn. filic.*, 167; Willd., *Filic.*, 68; Hook. et Grev., *Icon.*, 18. Rio-Negro, Spruce, 1407. Plumier a donné une figure grossière de cette plante, *Filic. Americ.*, t. 109. — Cette espèce est distincte entre toutes par son rachis ailé.

8. STENOPHYLLA, Kze., *in Schkh. supp.*, I, 55, t. 28. *Heterodanæa*, Presl., *Supp. Tent. pterid.*, p. 38. — Nous avons reçu (1868) d'Itajahy, île Sainte-Catherine, de M. H. Gauthier, une fronde fertile de cette espèce; la fronde stérile serait nécessaire pour lui attribuer définitivement une localité brésilienne.

101. DANÆOPSIS, Presl., *Tent. pterid. supp.*, p. 36.

1. PALEACEA, Presl., *l. c.* Radd., *Filic. Bras.*, p. 76, t. 5, f. 2, *sub Danæa* (*pinna sterilis*). Serra d'Estrella, Radd. — Plante mal connue et douteuse.

NB. Cette famille, créée par Presl, *Supp. pterid.*, p. 33, renferme des fougères à sporothèces linéaires, parallèles, connivents, charnus, persistants, naissant sur le trajet des nervilles et s'ouvrant à la maturité par des pores, d'où la qualification de Poroptérides, donnée à ces fougères par Willdenow. Les sporanges sont privées d'anneau. Presl en énumère 13 espèces, réparties dans 3 genres. Le Brésil en possède 9, les Antilles 5; nous ne connaissons aucune Danæacée mexicaine.

VIII. OSMONDACÉES.

102. OSMUNDA, L., *Spec. plant.*, p. 1521.

1. SPECTABILIS, Willd., *Fil.*, 98, *O. spectabilis*, var. β *palustris*. Grev. et Hook., *Enum. filic.*, *in Hook. Bot. misc.*, III, p. 230. Brésil, Sellow, Neuwied, Gardner, Pohl, Glaziou, nº 932. Serra d'Estrella, Riedel, *in locis variis*. — M. Milde, *Filic. Eur. et Atlantid.*, p. 178, ne fait de cette plante qu'une simple forme de l'*O. regalis*, L.

2. GRACILIS, Lk., *Hort. bot. Berol.*, II, 145; Kze., *in Schkh. contin.*, I, p. 81, t. 39. Brésil, Sellow; Rio-Pardo, Riedel; *O. regalis*, var. β *gracilis*, Milde, *l. c.* — C'est la plus petite de toutes les espèces; les frondes, au nombre de 2-4, sont sessiles, denticulées, assez distantes.

3. CINNAMOMEA, L., *Spec. pl.*, 1522; Sw., *Syn. filic.*, p. 160; Willd., *Filic.*, 98; Schkh., *Crypt. Gew.*, t. 146. Serra os Orgaos, Glaziou, nº 3353 (juin 1869). — Très-belle plante, chargée vers la base des frondes et souvent sur les pétioles de longs poils couleur de cannelle; les sporanges ont aussi cette couleur; les frondules stériles sont sessiles. Elle vit au Mexique et n'avait point été, jusqu'ici, trouvée au Brésil. Le spécimen cité de M. Glaziou a ses frondules assez petites, rapprochées et de forme lancéolée.

NB. Cette famille se compose de 3 genres, qui renferment 24 espèces sagement réduites par M. Milde. Elle manque aux Antilles. Le Brésil n'en a que 3 et le Mexique 1 seule. L'anneau des sporanges est apicilaire et incomplet.

IX. OPHIOGLOSSACÉES.

103. OPHIOGLOSSUM, L., *Spec. plant.*, p. 1518.

1. RETICULATUM, L., *Sp. pl.*, *l. c.* H. et Gr., *Icon. filic.*, n° 20. Brésil, Saint-Sébastien, Arrabida.

   β *cordatum*, F., Rio-Janeiro; Glaziou, n° 2272. — Frondes cordiformes, presque orbiculaires; radicelles très-longues.

2. NUDICAULE, L. Fil. *Supp.*, p. 443; Sw., *Syn. filic.*, p. 69 et 397; Kze., *in Schkh. contin.*, I, p. 59, t. 29, f. 3. *O. Ypanemense*, Mart., *Icon. crypt. Bras.*, p. 39 et 130, t. 73. Brésil, région de l'Amazone, Pœppig; Ypanema, prov. de Saint-Paul, par Martius et par Gardner, à Piauhy.

3. SPRUCEANUM, F.

   Frondibus radicalibus petiolatis, caulibus sessilibus, omnibus ecostatis, infra bullatis; spicis longe stipitatis, linearibus, longiusculis, acutis, rectis.

   Habitat prope San-Gabriel de Cachoeira *ad* Rio-Negro, *in Brasilia boreali* (Spruce, n° 2041).

   Filix frondibus dissimilaribus, ad surculos ellipsoideis petiolatis, ad caules sublinearibus sessilibus.

   ICON.: *Tab. LII, fig. 3.*

Cette espèce est fort distincte; elle mesure 10 centim. avec l'épi, qui ne dépasse guère 2 centim. La souche est légèrement renflée et globuleuse. Il n'existe qu'une seule feuille à la base du pédicelle fructifère et elle naît à 2 centim. environ de la souche. Elle rappelle un peu, par le port, l'*O. nudicaule*, L. fils; mais ici les feuilles n'ont point de côte médiane (mésonèvre).

104. CHEIROGLOSSA, Presl., *Tent. pterid.*, *Supp.*, p. 56.

1. PALMATA, Presl., *l. c.*, p. 57. *Ophioglossum palmatum*, Plum., *Fil. Amer.*, p. 139, t. 163. *Ramondia palmata*, Mirb., *Dict. sc. nat.*, éd. Levrault, t. 97. Brésil, Sellow. Ile Sainte-Catherine, H. Gauthier. (H. F.)

NB. Les Ophioglossacées diffèrent de toutes les fougères par une préfoliation dressée et non circinale; les sporothèces, disposés sur deux rangs, agglomérés ou seulement rapprochés, sont globuleux et bivalves à la maturité; il n'y a point d'anneau. Presl reconnaît 6 genres, auxquels il rattache 48 espèces. L'Europe a 2 genres seulement, *Botrychium* et *Ophioglossum;* le Mexique 3 genres et 6 espèces; les Antilles 3 genres et 4 espèces; le Brésil 2 genres et 4 espèces. Elles sont éparses sur toute la surface du globe, sans lieu de prédilection.

II. LYCOPODIACÉES.

(Spring, *Monographie,* 1re et 2e Partie.)[1]

1. LYCOPODIUM, Spring., *l. c.*

1. Type: Reflexum.

1. reflexum, Lmrk., *Encyc. bot.*, III, p. 653; Willd., *Filic.*, p. 52; Schkh., *Crypt.*, p. 160, t. 159. Rio-Janeiro, Gaudichaud; Lagoa-Santa, *in fossis humidis;* Warming; Glaziou, nos 910 et 1790, Serra os Orgaos; Minas-Geraes, par Martius. — Espèce deux fois dichotome, courbe, assez souple; à feuilles formant huit séries, toutes réfléchies; dernier caractère que l'on retrouve dans le *L. Sieberianum,* Spring., qui est plus raide et beaucoup plus robuste.

2. intermedium, Spring., *in Fl. Brasil.*, I, p. 111; *Monogr.*, I, p. 27. Brésil, Sellow, et près de Rio, Freyreiss. — La racine est tomenteuse; la tige, qui s'élève environ à 35 centim., est couverte de feuilles semi-verticillées très-raides, ainsi que le mucron qui les termine.

3. myrsinites, Lmrk., *Encyc. bot.*, III, p. 654; Willd., *Filic.*, p. 47. *L. quadrifariatum,* Bory, *in Duperr.*, *Voy. bot. crypt.*, p. 245. *L. catharticum,* Hook., *Ann. of natur. hist.*, I, p. 428, t. 14. Sellow, Rio-Janeiro; Gardner, Serra os Orgaos; Lhotsky, île Sainte-Catherine; Durville (*Herb. Paris.*), et H. Gauthier. (H. F.) — Cette espèce est très-facile à reconnaître à sa tige exactement quadrangulaire, raide et 2-4 fois dichotome.

---

1. Nous suivons, sans nous en écarter, la belle monographie de cet auteur qui a bien voulu revoir notre collection de Lycopodiacées.

4. SARMENTOSUM, Spring., *Monogr.*, II, p. 13. Gardner, Serra os Orgaos. — Tiges pendantes, flasques, pâles, 3-4 fois dichotomes, avec des feuilles quaternées, très-étroites, divergentes, pouvant atteindre 12 millim. de longueur.

2. Type : LINIFOLIUM.

5. LINIFOLIUM, L., *Sp. pl.*, p. 1563 et *auctor.* Brésil, Beyrich; Para, Martius; Gardner, Rio-Janeiro, Glaziou, n°s 2047 et 2240, etc.; île Sainte-Catherine, H. Gauthier. (H. F.) — Varie par des feuilles plus ou moins longues, plus ou moins raides et par des rameaux plus ou moins divariqués et plus ou moins souples.

Var. β *sanguineum,* Spring., *Monogr.*, I, p. 31. — Tiges et leurs divisions couleur pourpre de sang et même quelquefois çà et là les feuilles.

6. BRONGNIARTII, Spring., *Monogr.*, I, p. 33. Sommet de la Serra os Orgaos, Glaziou, n° 2797. — Cette espèce a un aspect rustique et disgracieux; elle est robuste; le *facies* permet de la ranger à côté du *L. ulicifolium,* Venten.; mais suivant M. Spring elle est plus près des *L. taxifolium*, Sw., et *linifolium,* L.

3. Type : DICHOTOMUM.

7. SETACEUM, Hamilt., *in Don. Prod. Fl. Nepal.*, 18. *L. pulcherrimum,* Hook. et Gr., *Icon.*, n° 38. Saint-Sébastien, Schott; Para, Martius.

Var. β *Brasiliense, L. mollicomum,* Mart., Spring., *in Fl. Brasil.*, I, p. 113. — Feuilles plus courtes que chez le type, linéaires, acuminées, dentées vues à la loupe; anthéridies sous-orbiculaires, comprimées. (N. V.)

8. MANDIOCCANUM, Radd., *Fil. Bras.*, p. 77, t. 4. *L. dichotomum,* H. et Gr., *Enum. filic.*, n° 22. Raddi, Saint-Sébastien, près Mandiocca; Serra d'Estrella, Beyrich; Sainte-Catherine, H. Gauthier, province de Saint-Paul, forêts de Morro d'Arara, prov. de Neuwied. Rio-Janeiro, Glaziou, n° 2239, et par le même, Serra do Couto, n° 3182 (1869); petite forme. — Varie par des feuilles plus ou moins raides et plus ou moins étroites, mais toujours très-longues.

4. Type : VERTICILLATUM.

9. VERTICILLATUM, L., *Supp.*, p. 448. *L. filiforme,* Sw., *Syn. filic,* n°s 174 et 398, t. 4, f. 3, Radd., *Fil. Bras.*, p. 77, t. 4², f. 1. Rio-Janeiro, Schott, Gaudichaud,

Langsdorff; Glaziou, nos 2238 et 3314, Serra os Orgaos. Bahia; prov. de Neuwied. Ile Sainte-Catherine, H. Gauthier. — Tiges mesurant de 40 à 50 centim., filiformes, pendantes, très-souples, très-longues; feuilles étalées, courbées en dedans, capillacées, subulées, à dos convexe; anthéridies éparses.

Var. β *apertum*. Tiges 6-7 fois dichotomes, pendantes, rameaux recourbés en dedans; feuilles sétacées étalées, assez longues, les fructifères un peu dilatées à la base. Glaziou, os Orgaos, nos 3312 (juin 1869).

10. TENUE, H. Bonpl., *in Willd. filic.*, p. 55. *L. curvifolium*, Kze., *Linn.*, IX, p. 5. Minas-Geraes, Martius; Rio-Janeiro, Gaudichaud. — Tiges pendantes filiformes, très-divisées; feuilles capillacées, subulées, lâches et quadrifariées.

11. FONTINALOIDES, Spring., *Fl. Bras.*, I, p. 112, t. 5, f. 2, et *Monogr.*, I, p. 49. Brésil, Sellow. Sommités de la Serra os Orgaos, Glaziou, nos 2794 et 3315 (juin 1869). — Facile à reconnaître à sa tige divisée près de la souche, en rameaux pendants, plus ou moins divariqués, presque filiformes, plusieurs fois dichotomes; les feuilles sont carénées, très-entières et mutiques; les tiges quadrangulaires. Elle atteint jusqu'à 70 centim. de longueur.

† 12. SERPYLLIFOLIUM, F.

Caulibus pendulis, laxis, colore coralloideo, 5-6 dichotomis, fili emporetici crassitudine, ramis curvato-divaricantibus, foliis basalibus sessilibus, ovatis, acutis, translucidis, margine rubescentibus, supremis plicatis et in ramis dichotomiarum carinatis albo marginatis, imbricatis, bifariis, obtusiusculis antheridiis....

Habitat in Brasilia, ad montes v. d. Serra os Orgaos (Glaziou, no 2793).

Lycopodium pendulum foliis dissimilaribus, ad basim caulium ovatis petiolatis.

ICON: *Tab. LXXIII, fig. 3.*

(Longueur: 20-24 centim.)

Cette charmante espèce est remarquable à plusieurs titres; elle est plusieurs fois dichotome, avec des feuilles étalées, pétiolulées, à marge bordée de rose, qui rappellent celles du serpolet. Vers le haut de la tige elles se plient sur la nervure médiane, deviennent sessiles et conservent leur forme; elles ont une marge blanchâtre, ainsi que d'autres feuilles beaucoup plus petites, carénées et étroitement appliquées sur les rameaux dichotomes; la tige principale et les rameaux ont une couleur rouge de corail très-pure. Nous ne la connaissons que stérile.

5. Type : ULICIFOLIUM.

13. NITENS, Chamisso et Schlecht., *Linn.*, V, p. 623; Spring., *Monogr.*, I, p. 54. Saint-Sébastien, Gardner; Rio-Janeiro, Glaziou, n°s 2046 et 2453. — Tiges une ou deux fois dichotomes, à feuilles allongées, étalées, rétrécies à la base; très-amincies au sommet, à nervure médiane, très-apparente et très-légèrement courbée en carène.

6. Type : GNIDIOIDES.

14. RUBRUM, Chamisso, *Linn.*, VIII, p. 389; Spring., *Monogr.*, I, p. 61. Brésil intertropical, Sellow. — Très-distincte par la couleur d'un beau rouge de ses feuilles. (N. V.)

7. Type : OPHIOGLOSSOIDES.

15. SUBULATUM, Desv., *Encyc. bot. Supp.*, III, 544; Klfss., *Enum. filic.*, p. 8; Spring, *l. c.*, I, p. 71. Serra os Orgaos, à 1,660 mètres; Gardner, Glaziou, n°s 2795 et 3313 (juin 1869). — Tiges pendantes, filiformes, plusieurs fois dichotomes; à feuilles lâches, distantes, étalées, linéaires, aiguës, un peu arquées; épis cylindriques, rappelant les chatons de quelques espèces de *piper;* ils sont souvent dichotomes et fort longs.

8. Type : INUNDATUM.

16. ALOPECUROIDES, L., *Sp. pl.*, 1565; Sw., *Syn. filic.*, p. 177; Willd., *Fil.*, p. 26; Schkh., *Crypt. Gew.*, t. 160. Minas-Geraes, Martius; Goyaz, Pohl; Araraquara (Saint-Paul), *in paludibus.* Porto d'Estrella, Freitas. Glaziou, Serra os Orgaos, n° 2796, β *integerrimum,* Spring, I, p. 74. Sainte-Catherine, Gaudichaud. — M. Spring, *l. c.*, indique également au Brésil une variété *Spinulosum,* qu'il dit rare et que nous n'avons pas vue. Elle est facile à reconnaître à la longueur de ses rameaux florifères, raides, et se terminant en une sorte d'épi allongé, renflé, qui se charge de capsules.

Var. β *furcatum,* F. Lagoa-Santa, Minas-Geraes, E. Warming (1866). — Forme très-remarquable, une ou deux fois fourchue; elle est rampante, fort longue; les tiges stériles sont courbes et dichotomes, à rameaux unilatéraux, et les feuilles plus ou moins appliquées par imbrication. Peut-être est-ce une espèce distincte.

17. CONTEXTUM, Mart., *Icon. crypt. Bras.*, p. 38, t. 20, f. 1. Brésil, dans les montagnes. — Tiges rampantes, radicantes, très-feuillues; feuilles rameuses,

raides, très-serrées, linéaires, subulées, très-entières, énerves. Chatons sessiles, droits, avec des bractées foliacées; les rameaux ont une forme tout à fait différente de la tige principale.

9. Type : ANNOTINUM.

18. CERNUUM, L., *Sp. pl.*, 1566; Sw., *Syn. filic.*, p. 178; Willd., *Filic.*, p. 30; Spring, *Monogr.*, I, p. 79. *L. Boryanum,* Rich., *Voy. astrol.*, t. 2. Plum., *Filic.*, t. 155, f. A; Ad. Brongn., *Veg. foss.*, II, t. 4. Saint-Sébastien, Para, Minas-Geraes, Rio-Grande, Saint-Paul, Bahia, Sainte-Catherine, H. Gauthier; la Jacobine, Blanchet; Rio-Janeiro, Glaziou, n°s 911 et 1669. Forêts, friches, marais, et jusque dans l'eau (Warming). — La géographie de cette plante est très-étendue. — Tiges dressées, très-grandes et très-rameuses; feuilles subulées, rapprochées, divergentes, étalées, demi-cylindriques, à dos marqué de sillons; les chatons sont sessiles et penchés (*inde nomen*).

10. Type: CLAVATUM.

19. CLAVATUM, L., *Sp. pl.*, 1564. Dc., *Fl. fr.*, II, 573. *L. officinale,* Neck., *Meth. musc.*, p. 150. Schkh., *Crypt. Gew.*, t. 162. Brésil, par Raddi, Beyrich, Pohl, Martius, Guillemin, Claussen. — La synonymie de cette plante cosmopolite est très-chargée; elle est commune en Europe.

Var. α *distachyon,* Spr. Serra da Pietade, *in alpestribus saxosis,* à 14-16 mètres, Warming.

† 20. ERIOSTACHYS, F.

Caule repente, foliosissimo, inæqualiter dichotomo; foliis dense confertis, multifariis, leviter patentibus, lineari-subulatis, apice setigeris, curvulis; amentis 3-4, longe pedicellatis; pedunculo squamis albidulis, adpressis vestito; spicis obtusiusculis, elongatis, lutescentibus; squamis albo-marginato-scariosis, apice longe pilosis.

Habitat in Brasilia fluminensi, Serra os Orgaos (Glaziou, n° 1788).

Espèce caractérisée par ses épis d'apparence laineuse; la tige qui rampe émet des crampons qui se terminent en une sorte de pénicille de radicelles. Cette tige s'allonge en rameaux dichotomes, qui mesurent 14-16 centim. et qui se terminent par des pédoncules de même longueur que les rameaux ou même plus longs. Les épis, au nombre de 3-4, atteignent 3 à 3,5 centim. de développement. Cette espèce a quelque rapport avec les *L. trichiatum,* Bory, et *aristatum,* H. et Bonpl.

21. TRICHIATUM, Bory, *Voy. aux 4 îles afric.*, I, 350; Sw., *Syn. fil.*, p. 179; Willd., *Fil.*, p. 16; Spring., *l. c.*, I, p. 91. *L. aristatum*, Presl., Gaudich., Hook. et Gr., Kunze, Spring, etc. Prov. Saint-Sébastien, Martius, Pohl, Gaudichaud; Saint-Paul, Martius; Minas-Geraes, Claussen; Mugi das Cruces (Saint-Paul), *in sylvis*, Warming. Rio-Janeiro, Glaziou, n° 914. — Tiges rampantes, radicantes, très-chargées de feuilles; irrégulièrement rameuses; chatons pédonculés, feuilles étalées sans ordre, planes et binervées, portant un très-long poil blanchâtre.

11. Type: CAROLINIANUM.

22. CAROLINIANUM, L., *Sp. pl.*, 1567, et *auct. plurim. L. repens*, Sw., *Syn. filic.*, p. 180; Willd., *Filic.*, p. 14. *L. affine*, Bory; *Voy.*, II, 204. Brésil, *ad* Ressaca, *inter* Barbacena *et* Bruniado, *in pratis paludosis* (1863); Beyrich, Sellow; Pœppig, Luschnath, Schott; Rio-Janeiro, Glaziou, n° 2237, et Serra os Orgaos, n° 3311 (juin 1869); près de Bahia, Sulzmann, Blanchet; île Sainte-Catherine, Durville; Blanchet, Igreja-Velha. — Tiges radicantes-rampantes, aphylles sur le dos; feuilles lâchement étalées, obliques, les latérales distiques, ainsi que les intermédiaires, qui sont plus petites; chatons pédonculés, solitaires. Elle est très-répandue.

23. PARADOXUM, Mart., *Icon. crypt. Bras.*, p. 38, t. 20, f. 2; Spring, *Monogr.*, I, p. 99. Provinces mérid. du Brésil, Martius; prov. Saint-Paul, Guillemin. — Les caractères sont les mêmes que ceux de l'espèce précédente, dont elle ne diffère que par ses feuilles latérales binervées, formant une série continue avec des intermédiaires 3 fois plus petites, étroitement appliquées sur la tige.

12. Type: COMPLANATUM.

24. COMPLANATUM, L., *Sp. pl.*, p. 1567; Sw., *Syn. fil.*, p. 180; Willd., *Fil.*, p. 19; Spring, *Monogr.*, I, p. 101. *L. Chamæcyparissus*, Al. Br. Schkh., *Crypt. Gew.*, t. 163. *Fl. danoise*, t. 78. Saint-Sébastien, Martius, Schott, Guillemin; Minas-Geraes, Claussen; Glaziou, Rio-Janeiro, n°s 913 et 1789. Serra do Couto, n° 3181; Mugi das Cruces (Herb. Warming).

Var. β *adpressifolium*, Spring, *Monogr.*, I, p. 102. — Cette variété, à laquelle se rattachent les spécimens brésiliens, est plus robuste que les types d'Europe et d'Asie. Les pédoncules portent de 2-4 à 16 épis, presque tétragones, les feuilles du sommet moins étalées; elle a des tiges plus longues et plus diffuses que chez les spécimens européens.

13. Type : Jussiæi.

25. comptonioides, Desv., *Prodr. in Annal. Soc. Linn. Par.*, VI, p. 185. — Cette espèce, que nous n'avons pas vue, demande à être mieux connue; elle n'a point été figurée.

2. SELAGINELLA, Spring, *Monogr.*, II, p. 55.

1. Type : Rupestris.

1. rupestris, Spring., *in Endlich. et Mart. Fl. Bras.*, I, p. 118. *Lycopodium rupestre*, L., *Sp. pl.*, 1564. Radd., *Fil. Bras.*, p. 80, t. 4², f. 2. *Stachygynandrum*, Palis. Beauv., *Prodr. Æthæg.*, p. 113. Rio-Janeiro, Raddi; de Gestas; 1824 (H. F.); Gaudichaud; Guillemin; Glaziou, nos 1216 et 3306; Serra os Orgaos (juin 1869); Rio-Grande et ailleurs, Martius. — M. Spring reconnaît deux formes de cette plante, l'une var. : α *Borealis*, l'autre var. : β *Tropica*, c'est là celle qui vit au Brésil et dans une foule de contrées tropicales. La variété des pays septentrionaux conserve toujours la même forme et pourrait fort bien être une espèce distincte.

† 2. brevipes, F.

Caule parvo, spicis bi-trifidis, elongatis, bracteis carinatis, pellucidis, laxe imbricatis; foliis lateralibus ovatis, obtusis, pellucidis, integris auriculatis, auricula imbricante; intermediis ovatis?

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2241; Serra os Orgaos).

Species parva; ramis cylindricis, foliis arcte imbricatis, apice divisis et spicas cylindricas, apicilares ferentibus.

Icon. : *Tab. LXXV, fig. 1.*

(Longueur des rameaux, 3 centim.; épis, 9-11 millim.)

Cette espèce a le port de la variété boréale de la *S. rupestris*, mais les feuilles ne sont pas ici terminées par une longue arête blanche, et elles ne sont pas appliquées sur les tiges d'une manière aussi manifeste. L'analogie que nous signalons n'est qu'un rapport de première vue. M. Glaziou dit qu'elle est rare.

2. Type : Involvens.

3. convoluta, Spring., *l. c.*, p. 69. *S. hygrometrica*, *ejusd. in Mart. Fl. Bras.*, n° 198. *Lycopodium Bryopteris*, Aubl., *Pl. Guyan.*, II, p. 967, *non* L. Rio-

Janeiro, de Gestas (H. F.); Glaziou, n° 1217; Bahia, Fernambouc et ailleurs, par divers. — Facile à reconnaître à la disposition rossulée des tiges, qui sont dénudées dans le bas, ainsi qu'à la coloration particulière du dos de la plante; elle est robuste, privée de stolons, épaisse, à rameaux alternes, très-courts; les feuilles de tous les ordres sont très-fortement imbriquées et en carène; les épis sont courts, oblongs avec des bractées carénées, aristées.

3. Type : Apus.

4. APUS, Spring., *l. c. in Mart. et Endl. Fl. Bras.*, I, p. 119. *Lycopodium apodum*, L., *Sp. pl.*, 1568; Sw.; *Syn. filic.*, 184; Willd., *Filic.*, p. 38. *L. Brasiliense*, Radd., *Fil. Bras.*, p. 82, t. 1, f. 1; Saint-Sébastien, au Corcovado, à Lund (Herb. Warming), Bahia, Sainte-Catherine; Glaziou, Rio, n° 1646. — Très-répandue. Gazonnante, annuelle, plus ou moins longue. La base des feuilles latérales dans sa partie postérieure est toujours élargie de manière à couvrir entièrement le dos de la tige. Les tiges des spécimens brésiliens atteignent jusqu'à 11-13 centim.

5. CRASSINERVIA, Spring., *in Endl. et Mart. Fl. Bras.*, I, p. 119; *Monogr.*, II, p. 77. *Lycopodium crassinervium*, Desv., *Prodr.*, p. 190. Environs de Rio-Janeiro, Gaudichaud et Langsdorff. — Délicate, flasque pellucide, d'un pâle vert; radicules très-nombreuses, capillaires; la nervure des feuilles intermédiaires se prolonge en arête.

6. POLYSPERMA, Spring., *Enum. Lycop.*, n° 22; *Monogr.*, II, p. 78; Rio-Janeiro, Gardner. — Elle a quelques rapports avec le *S. apus*, dont elle diffère par ses feuilles distinctement dentées à leur sommet, par la brièveté et l'épaisseur des tiges.

4. Type : Microphylla.

7. MICROPHYLLA, Spring., *Enum. Lycop.*, n° 158, *ejusd. Monogr.*, II, p. 88, *S. thuyæfolia, ejusd. in Mart. et Endl. Fl. Bras.*, I, p. 120. *Lycopodium microphyllum*, Kth. *Syn. pl. Æquin.*, I, p. 96. Prov. de Rio-Grande. — Petite plante gazonnante, très-féconde; épis quadrangulaires, à écailles lâchement imbriquées; nous ne l'avons pas vue provenant du Brésil.

5. Type : Cæspitosa.

8. ERECTIFOLIA, Spring., *Monogr.*, II, p. 92. Brésil; Swainson (Herb. Hook.). — Stolonifère, à radicules extérieures réfractées; rameaux inférieurs distiques, divergents, étalés; épis quadrangulaires, courts. (N. V.)

6. Type : Porelloides.

9. muscosa, Spring., *in Mart. et Endl. Fl. Bras.*, I, p. 120; *Monogr.*, p. 100; province Saint-Sébastien, Luschnath (H. Mart.). — Plante délicate, flasque, gazonnante, tige rampante, à rameaux dressés; épis tétragones, à bractées larges et acuminées. (N. V.)

7. Type : Jungermannioides.

10. Jungermannioides, Spring., *in Endl. et Mart. Fl. Bras.*, I, p. 121; *Monogr.*, p. 117. *Lycopodium Jungermannioides*, Gaud., *in Freyc. Voy.*, I, p. 286. *L. marginatum*, Radd., *Fl. Bras.*, p. 82, t. 1, f. 2 (*ex parte*). Rio-Janeiro, Langsdorff; Martius; Gaudichaud; Forbes; Glaziou, n° 462, *partim;* île Sainte-Catherine, Durville; Brésil méridional, Claussen. — Tige radicante, rampante, irrégulièrement quadrangulaire; feuilles intermédiaires ovales, courbées en faux, ciliées, marginées de blanc; épis courts, quadrangulaires, à bractées carénées, ciliolées.

11. Breynii, Spring., *in Mart. et Endl. Fl. Bras.*, I, 121. *Monogr.*, II, p. 119. *Lycopodium atrovirens*, Presl., *Reliq. Haenk.*, I, p. 79, t. 12, f. 2. *L. marginatum*, Radd., *Fil. Bras.*, p. 82, t. 1, f. 2 (*ex parte*). *L. plumosum*, Schkh., *Crypt. Gew.*, t. 165, f. 4. Rio-Janeiro, Radd.; Glaziou, n° 462, *partim;* Brésil équatorial, Martius. — Tiges radicantes, à rameaux distiques, aplatis; feuilles opaques, à base ciliée; épis atteignant 1 centim. de long, géminés, courbes, linéaires, et d'un vert intense.

8. Type : Ericina.

† 12. ericoides, F.

Caule ramoso, repente, radicante, radiculis tenuibus, ramis approximatis, elongatis, foliis opacis, intense viridibus, obovatis, integris, intermediariis carinatis, ovoideis, acutis, lateralibus parum minoribus; spicis terminalibus, geminis, quadrangularibus, bracteis obovatis, acutis, carinatis, laxe imbricatis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2243).

Selaginella facie ericoidis, unde nomen, siccitate atrovirens.

Icon. : *Tab. LXXV, fig. 2.*

(Longueur, 20-24 centim. [sans doute variable]; rameau latéral, le plus grand, 12 centim.)

Elle est rude au toucher, tripinnée, à rameaux irréguliers, à radicelles presque sétacées, très-feuillue, les caulinaires rapprochées. Elle a, desséchée, l'aspect du *Fontinalis antipyretica*, L. Le port est tout spécial parmi les congénères de cette espèce curieuse.

9. Type : DIDYMOSTACHYA.

13. FLEXUOSA, Spring., *in Mart. et Endl. Fl. Bras.*, I, p. 122; *Monogr.*, p. 131. *Lycopodium stoloniferum*, Radd., *Fil. Bras.*, p. 81, t. 2 (*syn. exclus.*). *L. Brasiliense*, Desv., *Prodr.*, VI, p. 190; Glaziou, Rio-Janeiro, n° 1645; Lagoa-Santa (Minas-Geraes), Warming; île Sainte-Catherine et ailleurs, par divers collecteurs. — Tiges allongées, radicantes, arrondies; rameaux en éventail; feuilles latérales obtuses, très-entières; les intermédiaires 3 fois plus petites; épis de 1 centim. de long; ils sont rudes au toucher.

14. MACROSTACHYA, Spring., *in Endl. et Mart. Fl. Bras.*, I, p. 123. *Monogr.*, II, p. 133. Brésil, Sellow. — Tiges allongées, rampantes, radicantes, légèrement tétragones, très-feuillues, presque en pyramide; à rameaux divergents; feuilles latérales ovales, aiguës, à pointe très-raide; épis, 2 centim., linéaires, quadrangulaires, à bractées ovales, deltoïdes et carénées.

15. GARDNERI, Spring., *Monogr.*, II, p. 134; Serra os Orgaos, Gardner (H. Hook.); Glaziou, Rio-Janeiro, n° 916. — Tiges couchées, inégalement tétragones, à rameaux distiques; feuilles latérales ovales, oblongues, horizontales, les intermédiaires 3 fois plus petites; épis quadrangulaires, de 5-6 millim. de long, avec des bractées ovales ventrues.

† 16. CAMPTOSTACHYS, F.

Ramosa, bipinnata, caulibus filiformibus, ramosis, basi radicantibus, radiculis capillaribus; foliis lateralibus ovatis, carinatis, integris, acutiusculis; intermediis duplo minoribus, plicato-carinatis, omnibus imbricatis; spicis linearibus, quadrangularibus, ornithopodiaceis, flexuosis, numerosis, terminalibus axillaribusque.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 2242).

Facie singulari, spicis longis, curvatis notata.

ICON. : *Tab. LXXV, fig. 3.*

(Longueur, 12-13 centim.; elle est nue dans le tiers inférieur de son étendue; ses plus grands rameaux mesurent 7 centim.)

Ses rameaux sont dressés et ses radicelles presque aussi déliées que des crins; elle est très-férace, et ses épis qui dépassent 1 centim. sont notablement courbés, les uns en dedans, les autres en dehors; elle prend, étant desséchée, une teinte verte assez intense.

10. Type : LÆVIGATA.

17. LÆVIGATA, Spring., *in Mart. et Endl. Fl. Bras.*, I, p. 125. *Lycopodium*, Willd., *Fil.*, p. 45. *L. Willdenowii*, Desv., *Encyc. bot. supp.*, III, 525; Hook et Grev., *Icon.*, n° 59; Saint-Sébastien et Saint-Paul, Martius. — Tige allongée, grimpante, pouvant atteindre jusqu'à 4 mètres, canaliculée, distique, rameuse; feuilles latérales linéaires, oblongues, planes; les intermédiaires 3 fois plus courtes; épis allongés, acuminés de 7-8 millim. jusqu'à près de 2 centim.

11. Type : INÆQUALIFOLIA.

18. BAHIENSIS, Spring., *l. c.*, I, p. 124, et *Monogr.*, II, p. 153; Brésil septentr., près de Bahia, Blanchet, et à Igreja-Velha (H. F.). — Tiges ascendantes, quadrangulaires, ridées par la dessication; feuilles latérales denticulées, à marge réfléchie; les intermédiaires 4-5 fois plus petites; épis quadrangulaires de 5-6 millim. de longueur.

19. ERYTHROPUS, Spring., *l. c.*, I, p. 125, et *Monogr.*, II, p. 156. *Lycopodium erythropus*, Mart., *Icon. crypt. Bras.*, p. 39, t. 20, f. 3; Piauhy, Martius et Gardner; Goyaz, Pohl; Minas-Geraes, Claussen (H. F.); Rio-Janeiro, Glaziou, n° 461 ; Lagoa-Santa, Warming. — Tiges tétragones stolonifères, à rameaux pinnés, très-feuillus. Elle est facile à reconnaître à la couleur rouge de la base de ses tiges. Les épis sont courts, nombreux, de 4-6 millim. de longueur.

12. Type : CAULESCENS.

20. COARCTATA, Spring., *l. c.*, I, p. 126, et *Monogr.*, II, p. 164. *Lycopodium coarctatum*, Martius (Herb. Monac.); mont Arara-Coara; province de Rio-Negro, Martius. — Tige allongée, droite, légèrement tétragone, pouvant atteindre 33 centim. de longueur, de la grosseur d'une plume de corbeau; rameaux droits, feuilles raides, dures; épis solitaires très-courts, ovales.

13. Type : FLABELLATA.

21. AMAZONICA, Spring., *l. c.*, p. 124, t. 6, et *Monogr.*, II, p. 176; région de l'Amazone, Rio-Negro et Para, Martius (Herb. Monac.). — Tige radicante, exactement tétragone; rameaux primaires divariqués; les secondaires très-

élégamment plumeux; feuilles raides d'un vert obscur. Épis assez longs (4-5 millim.); flasques recourbés, nombreux, à bractées ovales lancéolées, longuement acuminées. (N. V.)

14. Type : DECOMPOSITA.

22. DECOMPOSITA, Spring, *l. c.*, I, p. 123, et *Monogr.*, II, p. 196. Serra os Orgaos, Guillemin. — Tiges de la grosseur d'une plume de corbeau, très-rameuse et très-feuillée, mesurant un demi-mètre; elle porte des radicules assez grosses et fort raides; les feuilles sont un peu rudes, dimorphes; les latérales légèrement recourbées en dedans, ovales oblongues, très-finement denticulées; les intermédiaires, du double moins grandes, sont courbées en faux et aristées; épis solitaires de 6 millim. de longueur, avec des bractées carénées, ovales-acuminées.

15. Type : STOLONIFERA.

23. MARGINATA, Spring., *in Bot. Zeit.*, 1838, I, p. 194; *Monogr.*, p. 211. *Lycopodium marginatum*, H. et B., *in Willd. Filic.*, p. 41, Minas-Geraes et Goyaz, Pohl; Minas-Geraes, Claussen. — Tige très-longue, radicante sur toute son étendue, distique, rameuse, dichotome; feuilles ruguleuses, finement ponctuées; épis linéaires, quadrangulaires; bractées ovales, longuement acuminées.

24. DISTORTA, Spring., *in Endl. et Mart. Fl. Bras.*, p. 128, et *Monogr.*, II, p. 213. Brésil intertropical, Sellow; Minas-Geraes, Martius; Saint-Sébastien, Langsd. (Herb. Mart.). — Tiges couchées, lisses, brillantes, noueuses, rameaux étalés à angle droit; feuilles opaques, un peu épaisses, ruguleuses; les intermédiaires plus petites, ovales, oblongues, très-entières; épis mesurant 5-6 millim., à bractées ovales acuminées, presque cordiformes.

25. EXCURRENS., Spring, *l. c.*, p. 128, et *Monogr.*, II, p. 214; Brésil, Minas-Geraes, Sellow, Ackermann; Rio-Grande, Tweedie. — Tige radicante dans toute son étendue, tétragone; feuilles raides, brillantes, d'un vert foncé; les intermédiaires 3 fois plus petites, ovales, aiguës, très-entières; épis inconnus.

16. Type : SULCATA.

26. SULCATA, Spring., *Bot. Zeit.*, 1838, I, p. 184. *L. sulcatum*, Desv., *Encyc. méth. supp.*, III, 549. *L. stoloniferum*, hortul. Très-commune au Brésil et ré-

coltée par un très-grand nombre de botanistes; Glaziou, Rio-Janeiro, nº 915, et Sainte-Catherine, H. Gauthier (H. F.); Nouvelle-Fribourg, Claussen. — Tiges de 30 centim. et plus, de la grosseur d'une plume de corbeau, rampantes, à nombreuses radicules; rameaux divergents, étalés; feuilles latérales oblongues, aiguës; les intermédiaires 3-4 fois plus petites, en pointe aristée; épis solitaires, tétragones, atteignant 9-11 millim. de long; bractées longuement acuminées.

27. SUAVIS, Spring., *l. c.*, 1838, I, p. 185, et *Monogr.*, II, p. 216. Prov. Saint-Sébastien, Sommer, Pohl; Martius, au Morro-Formoso, prov. Saint-Paul; Brésil mérid., Sellow. — Tige s'élevant à 30 centim. environ, tétragone, radicante dans son étendue, striée, rameaux distiques, très-flasques, plusieurs fois dichotomes; feuilles caulinaires écartées; les latérales oblongues, ensiformes; les intermédiaires 3-4 fois plus petites, marginées de blanc; épis, 5-6 millim. de longueur; bractées longuement acuminées, carénées, blanchâtres.

28. PŒPPIGIANA, Spring., *l. c.*, p. 185, et *Monogr.*, II, p. 217. *Lycopodium Pœppigianum*, H. et Gr., *in Bot. misc.*, III, p. 106. Kze., *Fil. Pœpp. in Linnæa*, 1834, p. 11. Brésil, Serra de Cubatao, Guillemin; Ilheos, prov. Bahia. (H. P.) — Tige allongée, tétragone, rugueuse par dessiccation; feuilles opaques; les latérales linéaires oblongues, les intermédiaires fortement imbriquées, denticulées vues à la loupe, cordiformes à la base, inégalement bi-auriculées; épis courts, 2-5 millim., avec des bractées longuement acuminées, pâles et en carène.

† 29. GLAZIOVI, F.

Caule elongato, passim radicante, nodis vix prominentibus; radiculis brevibus, coloratis, in axillis ramorum nascentibus; ramis flaccidis, rachibus in parte superiori rubescentibus, dichotomis; foliis opacis, integerrimis, lateralibus oblongis, acutis, siccitate leviter undulatis, intermediis duplo minoribus, obovatis, abrupte acutis; caulinis remotissimis, oblongis, integris, basi ciliatis; spicis ovoideis, brevibus subquadrangularibusque; bracteis carinatis, lanceolatis, laxe imbricatis, acuminatis.

Habitat in Rio-Janeiro (Glaziou, nº 2244).

Selaginella formosa, flexibilis, rachibus depressis, striatis, purpurascentibus.

Icon. : *Tab. LXXV, fig. 4.*

(Longueur totale, qui doit être variable, 40-45 centim.; rameaux, 10-12 centim.)

Cette espèce est fort belle, très-souple, dichotome et remarquable par des rachis déprimés, striés et purpurescents; les feuilles sont opaques, très-rapprochées; les raméales plus développées que les autres, laissant entre elles un intervalle de 7-9 millim.; les radicelles sont très-raides et relativement assez grosses. Elle a quelque analogie avec le *S. Pœppigiana,* Spring.

17. Type : Stellata.

30. stellata, Spring., *in Endl. et Mart., Fl. Bras.*, I, p. 129, t. 8, et *Monogr.*, II, p. 228. *Lycopod. stellatum* et *stoloniferum*, Willd., *Herb.*, n° 19392, f. 1. Région de l'Amazone, prov. de Para, Martius, Sieber, Natterer. M. A. Braun en fait un *Selaginella calcarata.* — Tige allongée, rampante, émettant parfois, au lieu de rameaux, de longs stolons, qui prennent toutes les directions; rameaux distiques et leurs divisions dichotomes; feuilles un peu rudes, d'un vert gai, glaucescentes en dessous, ovales-lancéolées, longuement acuminées, les intermédiaires 4 fois plus petites et courbées en faux; épis 5-8 millim., quadrangulaires, avec des bractées ovales, acuminées, carénées et denticulées.

31. conduplicata, Spring., *l. c.*, p. 129, et *Monogr.*, II, p. 229. Région de l'Amazone, prov. de Para, Martius (H. Monac.). — Tiges de la dimension d'un gros fil; elle a la forme d'un nid d'oiseau; les feuilles, d'un vert obscur, portent à leur surface un petit point plus ou moins coloré; les intermédiaires sont 3-4 fois plus petites et en faux; les épis atteignent 10-12 millim. de long, avec des bractées très-entières et longuement acuminées. Elle est fort élégante.

3. PSILOTUM, Sw., *in Schrad. Journ.*, 1800, II, p. 109 et 132.

1. triquetrum, Sw., *Syn. filic.*, p. 187; *Bernhardia, Hoffmannia, Ipphia, Buchozia, Garsaultia, auct. plurim.* Rio-Janeiro, au Corcovado; Saint-Sébastien; Minas-Geraes. Glaziou, n° 2798, Serra os Orgaos. — Cette espèce est des plus répandues.

III. HYDROPTÉRIDÉES.

I. SALVINIACÉES.

Bartl., *Ord. natur.*, 15. Mart., *Pl. crypt. Brasil.*, p. 123.

1. AZOLLA, Lmrk., *Dict. encyc.*, I, 343, et *auct.*

1. MAGELLANICA, Willd., *Filic.*, p. 541; Klfss., *Enum.*, p. 273. *A. filiculoides*, Lmrk., *l. c. A. arbuscula*, Desv., *Prodr.*, p. 178. Rio-Janeiro, Howard (H. F.), Glaziou, n° 2442. Metten., *Linn.*, XX, p. 275, t. 3, f. 16 et 21, *particulæ*. — *Receptacula ovuligera, ovato-conica; massæ pollinis sex, processibus glochidiatis, exarticulatis instructæ. Folia superiora oblongo-ovata, obtusiuscula, papillosa* (Metten., *l. c.*). — Petite plante aquatique, écailleuse, très-élégante. Port des mousses; radicules flottantes, très-longues.

2. MICROPHYLLA, Klfss., *Enum.*, p. 273. *Salvinia Azolla*, Radd., *Pl. Bras.*, p. 2, t. 1, f. 3. Mart., *Icon. select. pl. crypt.*, p. 124, t. 74 et 75; Metten., *Linn.*, XX, p. 276, t. 3, f. 3-8. Martius, prov. Saint-Sébastien et ailleurs. — *Receptacula ovuligera, oblongo-ovata; massæ pollinis sex, processibus glochidiatis, articulatis instructæ. Folia inferiora oblique ovata, obtusiuscula, papillosa* (Metten., *l. c.*). — Port de l'espèce précédente.

2. SALVINIA, Mich., *Nov. gen.*, 107, t. 58.

1. HISPIDA, H. Bonpl., Kth., *Nov. gen.*, I, p. 44. Eaux du Brésil, par Commerson, *teste* Bory. (H. F.) — Feuilles ovoïdes, elliptiques, striées, stries parallèles en saillie, pétioles pubescents, ainsi que la surface inférieure des lames, qui sont transparentes.

2. ROTUNDIFOLIA, Willd., *Filic.*, p. 537. Hoffmannsegg, *ex* Willd. Howard, 1843. (H. F.) Glaziou, Rio-Janeiro, 2443. — Feuilles presque rondes en cœur, obtuses; sporanges ovales, en grappe, pédoncules soyeux, lames à surface papilleuse; radicules courtes. Feuilles de moitié plus petites que celles de l'espèce précédente.

NB. Raddi, *Fil. Bras.*, p. 1, t. 1, f. 4, a décrit et figuré un *Salvinia biloba*, trouvé dans les fossés de Rio-Janeiro; ce n'est rien autre chose qu'une variété du *S. rotundifolia*.

3. OBLONGIFOLIA, Mart., *Icon. select. Bras.*, p. 128, t. 75, f. et t. 76. Santa-Maria de Belem et Para (*ex* Martio). — Feuilles linéaires-oblongues, papilleuses en dessus, pubescentes en dessous. Sporocarpes en grappes à la base des feuilles.

II. MARSILÉACÉES.

Bartl., *Ord. natur.*, 15.

1. MARSILEA, L., *Gen. pl.*, n° 1184.

1. BRASILIENSIS, Mart., *Icon. crypt. Bras. select.*, p. 122, t. 73, f. 2. Bahia, Mart., *l. c.* — Feuilles obovées cunéiformes, très-entières, glabriuscules, ainsi que les pétioles, à la base desquels s'attachent les sporocarpes, au nombre de 7-9; ceux-ci sont arrondis et villeux.

IV. ÉQUISÉTACÉES.

DC., *Fl. fr.*, II, 580; Vauch., *in Mens. Soc. hist. nat. Genev.*, I, 330.

1. Brasiliense, Milde, *Verh. der zool.-bot. Ges. in Wien*, 1862; voisin de l'*E. giganteum*. — On en trouve une mauvaise figure dans la *Flora fluminensis*, t. 51, sous le nom d'*E. giganteum*, L. Nous possédons cette plante depuis plus de 40 ans, sous le nom d'*E. Tussaci*. — C'est la plus grande et la plus belle de tout le genre.

2. Martii, Milde, *Monogr. Equiset.*, t. 20. Province des Mines, par Martius et par Gardner. — Espèce voisine de la précédente; tige rude, sillonnée, portant 16-40-52 sillons, à vallécules très-étroites; rameaux très-rapprochés à 7-9 angles; gaînes allongées, dilatées, à dents linéaires subulées, épiderme chargé de granules, avec 2-5 séries de stomates.

3. pyramidale, J. G. Goldmann, *in F. Meyenii Observ. in nov. act.*, XI, *Suppl.* 1 (1843), p. 469. Milde, *Monogr. Equiset.*, t. 22. Brésil. — Plus petite que la précédente, mais plus robuste; tiges rudes, sillonnées, portant 16-24 sillons, avec des vallécules étroites et convexes; rameaux verticillés, au nombre de 7-9; épiderme chargé de granules; 2 à 4 séries de stomates.

APPENDICE.[1]

---

1. ACROSTICHUM, F. (Page 1.)

7. CONSOBRINUM, Kze. (Page 2.)
Glaziou, n°s 3157 et 3317. Ce dernier numéro avait été rapporté, page 1, comme appartenant à l'*A. latifolium*, Sw.

14. MINUTUM, Pohl. (Page 5.)
Glaziou, n° 3316, Serra os Orgaos (juin 1869). — Espèce cartilagineuse, opaque; atténuée vers les deux extrémités des frondes; nous ne l'avons vue que stérile. Le rhizome est assez gros et très-écailleux; il s'applique sur les écorces.

† 20. GLAZIOVI, F. (Page 6.)
Serra os Orgaos, n° 3324.

† 24. ERINACEUM, F. (Page 8.)
Glaziou, Serra os Orgaos, n° 3321 (juin 1869) et n° 3320, même localité, petite forme. — Belle espèce, à gros rhizome; frondes acuminées, élégamment ciliées, arrondies à la base; souples et transparentes.

---

1. Les espèces nouvelles décrites dans cet appendice proviennent toutes d'un dernier envoi qui nous est parvenu au commencement de juillet de cette année.

† 24². HIRTIPES, F.

Frondibus sterilibus lanceolatis, obtusiusculis, basi cuneatis, laminis squamosis, squamis linearibus, inferne dilatatis, marginibus repandis, ciliatis; fertilibus vix longioribus, lamina ellipsoidea, obtusissima, petiolis in utrisque debilioribus, stramineis, filiformibus, squamis angustis, patulis, rufescentibus; sporangiis tabacinis; annulo lato, 12 articulato; sporis ovoideis, episporiatis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Serra os Orgaos, Glaziou, n° 3323; juin 1869).

Filix tenera, translucida, membranacea, repens; nervillis apice turgidis, marginem non attingentibus.

ICON.: *Tab. LXXVI, fig. 1.*

(Longueur : Frondes stériles, 30 centim. sur 20-22 millim. de largeur, avec un pétiole de 12 centim. Frondes fertiles, de même longueur ou à peine plus grandes; la lame mesure 6 centim. sur 10-11 millim. de largeur.)

Le rhizome est rampant et chargé d'écailles linéaires piliformes, un peu élargies à la base; les pétioles sont stramineux et hérissés d'écailles fauves que l'on retrouve sur les deux lames et le long des marges sous l'aspect de cils.

† 25². STRAMINEUM, F.

Frondibus sterilibus lanceolatis, acuminatis, papyraceis, basi tunc cuneatis, tunc rotundis; mesonevro superne et inferne anguste canaliculato, squamoso; squamis lanceolatis, rufis, petiolis stramineis, squamosis, debilibus flexuosisque; fertilibus ovalibus, obtusissimis, basi cordatis, petiolo longo debiliori, rhizomate repente; sporangiis rotundis, tabacinis, membranula tenui sterili circumdatis; annulo 12 articulato, sporis ovoideis, fuscis, granulis minutis extus coopertis, perfacile solutis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Serra os Orgaos, Glaziou, n° 3322).

Filix tenera, flexibilis, nervillis apice turgidis, marginem non attingentibus.

(Longueur : Frondes stériles pouvant atteindre 70 centim. sur un peu moins de 3 centim. de largeur, avec un pétiole de 14-17 centim. Frondes fertiles, 40 centim. et plus; la lame ne dépasse pas 7 centim.)

Cette espèce se rapproche de l'*A. gratum*, F. La disproportion des lames fertiles et stériles est considérable. Les spores couvertes de granules à l'extérieur de-

viennent facilement libres. Nous ne connaissons pas de fait analogue dans l'examen microscopique auquel nous nous sommes livré en étudiant les autres espèces de fougères.

41. Langsdorffii, Hook. et Gr. (Page 11.)

Serra os Orgaos, n° 3319 (juin 1869). — Très-belle et très-grande espèce, couverte d'écailles; mésonèvre très-large. Les écailles de la lame fertile inférieure forment trois rangées très-distinctes. Cette fougère mesure 1 mètre; la lame stérile n'a pas moins de 6 centim. de largeur.

43. cuspidatum, Willd. (Page 12.)

Glaziou, Serra os Orgaos, n° 3318 (juin 1869). — Elle justifie très-bien le nom spécifique, mais ici, au lieu de voir des frondes linéaires-lancéolées, atténuées aux deux extrémités, nous trouvons des frondes oblongues, arrondies à la base et très-souples. Nous ne l'avons vue que stérile. Peut-être est-ce une espèce distincte?

10. CHRYSODIUM, F. (Page 18.)

3. danææfolium, Langsd. et Fisch., *sub acrosticho*, p. 5, t. 1. F., *Hist. acrost.*, p. 101. Sainte-Catherine, Brésil mérid. — Cette espèce est plus petite que ses congénères. Les frondes sont très-glabres avec des frondules obtuses très-entières, à mailles pentagonales. Quoique la figure citée soit très-bonne, il faut attendre pour confirmer la légitimité de cette espèce.

11. LOMARIA, Willd. (Page 20.)

3*. Fialhoi, F. et Glaz.

Frondibus lanceolatis, glaberrimis, ad imum surculi congestis; sterilibus profunde pinnatifidis, teneris, petiolis tenuibus, sulcatis, basi nigrescentibus, rufescentibus, apice longe decrescentibus; segmentis adnatis, lanceolatis, acutis, ultimis deflexis, basi superne subauriculatis, marginibus eleganter argute dentatis, dentibus longiusculis, fertilibus minoribus, segmentis linearibus, remotis; sporangiis totam superficiem laminarum invadientibus, rufescentibus, annulo lato, 18-20 articulato; sporis trigonis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Serra os Orgaos), Glaziou, n° 3326.

Filix extensa, formosa, membranacea, petiolis debilibus.

Icon. : *Tab. VII, fig. 2.*

(Longueur : La plus grande fronde stérile mesure 1 mètre 13 centim., le pétiole est à la lame :: 2 : 5; les segments du centre, 8 centim. sur 9 millim. de largeur; ils sont séparés par des sinus ayant en moyenne 9-10 millim.; ils s'élargissent dans le bas de la plante.)

Cette espèce est fort belle, très-distincte de ses congénères, très-souple, transparente, les nervilles sont bifurquées; elles se détachent du mésonèvre et déterminent, en sortant de la lame, des dents nombreuses assez longues qui donnent à la plante un aspect particulier. Elle consacre le nom de M. Fialho, protecteur dévoué de la botanique et de l'horticulture brésiliennes. M. Martius a eu particulièrement à se louer du zèle dont il a fait preuve lors de la publication de la *Flora Brasiliensis.*

13. SALPICHLÆNA, J. Sm. (Page 26.)

1. VOLUBILIS, Klfss., *sub blechno.* Glaziou, Serra os Orgaos, n° 3338 (juin 1869).

26. LITOBROCHIA, Presl. (Page 45.)

† 1². ORGANENSIS, F.

Frondibus pinnatis, glaberrimis; stipite lævi, purpurascente; frondulis breve petiolatis, suboppositis, remotis, assurgentibus, curvatis, lanceolatis, marginibus incrassatis, apice argute serratis, basi vix inæqualibus, novellis sæpe trifoliatis; frondibus fertilibus multo longioribus, apice trifoliatis, minoribus; sporotheciis continuis, apicem non attingentibus, indusio persistente, crassiusculo; sporangiis rotundatis, annulo lato, 18-20 articulato; sporis trigonis, magnis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Serra os Orgaos, Glaziou, n° 3329; juin 1869).

Filix elata, nervatione elegantissima, scalpturata; frondulis paucis, suboppositis.

(Longueur des frondes fertiles, 40 centim., avec un pétiole de 30 centim.; les frondules stériles ne dépassent pas 9 centim., mais la terminaison n'a pas moins de 13 centim. sur 2 centim. de largeur.)

Cette plante se rapproche du *L. splendens,* mais on peut la distinguer de cette dernière espèce par le port, la nervation moins régulière, la courbure des frondules, oblongues et arrondies à la base.

17. PALLIDA, Presl. (Page 50.)

Pteris pallida, Radd. Glaziou, Serra os Orgaos, n° 3330. — Cette fougère est très-voisine du *Litobrochia elegans;* dans le *L. pallida,* les sporothèces, très-peu étendus, occupent le sinus qui sépare les segments et s'élèvent très-peu au-dessus; dans le *L. elegans,* ils partent de la marge pour ne finir que très-près du sommet; le n° 1742 de M. Glaziou est plutôt le *L. elegans* que le *L. pallida.*

36. ANTROPHYUM, Klfss. (Page 57.)

2. LINEATUM, Klfss. Glaziou, Serra os Orgaos, n° 3344 (juin 1869).

41. ANOGRAMME, Lk. (Page 61.)

† 2. BIARDII, F.

Frondibus extensis, tripinnatis, glaberrimis, sarmentosis, petiolo flaccido, rachibusque puniceis; frondulis primariis breve petiolatis, subtriangularibus, assurgentibus; secundariis pinnatifidis, segmentis planis, bidentatis, dentibus obtusiusculis; sporotheciis ovideis, distinctis, geminis; sporangiis magnis, rotundis, annulo lato, 20-24 articulato; sporis trigonis fuscescentibus.

Habitat in Brasilia fluminensi (Serra os Orgaos, Glaziou, n° 3331, juin 1869).

Filix delicatula, elata, apice attenuata, cuticula stomatifera.

ICON.: *Tab. LXXVII, fig. 1.*

(Longueur: Cette fougère élégante peut atteindre 1 mètre dont le pétiole fait le tiers environ; les frondules primaires mesurent 8 centim. et 6 centim. d'envergure à la base.)

La faiblesse des pétioles et du rachis permet de croire que cette fougère doit chercher un appui sur les plantes dans le voisinage desquelles elle vit. Ses tiges et le rachis des frondules primaires ne sont point fléchis en zig-zag comme dans l'*A. refracta* du Pérou et de la Colombie; elle n'est point velue comme l'*A. petroselinum* de Venezuela, dont les segments sont très-élargis; enfin elle diffère de l'*A. bifida* par le port et la forme des segments, qui sont linéaires.

Nous dédions cette espèce à M. Biard, artiste distingué qui, après avoir exploré le Brésil en 1858 et 1859, a montré, en publiant la relation de son voyage, que sa plume était aussi spirituelle que son pinceau.

43. ASPLENIUM, L. (Page 61.)

22. AURITUM, Sw. (Page 67.)

Var. E, *macilentum*. Glaziou, Serra os Orgaos, n° 3345.

50. POLYPODIUM, L. (Page 85.)

† 1². GRATUM, F.

Frondibus lanceolatis, profunde pinnatifidis, basi et apice decrescentibus, petiolo mesonevroque cylindricis, hirsutis, atro-fuscis; rhizomate crasso, squamis brunneis obsito, radiculis plumosis, segmentis oblongis, obtusis, basi latioribus, sinu angusto separatis, supra puncta calcarea ferente; nervillis simplicibus, marginem non attingentibus, sporotheciis submarginantibus, 14-16 seriatis; sporangiis sporisque rotundatis; annulo crasso, 12-14 articulato.

Habitat in Brasilia fluminensi (Serra os Orgaos, Glaziou, n° 3336; juin 1869).

Filix habitu Polypodii vulgaris, *L., sed major, stipite, situ sporotheciorum, nervillis simplicibus diversissima.*

ICON. : *Tab. LXXVI, fig. 2.*

(Longueur, 45-48 centim. sur 6 centim. d'envergure au centre; largeur des segments à la base, 6-7 millim.)

Espèce allongée, glabre, dont le pétiole fait le cinquième de la longueur totale; nervilles simples, dont le sommet est indiqué sur la lame supérieure par une écaille calcaire arrondie, noirâtre au centre.

8². PERUVIANUM, Desv., *Ann. Linn. Par.*, VI, p. 32; H. et Gr., *Icon.*, n° 223. *P. stipitatum*, H. et Gr., *Bot. misc.*, 2, 239. Reçue de M. Glaziou, sous le n° 3342, Serra os Orgaos. — Petite espèce glabre, légèrement cartilagineuse, opaque; sporanges logées dans une dépression de la fronde. Elle rappelle un peu, par le port, l'*Asplenium Trichomanes*, L.

10. SERRICULA, F. (Page 89.)

N° 2414; retrouvée aux Orgaos par Glaziou, n° 3341.

† 23. HETEROCLITUM, F. (Page 93.)

Belle espèce pectinée, reçue sous le n° 3339. Elle mesure jusqu'à 36 centim. Le nombre des segments peut dépasser 90; ils diffèrent de longueur et de largeur sur une même fronde. C'est une plante délicate, souple et élastique. Nous ne l'avions vue d'abord que tronquée; elle est pinnatifide jusqu'au sommet, avec des segments qui conservent leurs dimensions jusqu'à la base ou qui parfois diminuent notablement.

29. CULTRATUM, Willd. (Page 94.)

Serra os Orgaos, n° 3343, Glaziou (juin 1869).

51. PHEGOPTERIS, F. (Page 96.)

† 14 [2]. BREVINERVIS, F.

Frondibus oblongis, pinnatis, apice pinnatifidis, glabris, petiolis helveolis, rachibus depressis, pluri-canaliculatis, frondulis mollibus, assurgentibus, oblongo-lanceolatis, inferioribus suboppositis, petiolatis, deinde sessilibus, ultimis adnatis, basi breve curvatis, segmento superiori majori, apice attenuato, margine grosse dentato, dentibus rotundatis, mesonevro tenui; nervillis brevibus, simplicibus, marginem non attingentibus, basilaribus flexuosis, aliquando conniventibus, sporotheciis serie duplici, inter nervillas transversales sitis, laminam superiorem inquinantibus; sporangiis rotundis, annulo lato, 18-20 articulato; sporis nigrescentibus, crassis rotundisque.

Habitat in Brasilia fluminensi (Serra os Orgaos, Glaziou, n°s 2400 [*partim*], à frondules étroites, et 3333, à frondules plus larges; juin 1869).

Filix magna, glabra, flexibilis, translucida, rachi helveolo.

ICON. : *Tab. LXXVII, fig. 2* (*fragmentum*).

(Longueur, 65 centim. sans le pétiole, qui manque à notre spécimen; les frondules de la base mesurent 20 centim. sur un peu plus de 3 centim., avec des entre-nœuds de 5 centim.; nous comptons au delà de 24 paires de frondules.)

Cette espèce se fera reconnaître au segment supérieur de la base de ses frondules, plus long que les autres, à sa souplesse et surtout à ses nervilles très-

courtes, celles du bas flexueuses, ayant une disposition manifeste à la connivence; les mailles qui en résultent sont irrégulières et bizarres d'aspect. Nous l'avions seulement indiquée page 105.

53. GONIOPHLEBIUM, Presl. (Page 107.)

† 7². PICTUM, F.

Frondibus pinnatifidis, pectinatis, obovatis, apice abrupte caudatis, glaberrimis, petiolo articulato, lævissimo, lutescente, canaliculato, rachi tenui, sulco angustissimo percurso; segmentis lanceolatis, patulis, basilaribus, reflexis, adnatis, inferne contractis, basi superiori gibboso; nervillis monoarcuatis, nervilla proligera extra axillari, omnibus eleganter scalpturatis; sporotheciis uniseriatis rotundis, receptaculo punctiformi, laminam superiorem inquinantibus; sporangiis rotundis, longe pedicellatis, annulo lato, 12-14 articulato, articulis remotiusculis, roseis; sporis rotundatis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Serra os Orgaos, Glaziou, n° 3335, juin 1869).

Filix aspectu Polypodii vulgaris, *L., sed major et nervillis anastomosantibus.*

ICON.: *Tab. LXXVII, fig. 3.*

(Longueur, 50 centim., dont le pétiole fait le tiers; segments au centre, 8-9 centim. sur 8-9 millim. de largeur; les sinus ont 6-7 millim. d'ouverture. Nous comptons environ 30 segments, chacun d'eux portant une trentaine de sporothèces. Nous avons un spécimen de moindre dimension.)

Cette espèce est remarquable par la nervation qui s'étale en relief sur la lame supérieure; toutes les nervilles libres sont légèrement renflées au sommet, qui devient ponctiforme et transparent. Les segments atteignent le rachis, sur lequel elles s'attachent par une large base; les paires inférieures sont réfléchies. La fronde se rétrécit brusquement au sommet en une sorte de queue; le rhizome est rampant. Cette fougère a quelque analogie de port avec le *G. latipes*, Presl.

† 16². EXCELSIOR, F.

Frondibus repentibus, extensis, oblongis, glabris, petiolo valido, unisulcato, rachi tricanaliculato, breve piloso; frondulis lanceolatis, medianis et inferioribus liberis, basi subcordatis, acuminatis, patulis, versus apicem curvatis, supremis adnatis, omnibus marginibus repandis; nervillis undulatis, scalpturatis, areolis tribus, nervillam rectam apice albido-calcareo feren-

tibus; sporotheciis rotundis, biserialibus, laminam superiorem inquinantibus; sporangiis parvulis, annulo 12 articulato; sporis reniformibus.

Habitat in Brasilia fluminensi (Serra os Orgaos, Glaziou, n° 3334, juin 1869).

Filix altissima, ampla, albo-punctata, punctis carbonati calcis ad apicem nervillarum rectarum sedentibus.

Icon. : *Tab. LXXVII, fig. 4.*

(Longueur, 1 mètre et plus, dont le pétiole fait le tiers environ; frondules centrales, 18-20 centim., sur 2 centim. de largeur à la base; les inférieures opposées un peu plus courtes; nous en comptons 25 paires.)

Cette fougère est de très-grande taille, à segments souples, très-ouverts, arqués vers leur tiers supérieur et un peu transparents; toutes les nervilles droites, qui naissent au sommet des aréoles, se chargent de petites lames écailleuses de carbonate de chaux, comme dans le *Polypodium albo-punctatum*, Raddi, *Filic. Brasil.*, tab. 30. Notre plante en diffère par la nervation, par des frondules alternes presque cordiformes à la base, très-couvertes et arquées, enfin par une fronde pinnatifide vers le tiers supérieur.

54. CAMPYLONEVRON, Presl. (Page 113.)

6. FALLAX, F. (Page 114.)

Serra os Orgaos, Glaziou, n° 3337 (juin 1869).

57. DRYNARIA, Bory. (Page 120.)

4. LEPIDOTA, Schlecht. (Page 121.)

Serra os Orgaos, n° 3338, Glaziou (juin 1869). — Forme à frondes plus larges, à marge ondulée et à sporothèces écartés.

II. HYMÉNOPHYLLACÉES.

HYMENOPHYLLUM, Presl. (Page 192.)

† 15². MICROCARPON, F.

Frondibus oblongis, curvatis, pinnato-pinnatifidis, breve petiolatis, petiolis rachibusque alatis, alis remote dentatis, pilos bi-trifurcatos ferentibus, segmentis argute dentatis et ciliatis, pyxidulis parvulis, valvis ciliatis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n°s 2268 et 3351).

Filix cespitem efformans.

Icon. : *Tab. LXIX, fig. 3.*

(Longueur, 5-6 centim. sur 2 centim. d'envergure.)

Elle est très-villeuse, à poils bi-trifurqués. Le pétiole est ailé et les frondes légèrement recourbées.

NB. Nous avons reçu de nouveau le *Lomaria imperialis*, F. et Glaz. (p. 21). Ce spécimen était accompagné d'un dessin de M. Glaziou que nous avons reproduit tab. VII.

Il convient d'ajouter aux numéros indiqués le n° 2267 pour le *Hymenophyllum caulopteron* (p. 197) et le n° 3346 pour le *Hymenophyllum rufum*, F. (p. 198). Enfin, ajouter à la synonymie de l'*Aneimia triniæfolia*, Gardner, nom sous lequel se trouve cette espèce dans l'herbier de Candolle, comme synonyme : *Aneimia buniifolia*, aussi de Gardner, plus généralement admis.

TABLE DES MATIÈRES

PORTANT ÉVALUATION NUMÉRIQUE DES GENRES ET DES ESPÈCES.

NB. La bibliographie relative à ce travail se trouve *in extenso* dans les Mémoires précédents.

	Pages.	Genres.	Espèces.
Introduction	1	—	—
Species	1	—	—
I. POLYPODIACÉES	1	83	639
1. Acrostichées	1	10	75
2. Lomariées	20	3	26
3. Vittariées	26	3	6
4. Pleurogrammées	28	2	5
5. Lindsayées	29	1	11
6. Adiantées	31	3	46
7. Ptéridées	40	5	42
8. Cheilanthées	51	6	19
9. Hémionitidées	56	2	3
10. Antrophyées	57	1	3
11. Leptogrammées	57	5	15
12. Aspléniées	61	3	49
13. Scolopendriées	74	1	4
14. Diplaziées	75	2	22
15. Ménisciées	83	1	7
16. Polypodiées	85	11	136
17. Cyclodiées	124	3	14
18 Aspidiées	131	7	58
19. Néphrolépidées	150	2	6
20. Davalliées	151	3	9
21. Dicksoniées	154	2	7
22. Alsophilées	156	6	57
23. Cyathées	176	1	19
II. HYMÉNOPHYLLACÉES	184	6	67
III. GLEICHÉNIACÉES	198	1	20
IV. SCHIZÉACÉES	204	6	40
V. LYGODIACÉES	212	1	5
VI. MARATTIACÉES	214	2	5
VII. DANÆACÉES	215	2	9
VIII. OSMONDACÉES	217	1	3
IX. OPHIOGLOSSACÉES	218	2	4
Appendice (espèces reportées à leur genre)	237	—	—
Total	—	104	792
LYCOPODIACÉES	220	3	57
HYDROPTÉRIDÉES	234	—	—
Salviniacées	234	2	5
Marsiléacées	235	1	1
ÉQUISÉTACÉES	236	1	3

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.

NB. Nous indiquons par un * les espèces mentionnées qui n'appartiennent pas à la flore du Brésil. — Le premier chiffre conduit directement à l'espèce décrite.

Pages.

Aconiopteris longifolia, F. 1
ACROSTICHÉES. 1, 19
ACROSTICHUM, F. 1, 19
acrocarpon, Mart. 6
actinotrichum, Mart. 11
acuminans, F. 12
alismæfolium, F. 1
alpestre, Gardn. 13
amplissimum, F. 5
apodum, Klfss. 6
aureum, L. 18
brachynevron, F. 11
brevipes, Kze. 2
chrysolepis, F. 10
citrifolium, F. 18
consobrinum, Kze. 2, 237
crassinerve, Kze. 2
cuspidatum, Willd. 12, 239
Danææfolium, Langsd. et Fisch. 239
durum, Kze. 8
elegans, L. 205
erinaceum, F. 8, 237
erythrodes, Kze. 14
* erythrolepis, F. 12
fimbriatum, Cav. 6
fœniculaceum, H. et Grev. 16
furcatum, L. 200
Gardnerianum, Kze. 11
Glaziovi, F. 6, 5, 237
* gratum, F. 238
heterophyllum, Radd. 20
hirtipes, F. 238
horridulum, Klfss. 13
hybridum, H. Grev. 8
hymenodiastrum, F. 3
Japurense, Mart. 13
juglandifolium, Klfss. 18
* laminarioides, F. 12
Langsdorffii, Hook. et Gr. 11, 239
latifolium, Sw. 1, 237
Lechlerianum, Mett. 5

Pages.

lepidopteris, Langsd. et Fisch. 108
lepidotum, Willd. 12
leptophyllum, F. 8
Lindenii, Bory. 10
lineare, F. 9
Lingua, Radd. 2
longifolium, Sw. 1
macropodium, F. 1
marginatum, Schkh., *Crypt. Gew.*, p. 185, t. 1, f. 3. 18
Martinicense, Desv. 8
Meridense, Klotz. 12
minutum, Pohl. 5, 237
mollissimum, F. 7
nicotianæfolium, Sw. 17
ovalifolium, F. 3
ovatum, James. 13
pachydermum, F. 9
pachyphyllum, Mart. 8
paleaceum, Pohl. 11
papyraceum, F. 4
peltatum, Sw. 16
perelegans, F. 11
phlebodes, Kze. 13
piloselloides, Presl. 13, 19
Plumieri, F. 7
plumosum, F. 11
prælongum, F. 9
rubiginosum, F. 9, 10, 11
Scalpellum, Mart. 2
scandens, Radd. 18
Schiedei, Kze. 9
scolopendrifolium, Radd. 6, 5, 7
Sellowianum, Presl. 6
serratifolium, Mart. 17
simplex, Spr. 2
spathulinum, Radd. 13
spissum, F. 8
stramineum, F. 238
strictum, Radd. 11
tartareum, Sw. 60

Pages.

tectum, H. Bonpl. 12
trifoliatum, H. 56
* vestitum, Schlecht. 13
viscosum, Sw. 9
ACTINOSTACHYS, Wall. 204
pennula, Hook. 204
subtrijuga, Presl. 204
* *ADENOPHORUS*, Gaud. 29
ADIANTÉES. 31, 10
ADIANTOPSIS, F. 51
dichotoma, Th. Moor. 51
monticola, ejusd. 51
obtusissima, F. 52
radiata, F. 51
spectabilis, F. 52
ADIANTUM, L. 31
angustatum, Klfss. 37
betulinum, Klfss. 33
Brasiliense, Radd. 35
calcareum, Gardn. 37
Capillus-Veneris, L. 38
cassioides, Desv. 38
Claussenii, F. 32
cultratum, Hook. 34
cuneatum, Langsd. et Fisch. 38
curvatum, Klfss. 34
deflectens, Mart. 34
delicatulum, Mart. 33
dichotomum, Poir. 51
dolabriforme, Hook. 38
extensum, F. 38
filiforme, Hook. 33
flagellum, F. 33
fovearum, Radd. 35
fructuosum, Kze. 36
glaucescens, Klotz. 37
gracile, F. 37
hirtum, Klotz. 37
incisum, Presl. 38
intermedium, Sw. 35, 33
Jacobinæ, F. 32

Pages.
lucidum, Sw. 32
lunulatum, Burm. 38
macrodon, Klfss. 32
macrophyllum, Sw. 31
micropteris, Poir. 54
obliquum, Willd. 32
— majus. 32
obtusum, Desv. 38
— var. microphylla. 38
pensile, Kze. 35
— var. alchemillæfolia. 35
pentadactylon, Langsd. et Fisch. 34
platyphyllum, Sw. 31
prionophyllum, H. B. Kth. 36
proximum, Gaud. 37
pulverulentum, L. 32
radiatum, L. 51
rhizophytum, Schrad. 33
rhomboideum, Schkh. 34
rhomboideum, H. B. Kth. 36
serrato-dentatum, Willd. 36
serratum, Luschn. 39
sinuosum, H. et Gardn. 35
subaristatum, F. 33
subcordatum, F., et var. plures. 33, 34
subramosum, F. 36
tetragonum, Schrad. 35
tetraphyllum, Willd. 36
tomentellum, F. 37
tomentosum, Klotz. 37
trapeziforme, L. 34, 35
triphyllum, Lmrk. 39
truncatum, Radd. 34
ALSOPHILA, R. Br. 156
aculeata, J. Sm. 168
acuminata, J. Sm. 156
aperta, F. 158
arbuscula, Presl. 156
armata, Presl. 166
— Menziezii. 166
armata, Mart. 168
*aspera, R. Br. 105
atrovirens, Presl. 166
axillaris, Radd. 168
Blanchetiana, Presl. 171
Capensis, Hook. 175
ceropteris, F. 163
compta, Mart. 166
contracta, F. 167
Corcovadensis, F. 163
crenata, Kze. 175
dichromatolepis, F. 164
elegans, Mart. 175
eriocarpa, F. 162
excelsa, Mart. 174
ferox, Presl. 168
flexuosa, F. 159
Gardneri, Hook. 159

Pages.
Glaziovi, F. 160
glumacea, F. 170
Hookeriana, Klotz. 157
*hirsutissima, F. 167
hirta, Klfss. 168
impressa, F. 165
infesta, Kze. 159
leptocladia, F. 161
leucolepis, Mart. 168, 162
Ludoviciana, F. 169
Mexicana, Mart. 171, 167
Miersii, Hook. 156
monticola, Mart. 181
munita, Presl. 168
nigra, Mart. 166, 171
nigrescens, F. 170
paleolata, Mart. 168
pectinata, F. 168
phalerata, Mart. 160
— squamulosa. 160
plagiopteris, Mart. 160, 165, 170
Pœppigii, Hook. 157
præcincta, Kze. 159
procera, Mart. 156
pruinata, Klfss. 172, 174
pungens, Klfss. 157
pycnocarpa, Kze. 160, 165
radens, Klfss. 160
rigidula, Mart. 158
rostrata, Mart. 175
rufa, F. 166
scrobiculata, F. 157
setosa, Klfss. 160, 165
Swarziana Mart. 166
Tijucensis, F. 171
Unguis-cati, F. 165
villosa, Kze. 157
villosa, Desv. 158
ALSOPHILÉES. 156, 183, 184
*AMAUROPELTA, Kze. 143
*AMPHIBLESTRA, Presl. 51
Amphicosmia Beyrichiana, Th. Moor. 181
— *riparia*, Gardn. 175
AMPHIDESMIUM, Schott. 175
blechnoides, Kze. 175
Parkeri, Schott. 175
— majus. 175
ANAXETUM, Schott. 123
ANEIMIA, Sw. 205
abscissa, Schrad. 211
Breuteliana, Presl. 210
buniifolia, Gardn. 245
caudata, Klfss. 209
cheilanthoides, Klfss. 208
ciliata, Presl. 210
collina, Radd. 209
deltoidea, Sw. 208

Pages.
dichotoma, Gardn. 206
dissecta, Presl. 210
elegans, Presl. 212
ferruginea, H. B. Kth. 208
filiformis, Sw. 209
flexuosa, Radd. 208
flexuosa, Sw. 208
fulva, Sw. 209
— robusta, Presl. 209
Gardneri, Hook. 207
Gardneriana, Presl. 207
glareosa, Gardn. 207
Glaziovi, F. 207
Haenkei, Presl. 211
hirsuta, Mart. et Gal. 210
— *achilleæfolia*, Mart. et Gal. 210
hirta, Sw. 211
humilis, Sw. 206
incisa, Schrad. 210
Langsdorffiana, Presl. 210
Mandioccana, Hook. 210
Mandioccana, Radd. 211
microstachys, F. 206
millefolium, Gardn. 205
oblongifolia, Sw. 207
pallida, Field. et Gardn. 210
Phyllitidis, Langsd. et Fisch. 210
Phyllitidis, Mart. 209, 210
Phyllitidis, Sw. 211
pilosa, Mart. et Gal. 209
pulchra, Pohl. 209
Raddiana, Lk. 208
radicans, Radd. et la var. β. 206, 209
— evoluta, Presl. 209
repens, *minor*, Radd. 206
— *major*, Radd. 209
rotundifolia, Schrad. 206
rutæfolia, Mart. et Gal. 208
Schraderiana, Mart. 210
tenella, Sw. 210
tenuifolia, Presl. 210
tomentosa, Sw. 208
trichorhiza, Hook. 211
triniæfolia, Gardn. 206, 246
Tweediana, Hook. 211
vellea, Schrad. 209
Vespertilio, Schrad. 210
villosa, Blanchet. 209
villosa, Willd. 208
— *cheilanthoides*, Presl. 208
— *Humboldtiana*, Presl. 208
ANEIMIACÉES. 205, 212
ANEIMIDICTYON, J. Sm. 211
hirtum, Presl. 211
incisum, Presl. 211
laciniatum, Presl. 211
obliquum, Presl. 211
Phyllitidis, Presl. 211, 210

Pages.
Phyllitidis cordifolium. 211
— fraxinifolium. 211
— laciniatum. 211
— longifolium. 211
Tweedieanum, Th. Moor. 211
ANETIUM, Splitg. 18, 19
citrifolium, Splitg. 18
Sprucei, Th. Moor. 18
ANOGRAMME, Lk. 60, 61
Biardii, F. 241
villosa, F. 60
ANTIGRAMME, Presl. 74
Douglasii, Hook. 74
lancifolia, Presl. 74
oblongata, Presl. 74
populifolia, Presl. 74
repanda, Presl. 74
— discreta, F. 74
subsessile, F. 74
ANTROPHYÉES. 57
ANTROPHYUM, Klfss. 57, 19
Cayennense, Desv. 57
citrifolium, F. 18
lineatum, Klfss. 57, 241
subsessile, Kze. 57
APOTOMIA. 32
ASPIDIÉES. 131, 151
ASPIDIUM, Sw. 131, 134, 150, 156, 183
abbreviatum, Schrad. 131
aculeatum, Sw. 125
acutum, Hook. 139
amaurolepis, F. 137
amplissimum, Hook. 147
articulatum, Schkh. 148
basilare, F. 135
Berteroanum, F. 133
biforme, F. 139
brachynevron, F. 133
Brasilianum, Spr. 147
caudatum, Sw. 127
chrysolobum, Lk. 149
cicutarium, Willd. 138
consanguineum, Kze. 148
consobrinum, F. 140
conspersum, Schrad. 143, 144, 146
conterminum, Desv. 132, 133
coriaceum, Sw. 124
crenulans, F. 139
ctenitis, Lk. 144
denticulatum, Sw. 147
Dicksonioides, F. 143
discolor, Langsd. et Fisch. 124
elatior, F. 132
eriocaulon, F. 136
exaltatum, Blanch., non Sw. 147
exaltatum, Sw. 150
falciculatum, Radd. 135
Pages.
Filix-mas, Sw. 135
flexuosum, F. 138
*formosum, F. 147
furcatum, Klotz. 143
Germani, F. 144
goggylodus, Schkh. 148
gracilipes, F. 146, 147
helveolum, F. 132
Imrayanum, Hook. 133
Isabellinum, F. 137
*jucundum, F. 147
Kaulfussii, Lk. 144, 138, 146
Klotzschii, Hook. 147
latissimum, F. 142
longifolium, Pohl. 147
macrophyllum, Sw. 149
macrourum, Klfss. 143
macrum, F. 141
*molle, Schott. 138
nephrodioides, F. 138
nervatum, F. 136
nodosum, Willd. 148
obtusatum, Willd. 148
oligocarpon, Willd. 144
parallelogrammum, Kze. 135
patens, Radd. 143, 144, 138, 146
pectinatum, Willd. 150
pendulum, Radd. 151
phæochlamys, F. 140
plantagineum, Hook. 131
platyphyllum, Willd. 130
quadrangulare, F. 145
ramosum, F. 141
rivularioides, F. 145
rivulorum, Radd. 131
rufescens, Schrad. 148
sericeum, F. 144
sesquipedale, Willd. 148
sorbifolium, Venten. 149
tenerrimum, F. 134
tenerum, F. 147, 146
tetragonum, Hook. 144
vestitum, F. 134
violascens, Lk. 144, 138
ASPLÉNIÉES. 61, 74, 82
ASPLENIUM, L. 61, 82, 92
abrotanoides, Presl. 73
adiantoides, Radd. 73
alatum, H. B. Kth. 67
amabile, Lieb. 73
ambiguum, Radd. 78
angustatum, Presl. 71
*angustum, Kappl. 62
angustum, Sw. et Willd. 62
anisophyllum, Kze. 64
— latifolium, Hook. 64
attenuatum, Klfss. 71
auriculatum, Hook. 64
Pages.
auriculatum, Sw. 65
auritum, Sw., et var. plur. 67, 70, 242
Brasiliense, Radd. 66
camptocarpon, F. 63
celtidifolium, Hook. 76
chærophylloides, F. 71
cicutarium, Sw. 73
cirrhatum, Rich. 64, 67
costale, Sw. 78
crenatum, Desv. 70
crenulatum, Presl. 61
cuneatum, Lmrk. 70, 67
cyrtopteron, Kze., Linnæa, t. XXIII et non XXXIII. 67
decurtatum, auct. var. 61
*dentatum, L. 68
Douglasii, Hook. et Grev. 74
dubium, Mett. 79
Escragnollei, F. 62
Falx, Desv. 65
firmum, Kze., non F. 66
fœniculaceum, H. B. Kth. 73
formosum, Willd. 73
fragrans, Schkh. 72
fragrans, Sw. 72, 73
Gastonis, F. 70
gibbosum, F. 64
*Granatense, F. 64
harpeodes, Kze. 65
incurvatum, F. 69
jucundum, F. 68
laceratum, Desv. 70
lassum, Radd. 70
? longifolium, Schrad. 62
macilentum, Kze. 67
macrodon, F. 65
marginatum, L. 73
mastigophyllum, F. 64
monanthemum, Sm. 72
mucronatum, Presl. 70
Nidus, Radd. 61
obtusifolium, Lk. 67
oligophyllum, Klfss. 63
ovalescens, F. 72
pendulum, F. 65
pimpinellifolium, F. et Schaffn. 65
planicaule, Lowe. 72
præmorsum, Sw. 70, 72
pteropus, Klfss. 66
pseudo-nitidum, Radd. 72
pulchellum, Radd. 69, 68
— var. otites, Lk. 69
rachirhizon, Radd. 73
Raddii, F. 61
regulare, Sw. 66
— var. brevisorum. 66
repandulum, Kze. 67
rhizophorum, L. 67

Pages.
riparium, Lieb. 64
salicifolium, L. 64
sanguinolentum, Kze. 67
scandicinum, Klfss. 73
Sellowianum, Presl. 68
semicordatum, Radd. 65
Serra, Langsd. et Fisch. 69, 70
serratum, Mart. 61
Serronii, F. 68
stenocarpon, F. 64
striatum, L. 78
sulcatum, Lmrk. 70, 71
*Surinamense, F. 62
*Trichomanes, L. 242
umbrosum, Klfss. 67
ATHYRIUM, Roth. 61
decurtatum, Presl. 61
AZOLLA, Lmrk. 234
arbuscula, Desv. 234
filiculoides, Lmrk. 234
Magellanica, Willd. 234
microphylla, Klfss. 224
BALANTIUM, Presl. 155
Martianum, F. 155
Sellowianum, Presl. 155
BATHMIUM, Lk. 131
plantagineum, F. 131
— serratum. 131
BLECHNOPSIS (Blechni spec.). 25
BLECHNUM, L. 22, 26
acuminatum, F. 24
angustatum, Schrad. 25
angustifolium, Willd. 25
*angustifrons, F. 23
asplenioides, Sw. 23
Brasiliense, Desv. 25, 26
cartilagineum, Schkh. 24
caudatum, Cav. 24
ceteracinum, Radd. 23
Corcovadense, Th. Moor. 25
diplotaxicum, F. 25
extensum, F. 26
falciculatum, Presl. 24
Fluminense, Arrab. 25
glandulosum, Lk. 23
— *elongatum*, Kze. 24
gracile, Klfss. 23
hastatum, Klfss. 24
helveolum, F. 24
heterocarpon, F. 23
integerrimum, Spr. 24
intermedium, Link. 24
Lanceola, Sw. 22, 24, 26
lanceolatum, Radd. 22
Lechleri, Mett. 24
occidentale, L. 24
occidentale, Cavan. 24
— minus, Th. Moor. 24

Pages.
plantagineum, Presl. 24, 23
polypodioides, Radd. 23
serrulatum, C. Rich. 25
triangulare, Lk. 23
triangulatum, J. Sm. 23
trifoliatum, Presl. 23
unilaterale, Willd. 23
volubile, Klfss. 26
BOLBITIS, Schott. 17
Campteria Luschnathiana, Klotz. 47
— *Rottleriana*, Presl. 50
*BOTRYCHIUM, Sw. 219
*CAMPTOSORUS, Lk. 75
CAMPYLONEVRON, Presl. 113, 117
acrocarpon, F. 115
angustifolium, F. 113
— tenerum, F. 113
crispum, F. 116
decumanum, F. 115
decurrens, Presl. 116
— tenerum, F. 117
— latifolium, F. 117
fallax, F. 114, 245
fasciale, Presl. 114
juglandifolium, F. 117
latum, Th. Moor. 116
leuconevron, F. 113, 116
lucidum, Th. Moor. 114
minus, F. 114
*Moritzianum, F. 115
nitidum, J. Sm. 116
nitidum, Presl. 116
Phyllitidis, Presl. 115
repens, Lk. 115
repens, Presl. 115
tæniosum, F. 113, 114
*xalapense, F. 115
CARDIOCHLÆNA, F. 149
macrophylla, F. var. plures. 149
pilosa, F. 150
CASSEBEERA, Klfss. 39
gleichenioides, Hook. 40
paradoxa, F. 43
pinnata, Klfss. 40
triphylla, F. 39
CEROPTERIS, Lk. 60, 61, 164
calomelæna, Lk. 60
distans, Lk. 60
tartarea, Lk. 60
Ceterach aspidioides, Radd. 58
*officinarum, Willd. 107
polypodioides, Radd. 58
CHEILANTHÉES. 51, 56
CHEILANTHES, Sw. 54
Brasiliensis, Radd. 52
chlorophylla, Kze. 52
elegans, Desv. 54
flexuosa, Kze. 54

Pages.
flexuosa minor, Hook. 54
*fragrans, Weeb. et Berth. 56
glaberrima, F. 54
glandulifera, F. 55
glandulosa, *voy.* Glandulifera.
lentigera, Presl. 54
*micromera, Kth. 54
*microphylla, Sw. 54
micropteris, Sw. 54
monticola, Gardn. 51
paleacea, Mart et Gal. 54
rufa, Willd. 55
Tweediana, Hook. 55
CHEIROGLOSSA, Presl. 219
palmata, Presl. 219
CHNOOPHORA, Mart. 174, 175
CHRYSODIUM, F. 18, 19
danææfolium, F. 239
hirsutum, F. 18
vulgare, F. 18, 19
CHRYSOPTERIS, Lk. 120
areolata, Lk. 120
aurea, Lk. 120
Martinicensis, F. 120
pulvinata, Lk. 120
Raddiana, F. 120
sporodocarpa, Lk. 120
Cochlidium graminoides, Klfss. 28
*COPTOPHYLLUM. 205
buniifolium, Gardn. 206
millefolium, Gardn. 205
triniæfolium, Gardn. (aneimia). 206
CRASPEDARIA, Lk. 118
auriseta, F. 118
ciliata, Lk. 118
cordifolia, F. 118
crispata, F. 119
Gestasiana, F. 118
grandis, F. 119
piloselloides, F. 118
vacciniifolia, Lk. 118
— elongata, H. 118
CUSPIDARIA, F. 27
furcata, F. 27, 28
CYATHEA, Sm. 176
abrupta caudata, F. 183
acanthomelas, F. 177
arborea, Sm. 176, 178
— Sternbergii, F. 176
attenuata, F. 178
Beyrichiana, Presl. 181
Delgadii, Pohl. 180
denticulata, Goldm. 183
discolor, Bory. 172
Feei, Glaz. 179
Gardneri, Hook. 176
hirtula, Mart. 180
incurvata, Kze. 181

Pages.
leucosticta, F. 182
mamillata, F. 176
Mexicana, Schlecht. 180
monticola, Presl. 181
Moricandiana, Kze. 175
nigrescens, Klotz. 159
oligocarpa, Kze. 180
phalerata, Spreng. 160
Schanschin, Mart. 180
Sellowiana, Hook. 168
Sellowiana, Presl. 175
Serra, Willd. 180
Sphærocarpa, F. 180
Sternbergii, Pohl. 176
Taunaysiana, Glaz. 178
vestita, Mart. 180
villosa, H. Bonpl. 158
CYATHÉES. 176, 183, 184
CYCLODIÉES. 124
CYRTOMIUM, Presl. 131
abbreviatum, Presl. 131
CYSTOPTERIS, Bernh. 147, 150
Brasiliana, Presl. 147
emarginulata, Presl. 147
DANÆA, Sm. 215
alata, Sm. 216
cordata, F. 216
dubia, Presl. 216
elliptica, Sm. 215
geniculata, Radd. 215
longifolia, Desv. 215, 216
nodosa, Smith. 215
paleacea, Radd. 217
Sellowiana, Presl. 216
simplicifolia, Rudge. 215
stenophylla, Kze. 216
DANÆACÉES. 215, 217
DANÆOPSIS, Presl. 217
paleacea, Presl. 217
DAREA, Willd. 70
cicutaria, Sm. 73
DAREASTRUM. 72
DAVALLIA, Sm. 152
bifida, Klfss. 153
? Corcovadensis, Lodd. 152
distans, Klfss. 152
inæqualis, Kze. 152
DAVALLIÉES. 151, 155
Dennstædtia cicutaria, Th. Moor. 154
DICKSONIA, L'Her. 154
adiantoides, Lk. 154
apiifolia, Sw. 155
cicutaria, Sw. et ses variétés. 154
cicutarioides, F. 155
dissecta, Sw. 154
flaccida, Sw. 155
Martiana, Hook. 155
polypodioides, Sw. 152

Pages.
rubiginosa, Klfss. 154
Sellowiana, Hook. 155
DICKSONIÉES. 154, 155
DICRANOGLOSSUM, J. Sm. 28
DIDYMOCHLÆNA, Desv. 82
sinuosa, Desv. 82
— microtheca, F. 82
DIDYMOGLOSSUM, Presl. 191
nummularium, V. d. Bosch. 191
pumilum, V. d. Bosch. 191
quercifolium, Presl. 191
DIPLAZIÉES. 75, 82
DIPLAZIUM, Sw. 75, 92
acuminatum, Radd. 75
ambiguum, Radd. 79
biserratum, Presl. 78
brevifolium, Kze. 75
Callipteris, F. 75
celtidifolium, Kze. 76
costale, Sw. 78, 79
dissimile, F. 76
expansum, Willd. 79
— glabriusculum, Th. Moor. 79
* grammitoides, F. 80
grandifolium, Sw. 75
herbaceum, F. 80, 81
leptocarpon, F. 80
leptochlamys, F. 79
— leptorachis, F. 80
longipes, F. 77
macrophyllum, Desv. 78
mutilum, Kze. 78
obtusum, Lk. 79
parallelogrammum, F. 76
plantagineum, Sw. 75, 76
— serratum, F. 75
pulcherrimum, Radd. 82
radicans, Desv. 78
remotum, F. 81
Rœmerianum, Presl. 78
rostratum, F. 81
* Schlimense, F. 75
Shepherdi, Presl. 78
striatum, Presl. 78
truncatum, Presl. 79
Tussaci, F. 79, 78
DORYOPTERIDASTRUM. 42
DORYOPTERIS, J. Sm. 45
hastata, J. Sm. 45
lomariacea, Kl. 43
pedata, J. Sm. 45
Raddiana, F. 45
— multipartita, F. 45
— patula, F. 45
sagittata, Hook. 45
sagittifolia, J. Sm. 45
DRYNARIA, Bory. 120, 131
acuminata, F. 122

Pages.
elongata, F. 121
iteophylla, F. 121
lepidota, Schlecht. 121, 245
* lycopodioides. 122
Moricandii, Metten. 121
percussa, F. 120
persicariæfolia, F. 121
Raddiana, F. 122
— obtusiloba, Glaz. 122
Schomburgkianum, Kze. 121
* *DRYOMENIS*, F. 131
Elaphoglossum glabellum, J. Sm. 8
— *intermedium*, Bruck. 11
ÉQUISÉTACÉES. 236
EQUISETUM, L. 236
Brasiliense, Mild. 236
giganteum, L. 236
Martii, Mild. 236
pyramidale, J. G. Goldm. 236
Tussaci, F. 236
EUALSOPHILÉES. 156
EUANEIMIACÉES. 206
EUASPIDIUM. 133
EUBLECHNUM. 22
EUGONIOPHLEBIUM. 108
EUHYMENOPHYLLUM. 192
EUPELLÆA. 44
EUPODIUM, Presl. 214
Kaulfussii, Presl. 214
— acuminatum, F. 215
— macropteron, F. 215
EUPOLYSTICHUM. 124
EUSCHIZÆACÉES. 204
EUVITTARIA. 27
FALCARIA. 69
* FAYDENIA (mieux Fadenya). 150
* FEEA, Bory. 184, 185
Borgi, V. d. Bosch. 184
Humboldtii, V. d. Bosch. 184
* polypodina, F. 184
GLEICHENIA, R. Br. 198
bifida, Spreng. 203
* *flabellata*, Labill. 199
glaucescens, H. B. Kth. 198
gracilis, Th. Moor. 203
Hermanni, H. et Gr. 199
immersa, H. et Gr. 202
Klotzschii, Hook. 200
longipinnata, Hook. 203
nervosa, Hook. 201
pedalis, Spreng., non J. Sm. 204
ramosissima, A Saint-Hil. 202
remota, Klfss. 200
rufinervis, Klotz. 200
tenuis, Hook. 200
GLEICHÉNIACÉES. 198
GONIOPHLEBIUM, Presl. 107
albo-punctatum, J. Sm. 111

Pages.
*arcuatum, F. 109
articulatum, Presl. 112, 84
Catharinæ, J. Sm. 108, 120
ceteraccinum, F. 107
chnoodes, Spr. 109
dissimile, F. 111, 109
elatius, Th. Moor. 112
excelsior, F. 244
fraxinifolium, J. Sm. 111
Gauthieri, F. 112
grammatoides, F. 110
hirsutissimum, F. 108
— angustior, F. 108
hirsutulum, Th. Moor. 111
incanum, var. β minus, J. Sm. 107
lætum, J. Sm. 109
latipes, J. Sm. 108, 244
lepidopteris, Th. Moor. 108
loriceum, J. Sm. 109
menisciifolium, F. 110
microlepis, F. 107
neriifolium, J. Sm. 110
pectinans, F. 109
pectinatum, F. 108-109
pictum, F. 244
rhizocaulon, Presl. 112
xiphophorum, Kze. 108
GONIOPTERIS, Presl. 105, 107
cheilocarpa, F. 148
fraxinifolia, Presl. 105, 111
fraxinifolia, var. Presl. 111
hastata, F. 107
macrocladia, F. 106
platypes, F. 106
prolifera, Presl. 105
tetragona, Presl. 105
GRAMMITIS, Sw. 85
elongata, Sw. 121
Fluminensis, F. 85
graminoides, Sw. 28
lanceolata, Schkh. 121
*Magellanica, Desv. 85
Organensis, Gardn. 90
punctata, Radd. 85
GYMNOGRAMME, Desv. 58, 61, 105
asplenioides, Sw. 58
attenuata, F. 59
calomelæna, Klfss. 60
expansa, F. 60
Linkiana, Kze. 58
myriophylla, Sw. 60
oppositans, F. 58
patula, F. 59, 60
polypodioides, Spr. 58
pteroides, F. 59
pumila, Spreng. 58
reniformis, Mart. 57
rufa, Desv. 57

Pages.
tartarea, Desv. 60
GYMNOPTERIS, Bernh. 17, 19
nicotianæfolia, Presl. 17
semi-pinnatifida, F., var. 17
— subsimplex, F. 17
GYMNOTHECA, Presl. 214
cicutæfolia, Presl. 214
obtusidens, Presl. 214
polyodon, Presl. 214
Raddiana, Presl. 214
HECISTOPTERIS, J. Sm. 58
pumila, J. Sm. 58
HEMIDICTYON, Presl. 73
marginatum, Presl. 73
HÉMIONITIDÉES. 56
Hemionitis parasitica, L. 18
*palmata, L. 57
rufa, Schkh. 57
tomentosa, Radd. 56
Hemiphlebium pusillum, Presl. 191
HEMISTEGIA, Presl. 175
insignis, F. 175
HEMITHELIA, Presl. 175
arborea, F. 176
Gardneriana, Presl. 175
macrocarpa, Presl. 175
Sellowiana, Presl. 175
HÉMITHÉLIÉES. 175
Heterodanœa stenophylla, Presl. 216
HETERONEVRON, F. 17, 19, 46
? meniscioides, F. 17
Raddianum, F. 18
serratifolium, F. 17
— var. undulatum, F. 18
**HETEROPHLEBIUM*, F. 51
HETEROPTERIS, F. 123, 124
Doryopteris, F. 123
HEWARDIA, J. Sm. 39
diphylla, F. 39
dolosa, Kze. 39
serrata, F. 39
HYDROGLOSSUM, Presl. 213
hirsutum, Willd. 213
HYDROPTÉRIDÉES. 234
HYMENODIUM, F. 4
*crinitum, F. 4, 9, 46
*Kunzeanum, F. 4, 9
HYMÉNOPHYLLACÉES. 184
HYMÉNOPHYLLÉES. 192
HYMENOPHYLLUM, Smith. 192
aculeolatum, V. d. Bosch. 193
angustum, V. d. Bosch. 194
asplenioides, Sw. 192
— palmatum, F. 192
Beyrichianum, Kze. 194
bifidum, H. et Gr. 194
Boryanum, Radd. 197
Boryanum, Willd. 195

Pages.
caudiculatum, Mart. 197
— productum, Presl. 197
caulopteron, F. 197, 246
ciliatum, H. et Gr. 197
commutatum, Presl. 197
crispum, H. B. Kth. 195
— Brasilianum, F. 195
elegans, Spr. 194 (197 deleatur)
hirsutum, Sw. 193
Jalappense, Schlecht. 195
lanatum, F. 193
lineare, Sw. 197
macrocarpon, F. et Schaffn. 192
*macrothecium, F. 196
megachilum, Presl. 193
microcarpon, F. 245
notabile, F. 193
Organense, Hook. 194
plumosum, Klfss. 197
podocarpon, F. 196
polyanthos, Sturm. 192
polyanthos, Sw. 195
producens, F. 196
pusillum, Schott. 193
remotum, V. d. Bosch. 197
rufum, F. 198, 246
rupestre, Radd. 190
Sturmii, V. d. Bosch. 192
Surinamense, V. d. Bosch. 197
Thunbridgense, Sm. 193
trifidum, H. et Gr. 194
venustum, Desv. 193
viridissimum, F. 194
Wilsonii, Hook. 193
HYMENOSTACHYS, Bory. 184, 185
diversifrons, Bory. 184
Humboldtii, V. d. Bosch. 184
HYPOLEPIS, Bernh. 52, 53
delicatula, F. 53
Dicksonioides, F. 53
Gardneriana, Hook. 51
parvilōba, F. 53
radiata, Hook. 51
repens, Bernh. 52, 53
serrata, F. 53
**ISOLOMA*. 31
JAMESONIA, H. et Gr. 55, 56
scalaris, Kze. 55
Lastrea Raddiana, Hook. 134
LEPIDONEVRON, F. 147, 150, 151
longifolium, F. 147
obtusatum, F. 147
rufescens, F. 148
sesquipedale, F. 148
LEPTOCIONIUM, Presl. 192
attenuatum, Hook. 192
fucoides, Presl. 192, 195
LEPTOGRAMMÉES. 57, 61

Pages.
LINDSAYA, Dryand. 29, 31, 154
Catharinæ, Hook. 30
consanguinea, F. 30
— rigida. 30
curvans, F. 30
Gardneri, Hook. 29
Guyanensis, Dryand. 31
Guyanensis, Mart. 30
horizontalis, Hook. 29, 30
Javitensis, H. et B. 30
macrophylla, Kze. 39
nitidissima, Willd. 29
pallida, Klotz. 29
quadrangularis, Radd. 29
Raddiana, Klotz. 30
rigescens, Willd. 29
stricta, Dryand. 30
trapeziformis, Dryand. 29
virescens, Mart. 30
LINDSAYÉES. 29, 31
LITOBROCHIA, Presl. 45, 46
aculeata, F. 50
angustata, F. 49
biaurita, F. 50
biformis, Splitg. 47
Brasiliensis, Presl. 47
decurrens, Presl. 47
denticulata, Presl. 47
elegans, F. 50, 241
gigantea, Presl. 47
horizontalis, F. 48
leptophylla, F. 47
*Mexicana, F. 49
Organensis, F. 240
pallida, Presl. 50, 241
papyracea, F. 50
polita, F. 50
prælta, F. 46
sericea, F. 48
splendens, Presl. 45, 240
varians, F. non Presl. 49
LOMARIA, Willd. 20, 26
Brasiliensis, Radd. 21
campylotis, Kze. 24
Fialhoi, F. 239
hastata, Kze. 24
imperialis, F. et Glaz. 21, 26, 246
Martinicensis, Spreng. 20
mucronata, F. 20
Plumieri, Desv. 20
procera, Spr. 21
pteropus, Kze. 20
Regnelliana, Kze. 21
striata, Sw. 21
LOMARIDIUM. 20
LOMARIÉES. 20, 26
LOMARIOPSIS, F. 13
elongata, F. 14

Pages.
erythrodes, F. 14
phlebodes, F. 13
*sorbifolia, F. 19
LONCHITIS, L. 51
Lindeniana, Hook. 51
macrochlamys, F. 51
repens, L. 52, 53
LOPHIDIUM, Rich. 205
elegans, Presl. 205
flabellum, Presl. 205
pacificans, Presl. 205
spectabile, Presl. 205
LOPHOSORIA, Presl. 172, 184
acaulis, F. 174
affinis, F. 174
cæsia, Presl. 172
dorsalis, F. 173
prostrata, Presl. 173
pruinata, Presl. 172, 174
LYCOPODIACÉES. 220
LYCOPODIUM, Spring. 220
affine, Bory. 225
alopecuroides, L. 223
— furcatum, F. 223
— integerrimum, Spring. 223
— spinulosum, Spring. 223
apodum, L. 227
*aristatum, H. Bonpl. 224
aristatum, Presl. 225, 227
atrovirens, Presl. 228
Boryanum, Rich. 224
Brasiliense, Desv. 229
Brasiliense, Radd. 227
brevipes, F. 226
Brongniartii, Spring. 221
bryopteris, Aubl. 226
Carolinianum, L. 225
catharticum, Hook. 220
cernuum, L. 224
Chamæcyparissus, Al. Br. 225
clavatum, L. 224
— distachyum, Sp. 224
coarctatum, Mart. 230
complanatum, L. 225
— adpressifolium, Spring. 225
comptonioides, Desv. 226
contextum, Mart. 223
crassinervium, Desv. 227
curvifolium, Kze. 222
dichotomum, H. et Grev. 221
eriostachys, F. 224
erythropus, Mart. 230
filiforme, Radd. 221
fontinaloides, Spring. 222
intermedium, Spring. 220
Jungermannioides, Gaud. 228
lævigatum, Willd. 230
linifolium, L. 221

Pages.
linifolium sanguineum, Spring. 221
Mandioccanum, Radd. 221
marginatum, H. et Bonpl. 231
marginatum, Radd. 228
microphyllum, Kth. 227
mollicomum, Mart. 221
myrsinites, Lmrk. 220
nitens, Chamiss. et Schl. 223
officinale, Neck. 224
paradoxum, Mart. 225
plumosum, Schkh. 228
Pœppigianum, Hook. et Gr. 232
pulcherrimum, Wall. et Hook. 221
quadrifariatum, Bory. 220
reflexum, Lmrk. 220
repens, Sw. 225
rubrum, Chamiss. 223
rupestre, L. 226
sarmentosum, Spring. 221
serpyllifolium, F. 222
setaceum, Hamil. 221
— Brasiliense, F. 221
Sieberianum, Spring. 220
stellatum, Willd. 233
stoloniferum, Hort. 231
stoloniferum, Radd. 229
stoloniferum, Sw. et Willd. 233
subulatum, Desv. 223
sulcatum, Desv. 231
*taxifolium, Sw. 221
tenue, H. B. Kth. 222
trichiatum, Bory. 225, 224
*ulicifolium, Venten. 221
verticillatum, L. 221
— apertum, F. 222
Willdenowii, Desv. 230
LYGODIACÉES. 212
LYGODIUM, Sw. 212, 213
hastatum, Desv. 212
hirtum, Klfss. 213
— lucens, Klfss. 213
Pohlianum, Presl. 213
polymorphum, H. B. Kth. 213
scandens, Schkh. 212
varium, Lk. 212
venustum, Sw. 213
— spiciferum, Presl. 213
volubile, Sw. 212
MARATTIA alata, Radd. 214
cicutæfolia, Klfss. 214
cicutæfolia, Mart. 214
Raddii, Desv. 214
MARATTIACÉES. 214, 215
Marginaria læta, Presl. 109
auriseta, Presl. 118
Catharinæ, Presl. 108
hirsutissima, Presl. 108
incana, Presl. 107

Pages.
læta, Presl. 109
latipes, Presl. 108
meniscifolia, Presl. 110
minima, Bory. 107
neriifolia, Presl. 110
piloselloides, Presl. 118
MARSILEA, Bart. 235
Brasiliensis, Mart. 235
MARSILÉACÉES. 235
MÉNISCIÉES. 83, 85
MENISCIUM, Schreb. 83, 112
elongatum, F. 83
longifolium, F. 84
macrophyllum, Kze. 83
palustre, Radd. 83
reticulatum, Sw. 83
rostratum, F. 83
sessilifolium, Pohl. 84
sorbifolium, Jacq. 83
MERTENSIA, Willd. 198, 204
bifida, F. 203
Brasiliana, Desv. 199
decurrens, Radd. 202
dichotoma, Willd. 199, 202
*discolor, Mart. 199
*flabellata, R. B. 202
flexuosa, Mart. 199
furcata, Willd. 200
gracilis, Mart. 203
lanuginosa, Moric. 202
latissima, F. 203
longipinnata, Klotz. 203
nervosa, Klfss. 201
pectinata, Willd. 198
pedalis, J. Sm. 204
pennigera, Mart. 204
— lanuginosa, Th. Moor. 204
pruinosa, Mart. 200
pubescens, H. Bonpl. 202
pumila, Mart. 199
remota, Klfss. 200
revoluta, H. B. Kth. 200
rigida, J. Sm. 202
rubescens, Mart. 199
rufinervis, Mart. 200
scalpturata, F. 199
spissa, F. 200
squamosa, F. 202
trifurcans, F. 201
MESOTHEMA (Lomariæ spec.) 24
hastatum, Presl. 24
plantagineum, Presl. 24
METAXYA rostrata, Presl. 175
MICROGONIUM, Presl. 192
MICROLEPIA, Presl. 151
Brasiliensis, Presl. 152
distans, F. 152
Fluminensis, F. 151

Pages.
inæqualis, F. 152
Lindsayæformis, F. 152
nigrescens, Kze. 152
polypodioides, Presl. 152
MYRIOPTERIS, F. 54
*marsupianthes, F. 54
paleacea, F. 54
NEOTTOPTERIDASTRUM. 61
NEPHRODIUM, Rich. 148, 135, 150
abbreviatum, F. 131
acutum, Hook. 139
chrysolobum, F. 149
falciculatum, Desv. 135
funestum, Hook. 138
molle, Schott. 148
Pohlianum, Presl. 148
Raddianum, Hook. 134
Schkuhrii, Lk. 150
NÉPHROLÉPIDÉES. 150, 151
NEPHROLEPIS, Schott. 150
ensifolia, var. β Th. Moor. 148
exaltata, Schott. 150
intermedia, F. 151
neglecta, Kze. 151
pendula, F. 151
Schkhurii, F. 150
*NEVROCALLIS. 46
*NEVRODIUM, F. 27
NEVROGRAMME, Lk. 56
rufa, Lk. 57
tomentosa, Lk. et var. 56
NEVROPHYLLUM, Presl. 185
abruptum, F. 185
Hedwigii, V. d. Bosch. 185
Hostmannianum, Kl. 185
pennatum, Klfss. 185
pinnatum, Presl. 185
**NEVROPLATYCEROS*. 13, 19, 20
Niphobolus piloselloides, Spr. 118
NOTHOCHLÆNA, R. B. 55
eriophora, F. 55
ferruginea, Hook. 55
*lanuginosa, Desv. 212
*Maranthæ, R. Br. 56
palmatifida, Kze. 55
*Plukenetii, F. 56
Pohliana, Kze. 55
rufa, Presl. 55
OLEANDRA, Cavan. 148, 150
nodosa, Presl. 148
OLFERSIA, Radd. 16
apoda, Presl. 6
cervina, Kze. 16
Corcovadensis, Radd. 16
peltata, Presl. 16
piloselloides, Presl. 13
Sellowiana, Presl. 6
OLIGOLÉPIDÉES. 1

Pages.
Onoclea striata, Sw. 21
*ONYCHIUM, Klfss. 51
OOCHLAMYS, F. 131, 132, 150
OPHIOGLOSSACÉES. 218
OPHIOGLOSSUM, L. 218, 219
nudicaule, L. 218
palmatum, Plum. 219
reticulatum, L. 218
— cordatum, F. 218
Spruceanum, F. 218
Ypanemense, Mart. 218
OSMONDACÉES. 217
OSMUNDA, L. 217
cinnamomea, L. 217
deltoidea, Cav. 208
gracilis, Lk. 217
humilis, Cav. 206
oblongifolia, Cav. 207
*regalis, L. 217
— *gracilis*, Milde. 217
spectabilis, Willd. 217
— Brasiliensis, Grev. et Hook. 217
— palustris, Schrad. 217
Pœcilopteris fraxinifolia, Presl. 17
Paesia viscosa, Saint-Hil. 55
PELLÆA, Lk. 42
flavescens, F. 44
geraniifolia, F. 43
lomariacea, Kze. 43
microphylla, F. 43
paradoxa, F. 43
quinquelobata, F. 42, 123
subsimplex, F. 44
PHEGOPTERIS, F. 96, 61, 97, 98, 105, 123, 124, 150, 156, 183
adnata, F. 103
asplenioides, Metten. 58
axillaris, F. 168
Blanchetiana, F. 97
brevinervis, F. 243, 105
canescens, F. 101
caudata, F. 102
connexa, F. 101
denticulata, F. 100
divergens, F. 104
effusa, F. 104
epireoides, F. 104
eriopodia, F. 102
falciculata, F. 99
flavo-punctata, F. 96
Fluminensis, F. 97
heterocarpa, F. 100
incisa, *lege* subincisa. 101
macroptera, F. 99
marginans, F. 104
mollivillosa, F. 101
Oreopteridastrum, F. 97
*Oreopteris, F. 98

Pages.
Organensis, F. 106
polypodioides, Metten. 58
prionitis, F. 96
propinqua, F. 103
pubescens, F. 98
rivulorum, F. 98
scrobiculata, F. 102
spectabilis, F. 103
splendida, F. 101
subincisa, F. 101
tenuis, F. 99, 96
*Thelypteris, F. 96
Tijuccana, F. 99, 96
tricholepis, F. 98
* *Platyzoma*, R. Br. 56
Pleopeltis decumana, Presl. 115
— *angusta*, H. Bonpl. 122
— *areolata*, Presl. 120
— *aurea*, Presl. 120
— *lepidota*, Presl. 121
— *percussa*, Hook. et Gr. 120
Pleuridium, F. 123
crassifolium, F. 123
Pleurogramme, Presl. 28
graminifolia, Hook. 28
graminoides, Klfss. 28
linearis, Klfss. 28
pumila, Klfss. 28
PLEUROGRAMMÉES, F. 28, 29
Polybotrya, H. Bonpl. 14, 19
acuminata, Lk. 14
caudata, Kze. 14
cervina, Klfss.. 16
Corcovadensis, Spr. 16
cylindrica, Klfss. 15
frondosa, F. 15
incisa, Lk. 14
osmundacea, H. B. Kth. 14
pubens, Mart. 14
semi-pinnata, F. 16
speciosa, Schott. 15
Polylépidées. 10
POLYPODIACÉES. 1
Polypodiastrum. 107
Polypodium, L. 85, 150
achilleæfolium, Klfss. 95
aculeatum, L. 125, 168
aculeatum, Radd. 168
albo-punctatum, Radd. 111, 245
angustifolium, Radd. 113
angustifolium, Sw. 113
apiculatum, Klotz. 95
arboreum, L. 176
armatum, Sw. 166
articulatum, Desv. 112
* aspleniifolium, Sw. 95
atro-virens, Langsd. et Fisch. 166
aureum, L. 120
auriselum, Radd. 118
axillaris, Radd. 168
cæsium, Presl. 172
canescens, Kze. 101
Catharinæ, Langsd. et Fisch. 108
caudatum, Klfss. 102
ceteraccinum, Mich. 108
chnoodes, Spr. 109, 111
chnoophorum, Kze. 93
ciliare, F. 94, 95
ciliatum, Willd. 118
concinnum, Sieb. 132
confluens, F. 89
connexum, Klfss. 101
Corcovadense, Radd. 174
crassifolium, L. 123
cultratum, Willd. 94, 95, 96, 243
decumanum, Willd. 115
decurrens, Radd. 116
deflexum, Lowe. 111
dissimile, L. 111
distans, Radd. (partim). 111, 112
divergens, Sw. 104
effusum, Sw. 104
* elasticum, Bory. 94
elatius, Schrad. 112
* ellipticosorum, F. 96
exiguum, F. 89
extensum, F. 85
falciculatum, Radd. 99, 144
Filicula, Klfss. 92
flavopunctatum, Klfss. 96
*formosum, Radd. 99, 101
fraxinifolium, Jacq. 111
geminatum, Schrad. 121
* gibbosum, F. 88
glaucum, Radd. 120
glaucum, Sw. 172
gratum, F. 242
griseum, Schkh. 172
* Guadalupense, F. 87, 95
heteroclitum, F. 93, 243
hirsutissimum, Radd. 108
hirsutulum, F. 87
hirsutulum, Radd. 111
immersum, F. 88
lætum, Radd. 109
lapathifolium, Radd. 114
latipes, Langsd. et Fisch. 108
lepidotum, Schlecht. 121
loriceum, L. 109
lucidum, Beyr. 114
macrocarpon, Willd. 121
macropteron, Klfss. 99
mœnurum, Lk. 91
meniscifolium, Langsd. et Fisch. 110, 111
microlepis, F. 107
molle, H. B. Kth. 91
*mollissimum, F. 95
moniliforme, Cav. 88, 178
Moricandii, Metten. 121
neriifolium, Schkh. 110
nitidum, Kze. 116
nitidum, J. Sm. 116
nymphale, Schkh. 143
oligocarpon, Willd. 144
Organense, Metten. 90
? otites, L. 91, 93
ovalescens, F. 94, 95
Paradisiæ, Langsd. et Fisch. 90
Paradisiastrum, F. 90, 91
* Pecten, F. 95
pectinatum, L. et Schkh. 90, 93
pendulum, Sw. 93
percussum, Cav. 120
persicariæfolium, Schrad. 121
Peruvianum, Desv. 242
Phyllitidis, L. 115
piloselloides, L. 118
pilosissimum, Mart. et Gal. 90
plantagineum, Jacq. 131
pleopeltidifolium, Radd. 122
Pleopeltidis, F. 86
Plumula, Willd. 91, 93
— *minor*. 92
polystichoides, Kl. 130
prionitis, Kze. 96
procerum, Willd. 156
proliferum, Klfss. 105
pruinatum, Sw. 172
pubescens, Radd. 98
pulvinatum, Lk. 120
pungens, Willd. 157
recurvatum, Klfss. 91
repandum F. 87
repens, Sw. 115
rhizocaulon, Willd. 112
Richardii, Klotz. 112
rivulorum, Radd. 98
robustum, F. 92
Schkhurii, Radd. 93
Schomburgkianum, Kze. 121
semi-adnatum, Hook. 95
Serricula, F. 89, 88, 243
spectabile, Klfss. 103
spinosum, L. 50
Spixianum, Mart. 86
splendidum, Klfss. 101
stigmaticum, Kze. (*lege* Presl.) 121
stipitatum, Hook. et Gr. 242
subincisum, Mart. 101
sublanosum, Hook. 93
suspensum, L. Sw. 93, 96
suspensum, Metten. 94
tæniosum, Metten. 114

Pages.
tœniosum, Willd. 113
Tœnitis, Klfss. 174
tenuiculum, F. 86
tetragonum, Sw. 105
— *tetragonoides*, F. 105
Tijuccanum, Radd. 96
trichomanoides, Sw. 88, 89
triseriale, Sw. 111
vacciniifolium, Langsd. et Fisch. 118
vestitum, Radd. 134
viviparum, Radd. 105
* vulgare, L. 93, 120, 242
* xanthotrichum, Klotz. 96
xiphophorum, Kze. 108
POLYPODIÉES. 85
POLYSTICHUM, Roth. 124, 105, 135, 146
abbreviatum, Presl. 131, 130
aculeatum, Roth. 125
aculeolatum, F. 128
amplissimum, Presl. 147
caudatum, Cav. 127
coriaceum, Schott et var. plures. 124, 139
giganteum, F. 127
lanosum, F. 126
longecuspis, F. 129
microsorium, F. 125
microthecium pour microsorium, F. 125
platylepis, F. 129
platyphyllum, Willd. 130
remotum, F. 125
* *tenerum*, F. 147, 146
Tijucense, F. 127
Polytœnium lineatum, Desv. 57
PSILOTUM, Sw. 233
triquetrum, Sw. 233
PTÉRIDÉES. 40, 51
PTERIS, L. 40
aculeata, Sw. 50
angustifolia, Sw. 27
* aquilina, L. 42, 51
arachnoidea, Klfss. 42
biaurita, L. 50
Brasiliensis, Radd. 47
caudata, L. 42
collina, Radd. 45
Cretica, L., var. Americana, Ag. 40, 51
decurrens, Radd. 47
deflexa, Lk. 41
denticulata, Sw. 47
elegans, Sw. 50
esculenta, Forst. 41
Gaudichaudii, Ag. 41
geraniifolia, Radd. 43
gigantea, Willd. 47
gracilis, F. 41
hastata, Radd. 45
heterophylla, L. 40
leptophylla, Sw. 47
lineata, L. 27
lomariacea, Kze. 43
nemoralis, Willd. 50
pallida, Presl. 50
palustris, Gaudich. 41
pedata, auct. 45
pedata, Langsd. et Fisch. 45
pilosiuscula, Desv. 41
polita, L. 50
psittacina, Presl. 42
quadriaurita, Willd. 41
rostrata, F. 41
sagittifolia, Radd. 45
serrata, Fl. Flum. 47
spinulosa, Radd. 47
splendens, Klfss. 45
tristicula, Radd. 47
varians, Radd. 45, 46
PTEROPSIS, Desv. 27
angustifolia, Sw. 27
PTEROZONIUM, F. 57
Ramondia palmata, Mirb. 219
reniforme, F. 57
RHIPIDOPTERIS, Schott. 16, 13
peltata, F. 16
SACCOLOMA, Klfss. 151
elegans, Klfss. 151
SAGENIA, Presl. 149, 150
sorbifolia, Presl. 149
SALPICHLÆNA, J. Sm. 26
scandens, Presl. 26
volubilis, J. Sm. 26, 240
SALVINIA, Mich. 234
Azolla, Radd. 234
biloba, Radd. 235
hispida, H. B. Kth. 234
oblongifolia, Mart. 235
rotundifolia, Willd. 235
SALVINIACÉES. 234
SCHIZÆA, Sm. 205
bifida, Sw. 205
elegans, Sw. 205
flabellum, Mart. 205
incurvata, Schkh. 205
pacificans, Mart. 205
penicillata, H. B. 204
Pennula, Sw. 204
spectabilis, Mart. 205
subtrijuga, Mart. 204
trilateralis, Schkh. 204
SCHIZÉACÉES. 204, 210
SCOLOPENDRIÉES. 74, 75
Scolopendrium ambiguum, Radd. 74
SELAGINELLA, Spring. 226
amazonica, Spring. 230
apus, Spring. 227
Bahiensis, Spring. 230
brevipes, F. 226
Breynii, Spring. 228
calcarata, A. Br. 233
camptostachys, F. 229
coarctata, Spring. 230
conduplicata, Spring. 233
convoluta, Spring. 226
crassinervia, Spring. 227
decomposita, Spring. 231
distorta, Spring. 231
erectifolia, Spring. 227
ericoides, F. 228
erythropus, Spring. 230
excurrens, Spring. 231
flexuosa, Spring. 229
Gardneri, Spring. 229
Glaziovi, F. 232
* *hygrometrica*, Spring. 226
Jungermannioides, Spring. 228
lævigata, Spring. 230
macrostachya, Spring. 229
marginata, Spring. 231
microphylla, Spring. 227
muscosa, Spring. 228
Pœppigiana, Spring. 233
polysperma, Spring. 227
rupestris, Spring. 226
— borealis, Spring. 226
— tropica, Spring. 226
stellata, Spring. 233
suavis, Spring. 232
sulcata, Spring. 231
thuyæfolia, Spring. 227
SOROMANES, F. 17
integrifolium, F. 17
— var. salicifolium, Hook. 17
SPHÆROCIONIUM, Presl. 197
aureum, Presl. 197
ciliatum, Presl. 197
Grevilleanum, Presl. 197
productum, Presl. 197
pulchellum, Presl. 198
sericeum, Presl. 198
Stachygynandrum, Palis. Beauv. 226
STENOLOMA, F. 153, 154, 155, 30
bifida, F. 153
Glaziovi, F. 153
gratissima, F. 153
* Schlechtendalii, F. 153, 154
SYNECHIA. 31
TÆNIOPSIS, J. Sm. 26, 27
Tœnitis graminifolia, Hook. 28
— *linearis*, Klfss. 28
? *pumila*, Klfss. 28

Pages.
Tarachia, Presl. 72
Tectaria, Cavan. 124, 30
Calahuala, Cavan. 124
caudata, Cavan. 127
coriacea, Lk. 124
Trichomanes, Presl. 185
abrotanifolium, V. d. Bosch. 190
acrocarpon, F. 188
anceps, Hook. 189
auratum, F. 186
Bancrofftii, H. et Gr. 185
bicorne, Hook. 185
brachypus, Kze. 190
Brasiliense, Desv. 188
cognatum, Presl. 185
coriaceum, Kze. 185
crispum, L. 186
cristatum, Klfss. 186
— var. macrothrix. 186
elegans, Rudg. 184
emarginatum, Presl. 188
firmulum, Presl. 189
floribundum, H. et B. 185
frondosum, F. 190
fucoides, Hedw. 192
heterophyllum, H. B. Kth. 184
incisum, Klfss. 185
lætevirens, F. 191
laxum, Kl. 187

Pages.
leptophyllum, V. d. Bosch. 188
Luschnathianum, Presl. 190, 191
Mandioccanum, Radd. 189
Martiusii, Presl. 187
montanum, Hook. 191
osmundoides, Poir. 184
pellucens, Kze. 186
pennatum, Klfss. 185
pilosum, Mart. 187
pilosum, Radd. 187
pinnatum, Hedw. 185
Plumula, Presl. 187
Pœppigii, Presl. 186
Prieurei, Kze. 189
pumilum, Sw. 191
pyxidiferum, L. 187
pyxidiferum, Hedw. 188
pyxidiferum, H. et Gr. 188
quercifolium, H. et Gr. 191
quercifolium, Desv. 186
radicans, Clauss. (H. F.) 190
radicans, H. et Gr. 190
radicans, Kze. 190
radicans, Sw. 189
— macilentum. 190
rigidum, Sw. 189, 190
rupestre, Radd. 190
scandens, Hedw. 189
Schiedeanum, C. Mull. 188

Pages.
Schiedeanum, var. Brasiliana. 188
Sellowianum, Presl. 187
Serricula, F. 189
sinuosum, Willd. 186, 185
tenerum, Spreng. 188
Tranninense, F. 187
* trichoideum, Sw. 188
venustum, Desv. 193
Trichomanoidées. 184
Trichopteris, Presl. 174
crenata, Pohl. 175
elegans, Presl. 175
excelsa, Mart. 174
Trismeria, F. 56
argentea, F. 56
* aurea, F. 56
Trochopteris, Gardn. 212
elegans, Gardn. 212
Vittaria, Sm. 26
angustifrons, Mich. 27
Gardneriana, F. 26
— delicatula, F. 26
graminifolia. 27
lineata, L. 27
scabrida, Klotz. 27
stipitata, Kze. 27
VITTARIÉES. 26, 27
Xiphopteris, Klfss. 28, 29
serrulata, Klfss. 28



SECOND APPENDICE.

Plantes récoltées, au mois d'août 1869, dans la Serra os Orgaos par M. Glaziou, et qui n'ont pu figurer dans la Table alphabétique.

(Envoi parvenu après la terminaison de l'ouvrage.)

1. ACROSTICHUM, F. (Page 1.)

† 14². CRASPEDARIÆFORME, F., n° 3350. — Espèce très-distincte; les rhizomes sont assez déliés, très-écailleux, rameux, chargés de fibrilles radicales, fort ténues, entourées de poils dorés et soyeux. Ces rhizomes portent des frondes espacées, longuement pétiolées, à pétiole presque capilliforme, lesquelles servent de support à des lames elliptiques très-obtuses, assez souples; les nervilles sont ponctiformes à leur terminaison vers la marge. La longueur totale est de 10-14 centim.; la lame mesure 7-9 centim. sur 1,7 de largeur.

24². HIRTIPES, F. (page 238), n°s 3547 et 3548.

25². STRAMINEUM, F. (page 238), n°s 3549.

26. LEPTOPHYLLUM, F. (page 8), n° 3546.

† 31². OBLIQUATUM, F., n° 3545. — Évidemment nouvelle, nous ne l'avons reçue que stérile; elle est rampante, grêle, à pétiole stramineux, largement canaliculé, presque deux fois plus long que les lames, terminées en une longue pointe, amincies vers les deux extrémités et remarquables par leur obliquité; elles sont opaques, nues et d'un vert assez intense. La longueur totale est de 28-35 centim. sur 2 à 2,3 centim. de largeur.

34. LINDENII, Bory (page 10), n° 3551. (État stérile.) Au sommet de la Serra os Orgaos.

38. PLUMOSUM, F. (page 11), n° 3555.

2. LOMARIOPSIS, F. (Page 13.)

ERYTHRODES, F. (page 14), n° 3554.

11. LOMARIA, Willd. (Page 20.)

IMPERIALIS, F. et Glaz. (page 21), n° 3556.

14. VITTARIA, Sm. (Page 26.)

1. GARDNERIANA, F. (page 26), n° 3553.

20. ADIANTUM, L. (Page 31.)

MACROPHYLLUM, Sw. (page 31), n° 3566.
INTERMEDIUM, Sw. (p. 35), n° 3565.

23. PTERIS, L. (Page 40.)

4². NEMORALIS, Willd., *Filic.*, p. 386. *P. biaurita*, L., *Sp. pl.*, n° 1534. Glaziou, n° 3567. — Le pétiole est stramineux, lisse, souvent rougeâtre près du rhizome, fortement canaliculé et très-long; les frondes sont bipartites à la base. Les frondes sessiles sont terminées en queue, minces de tissu, à segments nombreux et rapprochés, oblongs et très-souples; les nervilles sont en relief. Elle atteint au delà d'un mètre.

8. ROSTRATA, F. (page 41), n° 3569. Var. *Brasiliana*.

24. PELLÆA, Link. (Page 42.)

6. FLAVESCENS, F. (page 44), n° 3572.

26. LITOBROCHIA, Presl. (Page 45.)

3. BRASILIENSIS, Radd., *sub pteride* (page 47), n° 3570.

4. DENTICULATA, Sw., *sub pteride* (page 47), n° 3571. — Espèce très-polymorphe; ce spécimen est divisé à la base; les segments ont une très-grande tendance à devenir pinnatifides; elle est élégamment dentée.

6. GIGANTEA, Willd., *sub pteride* (page 47), n° 3568. — Elle est remarquable par ses grandes dimensions et la délicatesse du pétiole et du rachis.

35. NEVROGRAMME, Lk. (Page 56.)

† SCANDENS, F.

Frondibus bipinnatis, superne pinnatis, sericeis, flexuoso-scandentibus; petiolis rachibusque flexuosis, purpureis, canaliculatis; frondulis primariis petiolatis, apice denticulato, obtusissimo; frondulis secundariis basi cordatis, late crenulatis, marginibus dentatis; sporotheciis linearibus, marginem non attingentibus; sporangiis crassis, annulo 20 articulato; sporis trigonis, fuscis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Serra os Orgaos, Glaziou, n° 3552) [August. 1869].

Filix habitu distinctissima; petiolo lævi purpureo, rachibus flexuosis.

(Longueur : 65 centim. et probablement plus ; les frondules primaires de la base mesurent 10-11 centim., les secondaires 21-23 millim.)

Nous regrettons de ne pouvoir figurer cette belle espèce; heureusement elle est la seule du genre qui s'appuie sur les plantes voisines pour se soutenir, il sera donc facile de là reconnaître; ses pétioles, ainsi que ses rachis, ceux-ci flexueux, sont du plus beau rouge.

38. GYMNOGRAMME, Desv. (Page 58.)

4. ATTENUATA, F. (page 59), n° 3558. — Le pétiole est épais à la base et noirâtre, ainsi que les écailles dont il est chargé; cette couleur devient d'un brun foncé vers le haut et sur les rachis. Les sporanges sont presque toujours sporadiques et forment très-rarement des séries linéaires continues.

43. ASPLENIUM, L. (Page 61.)

2. CRENULATUM, Presl. (page 61), n° 3564. — Cette belle espèce est gigantesque; nous avons sous les yeux un spécimen qui atteint $1^{m},20$ sur 11-12 centim. de largeur, et sans doute il en est encore de plus grands.

42. FORMOSUM, Willd. (page 73), n° 3561, à Santa-Anna.

43. ADIANTOIDES, Radd. (page 73), n° 3559. — Ce spécimen est prolifère au plus haut degré; le rachis, qui est considérablement allongé, a émis un bourgeon terminal, lequel a produit une souche enracinée, et il en est sorti une fronde mesurant 30 centim. Ce qui s'est produit ici est absolument analogue au phénomène tant admiré du figuier à pagodes.

47. CICUTARIUM, Sw. (page 73), n° 3560, à Santa-Anna. — C'est là le premier spécimen brésilien que nous ayons vu.

45. ANTIGRAMME, Presl. (Page 74.)

5. Lageana, F. et Glaz.

Frondibus oblongis, obtusiusculis, basi rotundatis; petiolo longo, canaliculato, surculo crasso, fibrilloso; sporotheciis inæqualibus, angustis, per paria remotis; sporangiis parvis, pedicello longissimo, annulo angusto, 14-16 articulato; sporis ovoideis.

Habitat in Brasilia fluminensi (Serra os Orgaos, forêt Santa-Anna).

Filix aspectu scolopendri officinalis Europæ, sed nervatione diversa.

(Longueur : 32-36 centim., dont le pétiole fait un peu plus de la moitié, sur 6-7 centim. de largeur.)

Cette espèce, que M. Glaziou dit très-rare, ne diffère de l'*A. Douglasii* que par une consistance des frondes plutôt cartilagineuse que membraneuse, par la base des lames arrondie ou même tronquée et non cordiforme, enfin par des sporothèces linéaires très-longs, très-inégaux et assez distants de leurs correspondants.

46. DIPLAZIUM, Sw. (Page 75.)

1. plantagineum, Sw. (page 75), n° 3563. — Cette espèce est très-fréquemment auriculée à la base.

16. expansum, Willd. (page 79), n° 3557, var. β *glabriusculum,* Th. Moore.

49. GRAMMITIS, Sw. (Page 85.)

† 1². Organensis, F.

Frondibus pinnatifidis, lineari-lanceolatis, rigidiusculis, opacis, basi decrescentibus, glabriusculis, petiolo glabro; segmentis obovatis, multis, imbricatis; sporotheciis linearibus, receptaculo longiusculo, nigrescente, angustissimo, canaliculato (id est leviter bifido); sporangiis breve pedicellatis, annulo 14-16 articulato.

Habitat in Brasilia fluminensi (n° 3573).

Filix parvula, surculo repente, pilis rigidis, squamiformibus cooperto.

Icon. : *Tab. LXXVIII, fig. 1.*

(Longueur : 10-11 centim. sur 5-7 millim. de largeur.)

Cette espèce sera facile à reconnaître au nombre considérable de ses segments (45-50), qui s'imbriquent souvent par la marge, et au réceptacle des sporanges linéaire, assez long et canaliculé à son sommet.

50. POLYPODIUM, L.

1². ARGYRATUM, Bory, *in Willd., Filic.* (page 175), var. *Brasiliana,* n° 3577. — Frondes profondément pinnatifides, couvertes en dessous d'une sécrétion résinoïde qui lui donne un aspect furfuracé ou farineux. Le type brésilien diffère du type de Bourbon par des frondes offrant quelques segments décrescents et par les écailles de la souche, plus longues et plus dorées. Elle a le port du *P. vulgare,* L.

2. TENUICULUM, F. (page 86), n° 3577.

6². HIRSUTULUM, F. (page 87), n° 3578.

8². PERUVIANUM, Desv. (page 242), n° 3575, sommité des Orgues.

9. IMMERSUM, F. (page 88), n° 3576.

15². BLANDUM, F., 7e *Mém. sur les fougères,* page 59, t. 22, fig. 5, n° 3580, au sommet des Orgues. — Nous l'avions indiquée comme provenant de l'Amérique australe, sans autre localité précise. Les frondes sont rassemblées sur une petite souche couverte, ainsi que les pétioles, de poils soyeux qui cessent de se montrer dans le haut de la plante, qui est parfaitement glabre.

53. GONIOPHLEBIUM, Presl.

5. HIRSUTISSIMUM, F. (page 108), n° 3585.

54. CAMPYLONEVRON, Presl. (Page 113.)

15. JUGLANDIFOLIUM, F. (page 117), n° 3574. — Les frondules atteignent jusqu'à 40 centim.

77. ALSOPHILA, R. Br. (Page 156.)

NIGRESCENS, F. (page 170), n° 3581. Forêt do Cayado.

79. TRICHOPTERIS, Presl. (Page 174.)

ELEGANS, Presl. (page 175), n° 3582.

81. HEMITHELIA, Presl. (Page 175.)

GARDNERIANA, Presl. (page 175), n° 3583. — Les pétioles ne sont pas épineux, ils sont considérablement renflés à la base, d'où ils émettent des radicelles (?) rougeâtres, fort longues, rameuses et à rameaux capillacés.

83. CYATHEA, Sm. (Page 176.)

SCHANSCHIN, Mart.? (page 180), n° 3584. Forêt do Cayado.

86. TRICHOMANES, Presl. (Page 185.)

CRISTATUM, Klfss. (page 186), n° 3587.

PRIEUREI, Kze. (page 189), *T. Mandioccanum;* Radd., *Filic. Bras.*, p. 64, t. 79, fig. 2? — Très-grande espèce, à rachis aplatis; elle noircit dans les herbiers. Glaziou, n° 3588.

89. HYMENOPHYLLUM, Sm. (Page 192.)

6. HIRSUTUM, Sw.? (page 193), n° 3592. — Les segments fructifères, un peu dilatés en coin, portent de 3 à 5 pyxidules, hérissées d'assez longs poils bi-trifurqués.

7. WILSONI? Hook. (page 193), n° 3591. — Elle est gazonnante, luisante et soyeuse.

13. JALAPENSE, Schlecht. (page 195), n°s 3590 et 3596?

15. CRISPUM, H. B. Kth. (page 195), n° 3593. Sommet des Orgues.

17. PODOCARPON, F. (page 196), n° 3595.

17². ECTOCARPON, F., *Hist. foug. et lycop. Antill.*, p. 115, t. 31, fig. 1, n° 3594. — Espèce bipinnée, glabre, pétioles écailleux, rachis dentés en scie; pyxidules libres de parenchyme, presque pédicellées; elle est longuement rampante, avec un rhizome délié.

RUFUM, F. (page 198), n° 3589.

94. ANEIMIA, Sw. (Page 205.)

14. TOMENTOSA, Sw. (page 208), n° 3598.

17. RADICANS, Radd. (page 209), n° 3597. Var. *Organensis.* — Frondes fasciculées sur une souche très-fibrilleuse, pétioles stramineux, fort longs, frondes allongées, décroissant sur le rachis qui se prolonge et devient radicant. Les frondules, au nombre d'une vingtaine et plus, sont assez courtes et très-obtuses; les épis fructifères sont fort grêles.

18. COLLINA, Radd. (page 209), n° 3599.

† 94². ANEIMIÆBOTRYS, F.

Sporotheciis racemosis, bipinnatis, ad basim frondium evolventibus; segmentis alternis, planiusculis digitatisque; sporangiis ovalibus, sessilibus, nudis, extrorsum dehiscentibus.

Frondibus diplotaxibus, sterilibus bipinnatis, fertilibus inferne proliferis.

Filix rigida, nervillis simplicibus.

† 1. ASPERA, F.

Frondibus bipinnatis, in ambitu triangularibus; petiolo aspero; frondulis triangularibus, divaricatis, ad basim lanatis; segmentis crenatis, crenis inferioribus subliberis obtusisque; frondibus fertilibus mixtis, superne sterilibus, inferne sporangias in racemo composito congestas ferentibus.

Habitat in Brasilia fluminensi (Serra os Orgaos, au Morro Queimado, chemin dos Macacos, n° 3821).

Filix notabilis, petiolo helveolo, aspero, surculo repente, squamis auratis vestito.

ICON. : *Tab. LXXVIII, fig. 2.*

(Longueur : 57 centim., dont le pétiole fait la moitié environ; les frondules primaires stériles mesurent de 8 à 9 centim.; la grappe fertile, 12 centim.)

Cette fougère est très-curieuse. La constitution toute spéciale de la fructification la sépare nettement des *aneimia.* Dans ce genre, les sporanges forment des épis rameux, dressés, qui naissent à l'aisselle des frondules dont elles sont indépendantes; ici, au contraire, elles s'étalent et constituent des grappes composées qui terminent la fronde et résultent de la métamorphose de toutes les parties de la frondule; celles-ci sont bipinnées, la grappe fructifère est tripinnée, et chaque nerville a servi de point de développement aux sporanges.

LYCOPODIUM, Spring. (Page 220.)

SERPYLLIFOLIUM, F. (page 222), n° 3600.

SELAGINELLA, Spring. (Page 226.)

APUS, Spring. (page 227), n° 3543.

ERYTHROPUS, Spring. (page 230), n° 3544.

TABLE DES MATIÈRES DU SECOND APPENDICE.

	Pages.
ACROSTICHUM craspedariæforme, F.	261
— hirtipes, F.	261
— leptophyllum, F.	261
— Lindenii, Bory.	261
— obliquatum, F.	261
— plumosum, F.	261
— stramineum, F.	261
ADIANTUM intermedium, Sw.	262
— macrophyllum, Sw.	262
ALSOPHILA nigrescens, F.	265
ANEIMIA collina, Radd.	266
— radicans, Radd.	266
— tomentosa, Sw.	266
ANEIMIÆBOTRYS aspera, F.	267
ANTIGRAMME Lageana, F. et Glaz.	264
ASPLENIUM adiantoides, Radd.	263
— cicutarium, Sw.	263
— crenulatum, Presl.	263
— formosum, Willd.	263
CAMPYLONEVRON juglandifolium, F.	265
CYATHEA Schanschin, Mart. (?)	266
DIPLAZIUM expansum, Willd.	264
— plantagineum, Sw.	264
GONIOPHLEBIUM hirsutissimum, F.	265
GRAMMITIS Organense, F.	264
GYMNOGRAMME attenuata, F.	263
HEMITHELIA Gardneriana, Presl.	265
HYMENOPHYLLUM crispum, H. B. Kth.	266
— ectocarpon, F.	266
— hirsutum, Sw. (?)	266
— Jalapense, Schlecht.	266
— podocarpon, F.	266
— rufum, F.	266
— Wilsoni ? Hook.	266
LITOBROCHIA Brasiliensis, Radd.	262
— denticulata, Sw.	262
— gigantea, Willd.	262
LOMARIA imperialis, F. et Glaz.	262
LOMARIOPSIS erythrodes, F.	262
LYCOPODIUM serpyllifolium, F.	267
NEVROGRAMME scandens, F.	263
PELLÆA flavescens, F.	262
POLYPODIUM argyratum, Bory.	265
— blandum, F.	265
— hirsutulum, F.	265
— immersum, F.	265
— Peruvianum, Desv.	265
— tenuiculum, F.	265
PTERIS nemoralis, Willd.	262
— rostrata, F.	262
SELAGINELLA apus, Spring.	267
— erythropus, Spring.	267
TRICHOMANES cristatum, Klfss.	266
— Prieurei, Kze.	266
TRICHOPTERIS elegans, Presl.	265
VITTARIA Gardneriana, F.	262

ERRATA.

Page 33 : *Tab. VIII*, au lieu de *fig. 3*, mettez *fig. 2*.
Page 98 : *Tab. XXXII*, au lieu de *fig. 2*, mettez *fig. 1*.
Page 103 : *Tab. XXXI*, au lieu de *fig. 3*, mettez *fig. 1*.
Page 129 : au lieu de *Tab. XL*, mettez *Tab. XLI*.
Page 139 : au lieu de *Tab. XLVII*, mettez *Tab. XLVI*.
Page 183 : *Tab. LXII*, effacez *fig. 2*.



J. Meyer del. et lith.

Lith. E. Simon à Strasby

Fig. 1. Acrostichum *Glaziovi, F.* | *Fig. 2* Acrostichum *acuminans, F.*



J. Meyer del. et lith.

Lith. E. Simon à Strasbg.

Fig. 1. **Acrostichum** *chrysolepis, F.* | Fig. 2. **Acrostichum** *spissum, F.*

Fig. 3 **Acrostichum** *mollissimum, F.*



A. Jobin del. et lith.

Lith. F. Simon à Strasby.

Fig. 1. **Acrostichum** *papyraceum, F.* | *Fig. 2.* **Acrostichum** *prælongum, F.*

A. Jobin del. et lith

Lith. E. Simon à Strasbg

Fig. 1, **Acrostichum** *ovalifolium, F.* | *Fig. 2* **Pellæa** *microphylla, F.*
Fig. 3 **Pellæa** *subsimplex, F.*



A. Jobin del. et lith.

Lith. E. Simon à Strasbg.

Acrostichum *hymenodiastrum, F.*



A. Jobin del. et lith.

Lith. E. Simon à Strasbg.

Acrostichum *amplissimum, F.*

Glazion del. A. Jobin lith.

Lith. E. Simon à Strasbourg.

Fig. 1. **Lomaria** *imperialis, F. Glaz.* || Fig. 2. **Lomaria** *Fialhoi, F.*



J. Meyer del. et lith.

Lith. E. Simon à Stasbg.

Fig. 1. **Blechnum** *diplotaxicum, F.* ‖ *Fig. 2* **Adiantum** *subaristatum, F.*
Fig. 3 **Lomaria** *mucronata F.*



H. Dress del. et lith.

Lith. E. Simon à Strasbg.

Fig. 1. Adiantum *subramosum, F.* | *Fig. 2.* Adiantum *tomentellum, F.*

Fig. 3. Hewardia *diphylla, F.*



J. Meyer del. et lith.

Lith. E. Simon a Strasbg.

Fig. 1 **Pellæa** *quinque lobata, F.* | *Fig. 2* **Heteropteris** *Doryopteris, F.*



A. Jobin del. et lith.

Lith. E. Simon a Strasbg.

Fig. 1. **Litobrochia** *angustata, F.* | Fig. 2. **Litobrochia** *prœalta, F.*
Fig. 3. **Litobrochia** *sericea, F.*



A. Sobin del. et lith.

Lith. B. Simon a Strasby

Fig. 1. **Litobrochia** *horisontalis, F.* ‖ *Fig. 2.* **Litobrochia** *varians, F.*



J. Meyer del. et lith.

Lith. E. Simon à Strasbg.

Fig. 1. **Adiantopsis** *obtusissima, F.* | *Fig. 2.* **Cheilanthes** *glaberrima, F.*

Fig. 3. **Hypolepis** *serrata, F.*



H. Dress del. et lith.

Lith E Simon à Strasbg

Fig. 1. **Gymnogramme** *oppositans, F.* | Fig. 3. **Gymnogramme** *patula, F.*

Fig. 2. ——— *attenuata, F.* | Fig. 4 ——— *expansa, F.*



A. Jobin del. et lith.

Lith. E. Simon à Strasbg.

Asplenium *Escragnollei, F.*



A. Jobin del. et lith.

Lith. E. Simon à Strasbg.

Fig 1. **Asplenium** *camptocarpon, F.* | *Fig 2.* **Asplenium** *chærophylloides, F.*



J. Meyer del. et lith.

Lith. E. Simon à Strbg.

Fig. 1. **Asplenium** *jucundum, F.* | *Fig. 2.* **Asplenium** *Sarronii,* **Glaziou.**



A. Jobin del et lith

Lith E. Simon à Strsbg.

Fig. 1. Asplenium *incurvatum*, F. | Fig. 2. Asplenium *ovalescens*, F.

A. Sobin del et lith.

Lith. E. Simon à Strsbg

Fig. 1. **Asplenium** *stenocarpon, F.* | *Fig. 2.* **Asplenium** *Gastonis, F.*

Fig. 3. **Grammitis** *fluminensis, F.*

Tab XV



A. Jobin del et lith

Lith. F. Simon à Strasbg

Fig. 1. **Hypolepis** *parviloba, F.* | Fig 2 **Diplazium** *parallelogrammum, F.*



A. Jobin del. et lith.

Lith. E. Simon à Strasbg.

Fig. 1. **Diplazium** *dissimile, F.* | *Fig. 2.* **Diplazium** *longipes, F.*



A. Jobin del. et lith.

Lith. E. Simon à Strasbg.

Fig. 1, **Diplazium** *leptochlamys, F.* | Fig. 2, **Pellæa** *flavescens, F.*

A. Jobin del. et lith.

Lith. E. Simon à Strasbg.

Fig. 1. **Diplazium** *herbaceum, F.* | *Fig. 2.* **Diplazium** *leptocarpon, F.*



A. Jobin del. et lith.

Lith. E. Simon à Strasbg

Fig. 1. **Diplazium** *remotum, F.* | *Fig. 2.* **Diplazium** *rostratum, F.*



H. Dress. del. et lith.

Lith. E. Simon à Strasbg

Fig. 1. **Meniscium** *elongatum, F.* ‖ *Fig. 2.* **Meniscium** *longifolium, F.*

Tab. XXVI.



H. Dress del et lith

Lith. E. Simon à Strasbg

Fig. 1, **Polypodium** *Pleopeltidis, F.* | Fig. 3 **Polypodium** *confluens, F.*

Fig. 2. ——— *hirsutulum, F.* | Fig. 4 ——— *heteroclitum, F.*



J. Meyer del et lith.

Lith. E. Simon à Strasbg.

Fig. 1, **Polypodium** *immersum, F.* | *Fig. 2.* **Polypodium** *ciliare, F.*
Fig. 3, **Polypodium** *ovalescens, F.*



A. Jobin del. et lith.

Lith. F. Simon à Strasbg.

Fig. 1. **Polypodium** *robustum, F.* | *Fig. 2.* **Polypodium** *Filicula, Klfss.*

Fig. 3. **Polypodium** *extensum, F.*



A. Jobin del et lith.

Lith. E. Simon à Strasbourg.

Fig. 1. **Polypodium** *repandum, F.* ‖ *Fig. 2.* **Polypodium** *paradisiastrum. F.*

Tab. XXX.



A. Jobin del. et lith.

Lith. E. Simon à Strasbg.

Fig. 1. **Phegopteris** *tenuis, F.* | *Fig. 2* **Phegopteris** *heterocarpa, F.*
Fig. 3. **Phegopteris** *flavo-punctata, Klfs. (sub polypodio.)*



A. Jobin del. et lith.

Lith. E. Simon, Strasb.g

Fig. 1. **Phegopteris** *eriopodia, F.* ‖ *Fig. 2.* **Phegopteris** *scrobiculata, F.*



A. Jobin del et lith.

Lith. E. Simon à Strasbg.

Fig. 1. **Phegopteris** *tricholepis, F.* | *Fig. 2.* **Phegopteris** *denticulata, F.*

Fig. 3. **Phegopteris** *propinqua, F.*



J. Meyer del. et lith.

Lith. E. Simon à Strsbg

Fig. 1. **Goniopteris** *platypes, F.* | *Fig. 2.* **Goniopteris** *hastata, F.*
Fig. 3. **Goniopteris** *macrocladia, F.*



A. Jobin del. et lith.

Lith E. Simon à Strasbg.

Fig. 1. **Goniophlebium** *pectinans, F.* ‖ *Fig. 2.* **Goniophlebium** *grammatoides, F.*

Fig. 3. **Goniophlebium** *Gauthieri, F.*



A Jobin del. et lith.

Lith. E. Simon à Strasbg

Fig. 1. **Campylonevron** *leuconevron, F.* ‖ *Fig 2.* **Campylonevron** *fallax, F.*
Fig. 3. **Campylonevron** *acrocarpon, F.*



A. Jobin del. et lith.

Lith. E. Simon à Strasbourg

Fig. 1. **Craspedaria** *cordifolia, F.* | *Fig. 2.* **Craspedaria** *crispata F.*



A. Jobin del. et lith.

Lith. E. Simon à Strsbg

Fig. 1. **Polypodium** *exiguum, F.* ‖ *Fig. 2.* **Craspedaria** *grandis. F.*

Fig 3. **Drynaria** *acuminata. F.*

H. Dress del. et lith.

Lith. E. Simon à Strasbg.

Fig. 1. **Polystichum** *Tijucense, F.* | *Fig. 2.* **Polystichum** *aculeolatum, F.*



H. Dress del. et lith.

Lith. E. Simon à Strasbg

Fig. 1. **Polystichum** *remotum, F.* | *Fig. 2.* **Polystichum** *giganteum, F.*



H. Dress del. et lith.

Lith. E. Simon à Strasbg.

Fig. 1, **Polystichum** *microsorium, F.* | *Fig. 2,* **Polystichum** *lanosum, F.*



A. Jobin del. et lith.

Lith. E. Simon à Strasbg

Fig. 1. **Polystichum** *platylepis, F.* ‖ *Fig. 2.* **Polystichum** *longecuspis, F.*



H. Dress del. et lith.

Lith. E. Simon. Strasbourg.

Fig. 1. **Aspidium** *sericeum, F.* | *Fig. 2.* **Aspidium** *helvetum. F.*

Fig. 3. **Aspidium** *elatior, F.*



A. Jobin del. et lith.

Lith. E. Simon à Strsbg.

Fig. 1. **Aspidium** *tenerrimum, F.* | *Fig. 2,* **Aspidium** *basilare, F.*



H.Dress del. et lith.

Lith. E. Simon à Strasbg.

Fig. 1. **Aspidium** *eriocaulon, F.* ‖ *Fig. 2.* **Aspidium** *amaurolepis, F.*



A. Jobin del. et lith.

Lith E. Simon à Strasbg.

Fig. 1. **Campylonevron** *juglandifolium, F.* | *Fig. 2.* **Aspidium** *Isabellinum, F.*



H. Dress del. et lith.

Lith. E. Simon à Strbg

Fig. 1, **Aspidium** *nephrodioides, F.* | *Fig. 2* **Aspidium** *flexuosum, F.*



H. Dress del. et lith.

Lith. E. Simon à Strasbg

Fig. 1, **Aspidium** *crenulans, F.* ‖ *Fig. 2,* **Aspidium** *phæochlamys, F.*

Fig. 3, **Aspidium** *ramosum, F.*



H. Dress del. et lith.

Lith. E. Simon à Strabg.

Fig. 1. **Aspidium** *macrum, F.* | *Fig. 2.* **Aspidium** *latissimum, F.*



H Dress del. et lith.

Lith. E. Simon à Strasbg.

Fig. 1. **Aspidium** *dicksonioides, F.* | *Fig. 2.* **Aspidium** *graciliges, F.*
Fig. 3. **Hymenophyllum** *viridissimum, F.*

Tab. L.



H. Dress del et lith

Lith. F. Simon à Strasbg.

Fig. 1. **Aspidium** *rivularioides, F.* ‖ *Fig. 2.* **Aspidium** *quadrangulare, F.*

J. Postma del et lith

Lith E. Simon à Strasbg

Fig. 1 **Microlepia** *Fluminensis F.* | *Fig. 2.* **Microlepia** *lindsayæformis. F.*

Fig. 3. **Lophosoria** *dorsalis F.*



A. Jobin del. et lith.

Lith. E. Simon à Strsbg.

Fig. 1. **Stenoloma** *Glaziovi, F.* | *Fig. 2.* **Stenoloma** *gratissima, F.*

Fig. 3 **Ophioglossum** *Spruceanum, F.*

A. Jobin del. et lith.

Lith E. Simon à Strasbg.

Fig. 1 **Alsophila** *scrobiculans, F.* | *Fig. 2.* **Cyathea** *sphærocarpa, F.*



A. Jobin del. et lith.

Lith. E. Simon à Strasbourg.

Fig. 1. **Alsophila** *nigrescens, F.* ‖ Fig. 2. **Alsophila** *aperta, F.*



A. Jobin del. et lith.

Lith. E. Simon à Strasbg.

Fig. 1, **Alsophila** *leptocladia, F.* ‖ *Fig. 2* **Alsophila** *Glaziovi, F.*

Tab. LVI.

A. Jobin del. et lith.

Lith. E. Simon à Strasbg

Fig. 1 **Alsophila** *eriocarpa, F.* | *Fig. 2.* **Alsophila** *Corcovadensis, F.*



A. Jobin del. et lith.

Lith. E. Simon à Strasbg

Fig. 1. **Alsophila** *Ceropteris, F.* | *Fig 2.* **Alsophila** *dichromatolepis, F.*



A Jobin del. et lith.

Lith. E. Simon à Strasbg

Alsophila *impressa, F.* | *Fig. 2.* **Alsophila** *Unguis-Cati, F.*

A. Jobin del et lith.

Lith. E. Simon à Strasbourg

Fig. 1, **Alsophila** *rufa, F.* ‖ *Fig. 2.* **Alsophila** *contracta, F.*



A. Jebin del. et lith.

Lith. E. Simon, à Strasbourg.

Fig. 1. **Alsophila** *pectinata, F.* | *Fig. 2.* **Alsophila** *Ludoviciana, F.*



A Jobin del. et lith.

Lith. E Simon à Strasbourg

Fig. 1. **Phegopteris** *marginans, F.* | *Fig. 2.* **Alsophila** *glumacea, F.*



H. Dress del. et lith.

Lith. E. Simon à Strasbg.

Cyathea *abrupte-caudata*, F.



A. Jobin del. et lith.

Lith. E. Simon à Strasbg.

Fig. 1. **Alsophila** *Tijucensis, F.* | *Fig. 2.* **Cyathea** *mamillata, F.*



A. Jobin del. et lith.

Lith. E. Simon à Strasbg

Fig. 1. **Cyathea** *acanthomelas, F.* ‖ *Fig. 2.* **Cyathea** *Taunaysiana, F.*

A. Jobin del. et lith.

Lith E. Simon à Strasbg

Cyathea *leucosticta, F.*



A. Jobin del et lith.

Lith. E. Simon à Strsbg.

Fig. 1. **Cyathea** *attenuata, F.* *Fig. 2,* **Cyathea** *Feei,* **Glaz.**



H. Dress. del. et lith.

Lith. E. Simon à Strasbg.

Fig. 1, **Trichomanes** *auratum, F.* | *Fig. 2.* **Trichomanes** *læte-virens, F.*



H. Dress del. et lith.

Lith. E. Simon à Strasbg.

Fig. 1. **Trichomanes** *frondosum, F. (pinnatum.)* ‖ *Fig. 2.* **Trichomanes** *frondosum, F. (bipinnatifidum.)*
Fig. 3. **Trichomanes** *Serricula, F.*



H. Dress del. et lith.

Lith. E. Simon à Strasbg.

Fig. 1. **Trichomanes** *Tranninense, F.* ‖ *Fig. 2.* **Hymenophyllum** *notabile, F.*

Fig. 3. **Hymenophyllum** *microcarpon, F.*



H. Dress del. et lith.

Lith. E. Simon, à Strasbourg.

Fig. 1. **Trichomanes** *acropteron, F.* ‖ *Fig. 2.* **Hymenophyllum** *asplenioides, Sw.* var: *palmatum.*

Fig. 3. **Hymenophyllum** *caulopterum, F. (sphærocionium).* ‖ *Fig. 4.* **Hymenophyllum** *rufum, F. (sphærocionium).*



H. Drees del. et lith.

Lith. E. Simon à Strasbg.

Fig. 1. **Didymoglossum** *quercifolium F.* ‖ *Fig. 2.* **Hymenophyllum** *crispum H.B. et Kth.* Var: *Brasiliana F.*

Fig. 3. **Hymenophyllum** *podocarpon, F.* ‖ *Fig. 4.* **Hymenophyllum** *producens. F.*

Fig. 5. **Danæa** *cordata, F.*



H. Dress del et lith.

Lith. E. Simon à Strasbg

Fig. 1 **Mertensia** *scalpturata, F.* | *Fig. 2* **Mertensia** *squamosa, F.*



H. Dress del. et lith.

Lith. E. Simon à Strasbourg.

Fig. 1 **Mertensia** *latissima. F.* || *Fig. 2.* **Mertensia** *spissa. F.*

Fig. 3. **Lycopodium** *serpyllifolium. F.*



H. Dress del. et lith.

Lith. E. Simon. à Strasbourg

Fig. 1. **Mertensia** *trifurcans. F.* || *Fig. 2.* **Aneimia** *Glaziovi. F.*

Fig. 3. **Aneimia** *microstachys, F.*

H. Dress del. et lith.

Lith. E. Simon à Strasbourg.

Fig. 1. **Selaginella** *brevipes, F.* ‖ *Fig. 2.* **Selaginella** *ericoides, F.*
Fig. 3. **Selaginella** *camptostachys, F.* ‖ *Fig. 4.* **Selaginella** *Glaziovi, F.*



A. Jobin del. et lith.

Lith. E. Simon à Strasbg.

Fig. 1. **Aerostichum** *hirtipes, F.* ‖ *Fig. 2.* **Polypodium** *gratum, F.*



A. Jobin del. et lith. Lith. E. Simon à Strasbg.

Fig.1. **Anogramme** *Biardii, F.* || *Fig.2.* **Phegopteris** *brevinervis (fragmentum). F.*
Fig.3. **Goniophlebium** *pictum, F.* || *Fig.4.* **Goniophlebium** *excelsior, F.*

H. Dress del. et lith.

Litl. E. Simon, Strasbourg.

Fig. 1. **Grammitis** *Organensis. F.* ‖ *Fig. 2.* **Aneimiæhotrys** *aspera. F.*

CRYPTOGAMES VASCULAIRES

DU BRÉSIL

NANCY, IMPRIMERIE DE BERGER-LEVRAULT ET Cie

CRYPTOGAMES VASCULAIRES

(FOUGÈRES, LYCOPODIACÉES, HYDROPTÉRIDÉES, ÉQUISÉTACÉES)

DU

BRÉSIL

IIe PARTIE: SUPPLÉMENT ET RÉVISION

PAR

A. L. A. FÉE

PROFESSEUR HONORAIRE DE L'UNIVERSITÉ
MEMBRE TITULAIRE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE
OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
ET DE L'ORDRE DE LA ROSE DU BRÉSIL

AVEC LE CONCOURS ÉCLAIRÉ DE M. LE DOCTEUR F. M. GLAZIOU, DIRECTEUR DES JARDINS IMPÉRIAUX DU BRÉSIL A RIO-JANEIRO
OFFICIER DE L'ORDRE DU CHRIST

MATÉRIAUX POUR UNE FLORE GÉNÉRALE DE CE PAYS

PARIS

J. B. BAILLIÈRE ET FILS, LIBRAIRES
RUE HAUTEFEUILLE, 19

VICTOR MASSON ET FILS, LIBRAIRES
RUE DE L'ÉCOLE DE MÉDECINE

BERGER-LEVRAULT & Cie, LIBRAIRES-ÉDITEURS
RUE DES BEAUX-ARTS, 5
MÊME MAISON A NANCY

1872-1873

QUELQUES MOTS D'INTRODUCTION.

Peu de temps après la publication de la *Cryptogamie vasculaire du Brésil,* dont nous donnons ici, dans une deuxième partie, le supplément et la révision, a paru le 49e fascicule de la *Flora Brasiliensis* publiée sous les auspices de Don Pedro II, empereur constitutionnel de ce vaste pays, si dignement régi, véritable paradis terrestre des naturalistes. Ce travail qui ne renferme que les polypodiacées, est dû à M. Baker, collaborateur de M. Hooker dont il a, trop complaisamment peut-être, adopté les idées systématiques. Quoique ce botaniste ait donné des preuves de son savoir et de ses études consciencieuses, il a été dominé évidemment par le désir de suivre pas à pas la route ouverte par son illustre maître dans la réduction des espèces. Ce projet, celui, au reste, de tous les botanistes descripteurs, est des plus sages, mais il faut y mettre de la mesure, autrement il en résulte des rapprochements forcés, des alliances impossibles, des synonymies trop chargées pour être vraies et un certain désordre incompatible avec un bon travail. Peut-être nous reprochera-t-on d'avoir péché dans un sens absolument contraire et d'avoir pris pour espèces de simples formes; il est en effet très-probable que nous ayons pu tomber dans ce défaut, mais nous croyons très-fermement que les inconvénients qui ont dû en résulter pour nos mémoires, ont été considérablement atténués par la publication des planches qui ont toujours accompagné notre texte. Ce sont là des pièces justificatives, mises sous les yeux des botanistes qui

peuvent ainsi facilement nous rectifier, s'il y a lieu. Quelle que soit la direction que l'on suive, Hooker ou Mettenius, Kunze ou Link, le travail est toujours sérieux et tend constamment au même but ; mais les yeux reçoivent des mêmes choses une impression différente ; l'importance qui leur est accordée, n'est pas semblable, et il en résulte souvent des jugements contradictoires sur la validité des espèces.

Il n'est pas de famille ou de classe naturelle qui traîne après elle un plus lourd fardeau de synonymies, et cependant il n'en est pas qui ait été autant travaillée. Nous croyons que les genres et les espèces seraient mieux fixés, si les caractères tirés des organes reproducteurs étaient plus nombreux et plus tranchés, et si les formes avaient moins de mobilité. Ces conditions défavorables d'étude, il faut pourtant les accepter en s'aidant de ce je ne sais quoi, qui révèle une création distincte et qui acquiert une véritable importance, s'il vient s'y joindre une modification organique que du reste le facies semblait annoncer, et qu'il n'est jamais bien difficile de trouver.

Sur les 112 genres qui constituent la flore ptéridographique du Brésil et qui renferment environ 860 espèces, il n'en est guère dont on ne puisse justifier la conservation, à moins de consentir à faire des sous-genres de certains d'entre eux, ce qui ne serait à vrai dire qu'une manière de confirmer les différences qui les séparent.

Voyons rapidement quels seraient ceux qui pourraient subir cette déchéance.

Dans le groupe des acrostichées, les genres *acrostichum*, *polybotrya*, *rhipidopteris*, *olfersia*, *gymnopteris* et *chrysodium*, semblent avoir tous une physionomie parfaitement distincte; le *lomariopsis* est un *acrostichum* pinné, mais il présente dans l'ensemble de ses espèces des particularités si curieuses et si rares, qu'il s'en éloigne beaucoup; il en est de volubiles, d'épineuses et d'hétérophylles, à un degré qui a valu à quelques-unes d'entre elles les noms spécifiques de *ludens* et de *variabilis*. Le *L. sorbifolia* offre un exemple éclatant de cette prodigieuse mobilité de formes. Il tient tout à la fois des lomariées par la dissimilitude des frondes stériles et des frondes fertiles, et des acrostichées par la situation des sporanges.

L'*anetium* est un genre ambigu ayant le port des *antrophyum* avec des sporanges superficielles et sporadiques. L'*heteronevron* pourrait, sans trop d'inconvénients, être réuni comme sous-genre au *gymnopteris*. Les genres *lomaria* et *blechnum*, très-voisins par certaines espèces, diffèrent cependant essentiellement par certaines autres. Le genre *hewardia* n'est séparé des *adiantum* à sporothèces continus (*synechia*) que par des nervilles anastomosées. Les ptéridées se divisent très-naturellement en deux petits groupes, l'un à frondes une ou plusieurs fois pinnées, l'autre à frondes palmato-pédiaires; au premier appartient le *litobrochia*, véritable *pteris* à nervilles en anastomoses, au second le *pellœa* à nervilles simples et le *doryopteris* à nervilles anastomosées, l'un et l'autre des plus polymorphes. Le genre *gymnogramme*, quoique très-voisin des *phegopteris*, a des espèces dans lesquelles la disposition sériale des sporanges est des plus manifestes, caractère qui s'affaiblit peu à peu et perd de sa valeur dans la série, c'est alors que le passage de l'un à l'autre genre se montre évident. Le genre *ceropteris* n'est à vrai dire qu'un *gymnogramme* à sécrétion céreuse ou résineuse, condition physiologique dont il n'est pas possible néanmoins de contester la valeur. M. le Dr Fournier, dans son beau travail des fougères du Mexique, a décrit et figuré un *asplenium*, l'*A. Ghiesbreghtii*, dont les nervilles sont anastomosées. Ce serait là, d'après le système de Presl, un genre distinct et nouveau. L'*antigramme* n'est à bien voir qu'un *scolopendrium* à nervilles anastomosées, même port, même forme. Le *diplazium* a une parenté très-étroite avec le genre *asplenium*, mais s'il est des espèces qui se rapprochent, il en est d'autres qui prennent une physionomie spéciale. Il est probable que les auteurs seront longtemps divisés sur la question de savoir s'il convient de les unir ou de les séparer. Ainsi nous ne voyons pas quels pourraient être les genres du groupe des polypodiées qu'il conviendrait de rejeter. Peut-être même devrait-on conserver le genre *lepicystis* de J. Smith pour y renfermer ces *goniophlebium* écailleux, si singuliers d'aspect et si difficiles à classer en raison de la nervation qui souvent échappe aux recherches les plus obstinées. Le genre *heteropteris*, ptéridée par le port et la situation des sporothèces, polypodiée par la manière dont ces sporothèces sont

groupés, est très-anomale et particulière au Brésil; il en est peu de plus curieuses. Les cyclodiées ont pour type le genre *polystichum* à sporothèces tantôt nus et tantôt indusiés; à côté de lui vient se placer l'*hemicardion,* remarquable par la manière singulière dont les oreillettes des pinnules s'imbriquent sur le rachis. Les aspidiées, si richement représentées par le genre *aspidium,* type du groupe, sont voisines par le port des *phegopteris* et si l'indusium, qu'il n'est pas toujours facile de trouver, fait défaut, on est exposé à faire passer les espèces de l'un dans l'autre genre. Le *lepidonevron* et le *nephrolepis,* le *cardiochlœna* et le *bathmium* que les auteurs ne sont pas tous disposés à adopter, sont cependant séparés par la forme de l'indusium, orbiculaire ou peltiforme, et par conséquent diversement attaché. Le *stenoloma,* tribu des davalliées, confine avec le genre *lindsaya,* quoique très-différent de port. Parmi les alsophilées, l'*hemithelia* et l'*hemistegia* se rapprochent notablement, n'étant séparés que par un indusium légèrement modifié.

Cette revue, quoique fort rapide et donnée en termes restreints, peut cependant suffire pour montrer l'inutilité d'une réforme générale. Quoi que l'on puisse faire plus tard dans cette voie, il est bien douteux qu'il se produise rien de définitif. Les familles dissidentes, hyménophyllacées, gleichéniacées, schizéacées et autres familles à genres restreints, échappent presque toutes à la controverse, aussi n'en dirons-nous rien.

Nous n'avons pu puiser dans l'ouvrage de M. Baker qu'avec une très-grande réserve, nous contentant presque toujours de relever des localités et d'indiquer un nombre très-réduit d'espèces bien distinctes, destinées à compléter la flore ptéridographique à laquelle nous consacrons tous nos soins. M. Baker en a étendu le domaine jusqu'aux Guyanes, et quoique, sous le rapport de la géographie botanique, il ne puisse en être blâmé, nous n'avons pas voulu l'y suivre. Mais il nous a paru utile de décrire succinctement, d'après ce botaniste, les fougères des bords du Rio-Negro et de l'Amazone, celles du Maragnon, du Para et de Saint-Paul dont nous avions indiqué les richesses avec trop de parcimonie, nos matériaux provenant surtout des recherches persévérantes de M. le Dr Glaziou, dans la province de Rio-Janeiro, à la vérité de beaucoup la plus riche et la mieux étudiée,

grâce à ce botaniste infatigable. C'est par là que M. Baker aura contribué à la fondation définitive d'une flore du Brésil, si tant est qu'on puisse jamais en réunir tous les éléments.

Strasbourg et Paris, 1869-1873.

Cet ouvrage, qui clôt la série des Mémoires sur la famille des fougères, a été édité aux frais du gouvernement brésilien par décision du 10 février 1872, sous le ministère de S. Exc. M. Théodore Machado, Freire Pareira da Silva, ministre du commerce, de l'agriculture et des travaux publics. Cette mesure généreuse, et toute spontanée, ajoute aux sentiments de gratitude que d'autres témoignages de haute estime avaient déjà fait naître chez l'auteur.

CRYPTOGAMES VASCULAIRES

DU BRÉSIL.

DEUXIÈME PARTIE, SUPPLÉMENT ET RÉVISION.

I. FOUGÈRES.

I. POLYPODIACÉES.

I. ACROSTICHÉES.

1. ACROSTICHUM, F., *Hist. des acrostich.*, p. 8 et 27, pl. 1, 24[1].

I. OLIGOLÉPIDÉES (écailles peu abondantes).

* *Frondes ovales-lancéolées, lancéolées ou ovoïdes.*

1*. LATIFOLIUM, Sw., *Fl. Ind. occid.*, III, 1589; F., *Hist. des foug. et des lycop. des Antilles*, p. 1. *Crypt. vasc. Brés.*, p. 1. — *A. longifolium*, Sw., *Syn. fil.*, p. 9. — *Aconiopteris longifolia*, F., *Hist. acrost.*, p. 80, T. 41. — (Rio-Janeiro[2]. Glaziou, nos 948 et 4374. Serra do Couto, no 3157.) — Elle est terricole et l'une des plus belles et des plus robustes du genre. Les frondes sont semi-

1. Nous suivons pour les tribus, les genres et les espèces, l'ordre numérique adopté dans la première partie et renvoyons à la pagination pour les espèces sur lesquelles nous revenons.

2. Par Rio-Janeiro nous désignons la province de ce nom et presque toujours la Serra os Orgaos (les Orgues).

cartilagineuses et à demi opaques; la souche est dressée, très-fibrilleuse. Les nervilles se rendent à la marge, qui est épaisse et où elles vont se terminer. Récoltée plus ou moins large, elle est devenue spécifiquement *latifolium* ou *longifolium*. Swartz, en parlant de cette dernière forme, dit des frondes fertiles : *spiraliter convolutis,* ce qui ne saurait être qu'une circonstance accidentelle. Les nervilles de l'*Aconiopteris longifolia* s'unissent en arc vers la marge et nous ne trouvons pas ici ce caractère, du reste assez léger, quoique les formes soient absolument semblables.

3. ALISMÆFOLIUM, F., *l. c.,* p. 28, T. 3 (et non pas T. 28, f. 3). — (Glaziou, n° 4366. Alto-Macahe.) — Ce spécimen est moins robuste que le type de la Guadeloupe; les frondes ne sont point opaques. Le rhizome est rampant, gros comme le doigt et couvert de belles écailles brunes, linéaires et un peu crêpues. Cette plante conserve sa couleur verte par la dessiccation. L'espèce suivante en diffère peu.

† 3 [2]. MACAHENSE, F.

Frondibus sterilibus lanceolatis, utrinque acutis, basi longe decurrentibus; mesonevro subtus albidulo, gibboso, supra vix canaliculato; laminis viridibus, papyraceis, translucidis; fertilibus longioribus, lanceolatis, petiolo longissimo, depresso, quadricanaliculato, laminis nudis; nervillis horizontalibus, siccitate kermesinis; sporangiis oblique rotundatis, annulo crasso, 12 articulato, articulis remotis; sporis rotundis, nigrescentibus, papillatis.

Habitat in Brasilia fluminensi. (Glaziou, n° 4367 et 4368, Alto-Macahe.)

Filix arboricola, papyracea, pagina inferiori frondium punctulis (vestigiis squamarum) notata; surculo crasso, erecto.

ICON. : *Tab. LXXIX, fig. 1.*

(Longueur des frondes stériles : 36-40 centim. sur 4 centim. de largeur au centre; le pétiole égale la lame; fronde fertile de même longueur sur 2 centim. de largeur au centre.)

Ce qui caractérise cette espèce se trouve dans la décurrence considérable des lames, ailées presque jusqu'à leur point d'attache, dans la dissimilitude de couleur des frondes fertiles, qui sont de couleur de kermès; enfin, par la présence sur la lame inférieure des frondes stériles d'une infinité de petits points brunâtres, ébauches ou débris d'écailles. Dans l'*A. alismæfolium,* F., la souche est rampante, les lames ne sont pas décurrentes sur le pétiole, et la dissimilitude de couleur des frondes fertiles ne s'étend pas au delà des lames, les nervilles n'atteignent pas la marge et se renflent

au sommet; ajoutons que les spores, épisporiés et non papilleux, sont plus décidément réniformes. Du reste, la forme générale des frondes et leur consistance sont pareilles. Voyez F., *Hist. acrost.*, p. 28, T. 3, pour comparer.

5. CRASSINERVE, Kze., *Ind. Filic. Hort. Leips.* 1845. F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 2. — Cette espèce, qui n'a point été figurée par nous, laisse des doutes sur sa détermination. Il n'est guère facile de mettre d'accord la synonymie qu'on y rattache. Nous croyons la reconnaître dans le n° 5375 (*partim*) provenant de M. Glaziou; le nom spécifique, exprimant que les nervilles sont épaisses, *crassinervatæ*, ne serait justifié que par les frondes fertiles.

8. LINGUA, Radd., *Fil. Brasil.*, p. 5, T. 15; F., *Hist. acrost.*, p. 33; *Crypt. vasc. Brés.*, p. 2. — (Glaziou, Rio-Janeiro, n° 2150. Itatiaia, n° 5376.) — Ce dernier spécimen a des lames fertiles, obtuses, dont la base est légèrement cunéiforme; les pétioles sont noirâtres inférieurement et attachés sur un rhizome horizontal, sillonné et nu; les nervilles sont presque horizontales. Les frondes fertiles, très-longuement pétiolées, ont des lames lancéolées, toutes obtuses. Les mésonèvres des frondes stériles sont comme renflés et noduleux.

† 9². OVATUM, F.

Frondibus dissimilaribus, cartilagineis, opacis; sterilibus ovatis, acuminatis, cuneiformibus, basi leviter, paululum decurrentibus; fertilibus lanceolatis, acutis, longioribus, siccitate lutescentibus, glabris, in ambobus petiolo tenui helveolo, inferne nigrescente; squamis lanceolatis, longe acuminatis involuto; rhizomate recto, crassitudine pennæ anseris; sporangiis satis parvis, annulo spisso, 12 articulato; sporis rotundis, papillatis, nigrescentibus.

Habitat in Brasilia fluminensi. (Glaziou, n° 4357.)

Filix opaca, spissa, glabra, laminis sterilium punctatis (vestigiis squamarum) notata.

ICON. : *Tab. LXXX, fig. 2.*

(Longueur des frondes stériles : 20-24 centim. de longueur sur 4-4,5 de largeur au centre; le pétiole est un peu plus long que les lames; les frondes fertiles ont 28-30 centim. de longueur; les lames mesurent 3,5-4 centim., elles sont portées sur un pétiole de 12-14 centim.)

Cette espèce diffère de l'*A. ovalifolium*, F., par des frondes stériles acuminées, d'une consistance plus ferme, et comme cartilagineuse, par des frondes fertiles discolores, par des pétioles plus raides, par des lames stériles ponctuées et glabres; les unes et

les autres naissant écartées sur un rhizome rampant, écailleux, sans radicelles apparentes. Elle se rapproche de l'*A. Lingua*, Radd., avec une squamescence et une radication différentes. Le rhizome de cet *acrostichum*, infusé dans l'eau, la colore en jaune et lui communique une saveur légèrement sucrée, analogue à celle de l'infusion de réglisse; beaucoup de rhizomes de fougères sont dans le même cas et notamment plusieurs *polypodium*.

10. HYMENODIASTRUM, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 3, T. 5. — (Glaziou, n° 4373; Petropolis, à la cascade.) — Cette forme reproduit très-exactement le caractère spécifique tiré de l'anastomose de nervilles dans le voisinage de la marge, mais les frondes stériles ont leur plus grand diamètre vers le tiers inférieur, ce qui leur donne un aspect ovoïde; le mésonèvre, du côté inférieur de la marge, au lieu d'être simplement canaliculé, est parcouru par quatre faisceaux vasculaires qui lui donnent un aspect strié. Serait-ce une espèce distincte? mais l'établir sur le simple caractère différentiel indiqué serait trop se hasarder.

† 10². PRODUCENS, F.

Frondibus firmis, coriaceis, opacis, glabris; sterilibus ovoideis, obtusis, marginibus incrassatis, basi acutis, longissime decurrentibus, petiolo depresso, trisulcato, helveolo; mesonevro albido, superne plano, flexuoso, inferne leviter curvato, passim noduloso; fertilibus lanceolatis, obtusis, siccitate rufescentibus, basi decurrente, petiolo lato, depresso, sulcis pluribus peragrato; rhizomate horizontali, squamas latas, ovoideas ferente; sporangiis ovatis, annulo crassissimo, 14-16 articulato; sporis magnis, rotundis, episporio lacerato vestitis.

Habitat in Brasilia fluminensi prope Itatiaia, altit. 2,400^{m}. (Glaziou, n° 5378.)

Filix robusta, spissa, stipitibus dilatatis, sulcatis, necnon laminis longe decurrentibus notata.

ICON. : *Tab. LXXX, fig. 1.*

(Longueur des frondes stériles: 38-42 centim. sur 5-6 dans la plus grande largeur; le pétiole dépasse la lame de 3 à 5 centim. seulement; frondes fertiles, 50-55 centim. sur 2,6-3 centim. de largeur; la lame fait la moitié de la longueur totale.)

Cette espèce est nettement caractérisée par la dépression très-marquée des pétioles et du rhizome, celui-ci est couvert d'écailles fauves, ovales et assez grandes.

Les pétioles, nigrescents à la base, sont parcourus par des sillons plus nombreux chez les frondes fertiles que chez les stériles; les mésonèvres sont très-larges; les lames se terminent en pointe et fournissent par décurrence une marge dont on peut suivre le trajet sous forme d'un bourrelet très-apparent. C'est là ce qu'exprime le nom spécifique *producens* (qui se prolonge).

13. LECHLERIANUM, Metten., *Filic. Lechl.*, p. 4 et non p. 9. — M. Mettenius en parle comme d'une espèce grimpante qu'il rapproche de notre *A. flaccidum*, F., *Hist. acrost.*, p. 35, T. 7, et de l'*A. scandens* du même ouvrage, p. 33. Les frondes sont papyracées, ovales-acuminées, un peu raides, glabres en dessus et portant inférieurement de petites écailles lacérées. La marge est épaissie, presque calleuse; les frondes fertiles sont linéaires-lancéolées, atténuées au sommet et à la base, glabres en dessus et chargées abondamment de sporanges. (N. V.)

14. MINUTUM, Pohl., *Herb. Vindob.;* F., *Hist. acrost.*, p. 39, T. 10, fig. 3. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 5377, *sterilis.*) — Frondes épaisses, coriaces, opaques; mésonèvre blanchâtre, assez large; lames lancéolées, obtuses, pétiole déprimé, écailleux, assez court, un peu flexueux et noirâtre inférieurement; rhizome horizontal, aplati, avec des écailles ovales, obtuses, à marge entière.

14². CRASPEDARIÆFORME, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 261. — Le n° 3550 de M. Glaziou, sur lequel nous avions établi cette espèce, était stérile; depuis lors nous l'avons reçue (n°s 4360, 4365 et 5369) sous ses deux états. La fronde fertile est beaucoup plus petite, à pétiole écailleux ainsi que le pétiole des frondes stériles; la lame est en ellipse et mesure à peine 2,5 centimètres de hauteur sur 9-10 millimètres de largeur; elle est abondamment couverte de sporanges, couleur de tabac; l'anneau est épais, il porte 14 articulations et se détache facilement du sacculus; les spores sont très-gros, brunâtres et anguleux dans leur pourtour. Elle rampe sur les troncs à la manière des *craspedaria,* circonstance qui lui a valu son nom spécifique.

ICON.: *Tab. LXXXI, fig. 1.*

21. MOLLISSIMUM, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 7, T. 2, fig. 3. — (Serra os Orgaos, Glaziou, n° 4361.) — Bien caractérisé par la marge de la fronde fertile, assez large, pellucide et crénelée.

23. SPISSUM, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 8, T. 2, fig. 2. — Cette espèce n'est peut-être que l'*A. Lingua,* Radd., réduit dans ses proportions?

24. ERINACEUM, F., *Hist. acrost.*, p. 41; ejusd., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 8 et 237. — (Rio-Janeiro, Serra os Orgaos; Glaziou, n° 4363 et, par le même botaniste, n° 5368, à Itatiaia.) — Le spécimen n° 5368 est moins grand que les autres, à pétioles plus grêles; les lames sont papyracées et très-souples.

ICON. : *Tab. LXXXII*, fragments analytiques.

† 24². INSIGNE, F.

Frondibus sterilibus magnis, lanceolatis, obtusis, basi rotundatis, papyraceis, translucidis; nervillis bifurcatis, fere horizontalibus; mesonevro valido, inferne planiusculo, superne anguste canaliculato, squamis fuscis, facile delabentibus, ad mesonevron patulis, ad margines imbricatis minoribusque; petiolo robusto, sulcato; squamis fuscis, linearibus, deorsum inflexis; surculo crasso, squamas fulvas gerente; frondibus fertilibus minoribus, glabris, petiolis sulcatis, sporangiis tabacinis, rotundis, annulo 10-12 articulato; sporis ovoideis.

Habitat in Brasilia fluminensi, Itatiaia. (Glaziou, n° 5369.)

Filix formosa, papyracea, squamis secundum partes varias frondium diversis.

ICON. : *Tab. LXXXII, fig. 1, cum fragmentis A. erinacei ad comparandum.*

(Les frondes mesurent 80 centim. et peuvent sans doute atteindre un mètre de longueur; le pétiole en fait la moitié; la largeur est de 7-9 centim.)

Dans l'*A. erinaceum*, très-différent de taille, de grandeur, de consistance et de forme, les écailles de la marge sont étalées comme les cils; dans notre espèce, ils sont à l'état d'imbrication. Il est digne de remarque de voir les écailles varier de forme sur chacune des parties de la fronde. A considérer la quantité des écailles qui chargent cette plante, il semblerait qu'elle doit, ainsi que l'*A. erinaceum*, F., avoir une place dans la section des polylépidées; mais ici elles ne sont pas généralisées et n'occupent que la marge et les parties vasculaires, mésonèvre, pétiole et rhizome; tandis que dans les véritables polylépidées les lames sont envahies et recouvertes par elles.

Nous venons de recevoir cette belle espèce à l'état fertile et trop tard pour pouvoir la figurer. M. Glaziou nous apprend que cette magnifique plante vit au bord des ruisseaux et dressée; tandis que l'*A. erinaceum* est couché sur les rochers secs ou suspendu contre leurs parois.

24³. HIRTIPES, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 238, T. 76, fig. 1. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n°s 3548 et 4652.) — Les frondes fertiles sont roussâtres; les mésonèvres étroits et canaliculés sur les deux faces. Elle est fort distincte.

† 24[4]. OMPHALODES, F.

Frondibus debilibus, cæspitosis, ovatis, petiolis flexuosis; sterilibus ovatis, acutis, basi subcordiformibus, margine undulatis, ciliatis; nervillis crassis, fuscis, squamas lanceolatas, acuminatas ferentibus; fertilibus ovatis, obtusis, basi subcordiformi, lamina superiori squamosa, petiolis longioribus, squamatis; sporangiis tabacinis, breve petiolatis, parvulis, annulo crasso, 10 articulato; sporis irregulariter rotundatis.

Habitat in Brasilia fluminensi in cacumine montis vulgo dicti Itatiaia, altitud. 2,500[m]. (Glaziou, n° 5369.)

Filix tenera, flexibilis, translucida, mesonevro evanescente, petiolis flexuosis, filiformibus, squamis patulis, rufis; caulibus crassitudine fili emporetici.

ICON.: *Tab. LXXXI, fig. 2.*

(Longueur des frondes stériles, 10-13 centim.; la lame mesure 5-6 centim. sur 2,5-3 centim. de largeur; les frondes fertiles de même hauteur ont une lame de 4 centim. de hauteur sur 12 à 14 millim. de largeur.)

Quoique cette plante soit placée à côté de l'*A. insigne*, elle n'en a ni la forme, ni les dimensions, mais uniquement la même vestiture; écailles dorées sur la souche, qui est assez petite et qui cependant réunit jusqu'à 10 et même 12 frondes : écailles étroitement appliquées sur les lames, de même structure et de même couleur, étalées à la marge en manière de cils; voilà les seuls rapports qui existent entre les deux espèces. Il nous a semblé que les frondes rappelaient assez exactement les feuilles de la Cynoglosse omphalode, et qu'elles justifiaient suffisamment le nom spécifique donné par nous à cette jolie espèce.

** *Frondes linéaires ou tendant à cette forme.*

25. MARTINICENSE, Desv., *Herb. Paris.*; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 8. — Effacer les mots : « n'a pas encore été figurée ».

† 25[2]. RIGIDUM, F.

Frondibus anguste lineari-lanceolatis, basi apiceque longe attenuatis, opacis, rigidis, cartilagineis, glaberrimis, marginibus paululum revolutis; sterilibus breve petiolatis, petiolo canaliculato; fertilibus acutis, petiolo longiusculo; rhizomate extenso, fibrilloso, squamas parvas, fuscas, ovatas, acuminatas ferente; sporangiis rotundis, annulo 12 articulato; sporis ovoideis, nudis vitreisque.

Habitat in Brasilia fluminensi. (Glaziou, n° 4371, barrière des Orgues.)

Filix angusta, rhizomate fibrilloso, horizontaliter excurrente.

Icon. : *Tab. LXXXIII, fig. 1.*

(Longueur des frondes stériles : 16-20 centim. sur 8-9 millim. de largeur; pétiole assez court; les frondes fertiles de même longueur, un peu plus larges et pointues, mais non acuminées; le rhizome ne dépasse pas la grosseur d'une plume de pigeon.)

Cette espèce prend place à côté de l'*A. Martinicense.* Les pétioles sont courts et consistent uniquement dans la terminaison des lames; les marges se replient légèrement sur elles-mêmes; le rhizome, très-délié, est horizontal; la plante a, dans son ensemble, l'apparence d'un *drynaria,* section des *pleopeltis*, à frondes simples, aspect que l'on retrouve dans l'*A. Martinicense,* d'ailleurs différent.

25³. STRAMINEUM, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 238 et 261. — (Serra os Orgaos, Glaziou, n° 3322 et, en 1871, n°s 3549, 4362, 4372 et 5366.)

Icon. : *Tab. LXXXIV, fig. 2.*

Les frondes stériles et les frondes fertiles sont tout à fait différentes de forme; ces dernières ont une lame cordiforme, un peu obtuse au sommet et de consistance assez ferme; les stériles, beaucoup plus grandes, sont arrondies à la base et terminées en une longue pointe ondulée; la souche porte de longues radicelles soyeuses.

† 29². GRACILE, F.

Frondibus sterilibus linearibus, flexibilibus, elongatis, curvatis, undulatis, basi cuneiformibus, nervillis marginem non attingentibus, puncto translucido terminatis; mesonevro albido; petiolo tenui, anguste canaliculato, stipitibus gracilibus, canaliculatis, helveolis, squamosis, squamis rufis, anguste linearibus; fertilibus semi-minoribus, lamina elliptica utrinque acuta, marginibus anguste replicatis, petiolo debiliori, filiformi; sporangiis rufescentibus, annulo crasso, 12 articulato; sporis fuscis, subreniformibus, papillatis.

Habitat in Brasilia fluminensi. (Glaziou, n° 5374 *normalis* et 4651 *parvula.*)

Filix gracilis, mesonevro squamoso, margine paululum undulato; rhizomate crassiusculo, squamis piliformibus onusto.

Icon. : *Tab. LXXXIII, fig. 2.*

(Longueur des frondes stériles, 22-28 centim.; largeur, 8-9 millim.; le pétiole est à la lame :: 1 : 4; les fertiles sont de moitié plus petites, avec une lame de 5-6 centim.)

Plante arboricole, grêle, très-souple, pendante, à marges ondulées, surtout vers le quart supérieur de la fronde; les frondes fertiles sont étroitement repliées en leurs bords de dehors en dedans. La diagnose microscopique permet de voir nettement de petits pores translucides dont la surface du sacculus est criblée.

30². HERMINIERI, F., *Hist. acrost.*, p. 43, T. 11. — Elle est de toutes les espèces du genre l'une des plus distinctes par ses frondes fertiles presque radicales. Depuis que nous avons décrit cette plante sur des spécimens de la Guadeloupe, elle a été trouvée à Panama, à Cuba et à la Guyane.

† 31². ACUTUM, F.

Frondibus sterilibus lineari-lanceolatis, utrinque acuminatis, opacis, hirsutis, squamis rufis, prostratis, lanceolatis, longe acuminatis; petiolis rigidis, squamosissimis, squamis crispis, irregulariter patulis rufisque; fertilibus minoribus, laminis ellipticis, margine plicatis, petiolis subnudis; sporangiis tabacinis, pedicello lato donatis, annulo crassissimo, 12 articulato; sporis fuscis, papillatis.

Habitat in Brasilia fluminensi. (Glaziou, n° 5373.)

Filix rigida, opaca, squamis fuscis in utraque lamina evolventibus; rhizomate repente.

ICON.: *Tab. LXXXIII, fig. 3.*

(Longueur des frondes stériles : 13-16 centim. sur 7-9 millim. de large; le pétiole est à la lame :: 1 : 2; les stériles un peu plus petites, avec une lame de 5 centim. sur 8 millim. de largeur; elle fait un peu plus du tiers de la longueur totale.)

Les frondes sont un peu raides, souvent légèrement arquées; les écailles que l'on retrouve sur toutes les parties de la plante, sont éparses et couchées sur les lames, étalées et en très-grande quantité sur le pétiole des frondes stériles; on ne les retrouve plus qu'en très-petit nombre sur le pétiole des frondes fertiles, et elles manquent complétement sur les lames qui sont épaisses, obtusiuscules et qui portent le long des marges de petites fossettes noirâtres assez profondes et très-caractéristiques.

31³. OBLIQUATUM, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 261. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 3545; par le même, n°s 4358, 4359, 5370.) — Le nom spécifique est parfaitement justifié par l'obliquité des lames stériles qui sont opaques, longuement pédicellées, terminées en pointe et un peu décurrentes; on y trouve quelques

écailles, les pédicelles sont très-grêles, presque filiformes et gramineux; les frondes fertiles, que d'abord nous n'avions pas vues, sont de même forme, un peu plus petites, à lame pointue et plus étroites; les sporanges ont un anneau qui porte de 12 à 14 articulations; les spores sont arrondis.

Icon.: *Tab. LXXXIV, fig. 1.*

32. PRÆLONGUM, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 9, T. 3, fig. 2. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n°s 952, 2433, 2800 et 2855; avec des frondes plus étroites, n°s 4369 et 4370.)

33*. CHRYSOLEPIS, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 10, T. 2, fig. 1. — Glaziou, n° 2435, *forma minor* et *magis acuminata; A. acuminans, l. c.*, p. 12, T. 1, fig. 2. Glaziou, n°s 951, 2437 et 2438. *A. auricomum*, Baker, non Kze., *in Linnœa*, IX, p. 28. Le véritable *A. auricomum*, dont nous avons dû, autrefois, la communication à feu notre ami Kunze, atteint des proportions supérieures à nos deux espèces, avec un pétiole marginé dans les frondes fertiles et très-court (*brevissimum, in descriptione*) dans les frondes stériles.

II. POLYLÉPIDÉES.

31*. BEAUREPAIREI, F.

Frondibus cœspitosis, oligolepideis, sterilibus pugioniformibus, basi angustioribus rotundatis, apice acutis, marginibus undulatis, nervillis marginem non attingentibus, puncto translucido terminatis, laminam superiorem inquinantibus, mesonevro fusco, superne plano, inferne canaliculato, squamis rufis, linearibus onusto; petiolo squamoso, squamis lanceolatis, patulis abunde vestitis; frondibus sterilibus longe petiolatis, petiolo gracili, parce squamoso, laminis oblongis, acutis, marginibus anguste replicatis; sporotheciis rotundis, annulo crasso, 14 articulato, sporis....

Habitat in Brasilia fluminensi. (Glaziou, 1872, n° 5383.)

Filix habitu grato, pugioniformi, surculo crassiusculo, squamis parvis, rigidis, fuscis vestito; laminis inferioribus cum squamis parvis, stricte applicatis, notata.

Icon.: *Tab. LXXIX, fig. 2.*

(Longueur des frondes stériles, 30-33 centim., sur 2 centim. dans la plus grande largeur; le pétiole est à la lame : : 1 : 5; les fertiles, 14-16 centim.; le pétiole, 11 centim., et la lame, 5 sur 9-11 millim.)

Cette espèce est des plus distinctes et remarquable par la squamescence qui diffère suivant les diverses parties de la plante; les écailles hérissent le pétiole des frondes stériles, ainsi que le mésonèvre; les écailles des lames sont très-minces et appliquées; elles laissent après leur chute un petit débris ponctiforme. Les frondes stériles, de forme lancéolée, s'amincissent vers la base et s'élargissent peu à peu vers le haut, de manière à avoir leur plus grande largeur en approchant du sommet, qui s'amincit assez brusquement en pointe; elles ressemblent à une lame de sabre, et le nom spécifique *pugioniforme* lui eût été très-convenablement appliqué.

† 38². ELEGANS, F.

Frondibus lineari-lanceolatis, in acumine angusto, abrupte terminatis, basi attenuatis, sterilibus longe petiolatis, laminis densissime squamosis squamis aureis, ad petiolos patulis, omnibus lanceolatis, ciliatis; stipitibus helveolis, tenuibus, sulcatis; fertilibus angustioribus, acuminatis, apice tomentoso; sporangiis tabacinis, rotundis, annulo crasso 12 articulato; sporis statu episporiato, irregulatim rotundis, nudis, subreniformibus.

Habitat in cacuminibus montis vulgo dicti Serra os Orgaos. (Glaziou, n° 4353, au midi du Pedra Açu.)

Filix splendidissima, in omnibus partibus squamosa, squamis ad mesonevron densioribus et intensim coloratis; surculo squamis rigidis nitentibus vestito.

ICON. : *Tab. LXXXV, fig. 1.*

(Longueur des frondes stériles, 36-40 centim. sur 2,5 centim. de largeur avec un pétiole de 15-17 centim.; les frondes stériles, 30 centim., dont la lame fait le tiers; elle n'excède guère 1 centim. de largeur. Le spécimen figuré a été un peu réduit dans ses proportions.)

Cette belle espèce, l'une des plus remarquables du genre, se rapproche de l'*A. splendens* de Bory, trouvé par cet ami à Bourbon et figuré par nous (*Histoire des acrost.*, p. 60, T. 21, fig. 2). L'*A. elegans* se termine obtusément et non en pointe, avec des lames qui s'amincissent en coin à la base; la squamescence des deux plantes n'est pas la même, non plus que le port. On peut aussi signaler quelques rapports entre notre espèce et l'*A. cuspidatum*, également figuré par nous (*ouvrage cité*, p. 57, T. 14, fig. 2); mais ces rapports sont encore plus éloignés. Les frondes de l'*A. elegans*, F., naissent rapprochées sur une souche dressée, chargée d'écailles étalées, luisantes et d'une couleur rouge-brun très-foncée.

† 39². VISCIDUM, F.

Frondibus cæspitosis, anguste lanceolatis, obtusiusculis, basi cuneatis, squamosis, squamis bicoloribus, biformibusque, ad laminas superiores albidulis planis, dissectis, ad laminas inferiores rubiginosis; ad petiolos gracilioribus lanceolatis, acuminatis, rufis, divergentibus, fertilibus conformibus sed angustioribus et petiolo longiori; sporangiis tabacinis, rotundis, annulo crasso, 12 articulato; sporis nigris, rotundis.

Habitat in Brasilia fluminensi ad Itatiaia. (Glaziou, nº 5372.)

Filix viscosa, squamosa, surculo repente, squamis fuscis, rigidis, linearibus onusto.

ICON. : *Tab. LXXXVI, fig. 1.*

(Longueur des frondes, 16-18 centim. ; lames stériles, 9-11 centim. sur 9-11 millim. de largeur; lames fertiles, 7-9 sur 5-6 millim. de largeur.)

Lorsque nous avons reçu cette fougère, elle adhérait au papier sur lequel elle avait dessiné sa forme. Il existe une espèce, acceptée depuis longtemps sous le nom spécifique de *viscosa*, dont la patrie est extrêmement étendue; elle n'a point de rapport avec notre plante.

† 39³. ANGUSTUM, F.

Frondibus linearibus, rigidis, opacis, obtusiusculis; sterilibus et fertilibus conformibus, laminis superioribus squamis albis sparsis vestitis, aliquando subnudis; laminis inferioribus squamosis, squamis fulvis; sporangiis ovatis, annulo latissimo, 12 articulato; sporis polymorphis.

Habitat in summitatibus Serra os Orgaos. (Glaziou, nº 4355.)

Filix parvula, frondibus cæspitosis, spissis; rhizomate crasso, squamas parvas, piliformes, fuscas ferente.

ICON. : *Tab. LXXXVI, fig. 3.*

(Longueur: 6-7 centim. sur 4-5 millim. de largeur; le rhizome atteint la grosseur d'une plume d'oie; il est chargé à la base des débris de pétioles appartenant aux végétations antérieures.)

Cette petite espèce se rapproche de l'*A. squamatum*, Sw.; la marge des frondes stériles est repliée sur elle-même pour former une mince bordure. Willdenow parle de l'*A. squamatum* comme d'une plante naine, mesurant seulement d'un pouce à un pouce et demi de hauteur.

40. GARDNERIANUM, Kze., *Herb.*, F., *Hist. des acrost.*, p. 55, T. 15, fig. 3. *Crypt. vasc. Brés.*, p. 11. — (Rio-Janeiro, Glaziou, nº 2493, stérile; par le même, à

Alto-Macahe, sur les arbres, n° 4364, fertile.) — Cette plante rappelle le nom de M. Gardner qui a exploré le Brésil, sous le rapport botanique, avec un rare bonheur; le spécimen que nous avons sous les yeux porte une grosse souche dressée, très-fibrilleuse, sur laquelle se dressent six frondes remarquables par de très-belles écailles ciliées, étalées sur les lames et plus abondantes vers la marge; toute la plante est robuste et sa longue durée se trouve justifiée par la présence, sur les lames, de plusieurs ébauches de *parmelia.*

† 40². Liaisianum, Glaz. *In litteris.*

Frondibus cæspitosis, opacis; sterilibus lanceolatis, obtusis, basi cuneiformibus, discoloribus, laminis superioribus albidulis, squamas scariosas, albas ferentibus; laminis inferioribus rufescentibus cum squamis ovoideis, ciliatis immixtis; petiolis tenuibus, squamas acuminatas, lanceolatas, fulvas, margine integras ferentibus; fertilibus sublongioribus conformibus; sporangiis rotundatis cum squamis immixtis; annulo 12 articulato; sporis atris, leviter papillatis.

Habitat in Brasilia fluminensi, prope Itatiaia, in fissuris rupium; altitudine 2,600^{m}. (Glaziou, n° 5371.)

Filix parvula, spissa, squamosissima, squamis forma varia.

Icon. : *Tab. LXXXVI, fig. 2.*

(Longueur des frondes stériles, 6-8 centim. sur 9-11 millim. de largeur; les pétioles égalent la lame en longueur; les fertiles atteignent à peu près les mêmes dimensions.)

Cette petite espèce est épaisse et chargée de squames dans toutes ses parties, surtout la lame inférieure des frondes qui varie beaucoup dans ses dimensions, si nous en jugeons d'après nos spécimens; le rhizome est relativement très-gros, fibrilleux, avec des écailles brunes, presque linéaires, très-raides. Les sporanges, entremêlées de nombreuses écailles, comme dans le genre *Pleopeltis,* sont lancéolées, denticulées à la marge et acuminées.

41. Langsdorffii, Hook. et Grev., *Icon. filic.,* T. 164. Mart., *Fil. Bras.,* p. 83, T. 21. — (Glaziou, Serra os Orgaos, n° 1763, stérile; par le même, n° 4354, fertile.) — Nous persistons à croire que la plante, figurée par MM. Hooker et Greville, diffère de la plante donnée par Martius. C'est à la première de ces plantes que se rattachent les spécimens Glazioviens. Nous allons ajouter à sa description quelques particularités destinées à la mieux faire connaître. Elle atteint jusqu'à

60 centim.; les pétioles sont fort longs et couverts d'écailles brunes, fortement appliquées et marginées de blanc en leur pourtour; le rhizome est de la grosseur du doigt d'un enfant, garni de longues radicelles entremêlées d'écailles d'un brun très-foncé et linéaires; les frondes stériles sont acuminées, plus pâles en dessus qu'en dessous; elle est fort belle.

48. HORRIDULUM, Klfss., *Enum. filic.*, p. 58; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 13. — (Glaziou, Rio-Janeiro, n° 946 et n° 4356 en 1870.) — Cette espèce, qui appartient au petit groupe des *Acrostichum piloselloïdes*, est couverte d'écailles piliformes, très-raides, très-étalées et très-abondantes.

NB. Ce beau genre renferme à lui seul plus d'espèces que le reste du groupe auquel il donne son nom; on peut les évaluer à 130 environ, et le Brésil en possède la moitié. On ne saurait trop s'étonner de cette grande diversité de forme, en songeant au petit nombre de caractères sur lesquels ce genre est fondé : — frondes simples à nervilles libres, sporanges couvrant en totalité les lames fertiles, — et, cependant, les différences spécifiques sont évidentes. On les déduit de la forme, de la proportion respective des frondes stériles et fertiles, de la consistance, de la nervation, du port, de la radication et des écailles. L'étude microscopique des sporanges et des spores n'est que d'un très-faible secours, tant ils diffèrent peu. En voyant cette prodigieuse polymorphie, il faut admettre pour ce genre, et peut-être pour d'autres genres à espèces nombreuses, que le temps a créé des races, et que celles-ci, en persistant, ont été l'origine de ces espèces, si bien que la flore qui les décrit trace l'état actuel du genre sans rien préjuger du passé ni de l'avenir. Nous croyons à cette mobilité, mais sans l'étendre aux genres, faisant une distinction entre la modification et la métamorphose. Ainsi, le temps aura beau multiplier les formes spécifiques du genre *Acrostichum*, il n'en fera jamais ni un *adiantum*, ni un *blechnum*, ni un *phegopteris:* mobilité pour l'espèce, stabilité pour le genre.

Il est pour le genre *Acrostichum* une particularité qui, sans lui être absolument exclusive, est presque généralisée; la voici : les frondes présentent à la base des pétioles une sorte d'articulation indiquée par un brusque changement de couleur et très-souvent par une nodosité. Lorsque la fronde se détache par vieillesse, le pétiole se rompt juste à l'endroit où s'opère la transition de couleur et la base persiste sur le rhizome qui la supporte. Ce n'est certes pas là une articulation véritable, mais un nœud, qui se comporte à la manière du pétiole articulé de la feuille des plantes phanérogames.

Sur le nombre de 67 espèces d'*Acrostichum* que possède le Brésil, 54 ont été illustrées qui ne laissent aucun doute sur leur légitimité; nous en avons figuré 44, et 10 l'ont été par divers auteurs. Les espèces non figurées doivent être regardées comme douteuses, notamment les *A. crassinerve,* Kze., *fimbriatum,* Cav., *Sellowianum,* Presl., *actinotrichum,* Mart., et *alpestre,* Gardn. Pour porter sur elles un jugement définitif, il faudrait voir les types sur lesquels elles ont été fondées, et ces types nous manquent.

4. RHIPIDOPTERIS, Schott., F., *Hist. acrost.*, p. 74 et 78, et *Crypt. vasc. Brés.*, 16.

1. PELTATA, Schott., F., *l. c.* (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 4375, le type; et n° 4375, Alto-Macahe, par Glaziou, la variété.)

β. *Stenophylla*, F. — Longuement rampante; rhizome délié, écailleux, presque triangulaire, allongé, frondes espacées, les stériles flabelliformes, à segments bifides, assez courts, obtusiuscules, pédicelles plus longs que les lames; les fertiles plus longues, lame bilobée, plus large que haute, portée sur un plus long pédicelle. — Serait-ce une espèce?

ICON.: *Tab. LXXXV, fig. 2.*

NB. M. Baker regarde comme brésiliennes les espèces suivantes d'*Acrostichum* connues de nous seulement comme africaines et que nous hésitons à regarder comme brésiliennes : 1° *A. Aubertii,* Desv.; *Berol. mag.,* V, p. 309; F., *Hist. acrost.*, p. 45, T. 18, fig. 1; Serra os Orgaos, Gardner, n° 5924. — 2° *A. conforme,* Sw., *Syn. filic.,* p. 10 et 192, T. 1. Les numéros cités de M. Glaziou se rapportent à notre *A. spissum, Crypt. vasc.,* p. 8, T. 2, fig. 2. — 3° *A. hybridum,* Bory, *Voy. Afriq.,* III, p. 96; F., *Hist. acrost.,* p. 40, T. 9, fig. 3 et 4, non Hook. — C'est à l'*A. erinaceum,* F., *A. hybridum,* Hook. et Grev., *Icon,* T. 21, qu'il faut rapporter cette espèce de la Guadeloupe, bien distincte de la plante d'Afrique. (Cfr. les ouvrages cités, texte et planches.)

II. LOMARIÉES.

11. LOMARIA, Willd., F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 20.

3ᵃ. FIALHOI, F. et Glaz., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 239, T. VII, fig. 2. — Cette belle espèce a été retrouvée le 3 avril 1870, par M. Glaziou, à la source du Rio-Soberbo, et nous a été communiquée sous le n° 4376. Ce spécimen offre

cette différence avec le type figuré, que la marge des frondules est entière dans son quart inférieur et non dentée en scie dans tout son pourtour.

3³. PENNA-MARINA, Poir., *Encyc.*, Méth. V, p. 320, *sub polypodio*, Brésil austral. — Cette plante se trouve particulièrement dans les régions froides de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et de Magellan. Notre *L. Gayana*, du Chili, 7ᵉ *Mém.*, T. 10, fig. 1, se rattacherait au *L. Penna-Marina* qui serait, au Brésil, très-éloigné de son centre d'évolution.

NB. Notre *L. mucronata*, Glaziou, Serra os Orgaos, nº 2423, ne saurait être rapporté au *L. obtusata*, Labill., *Sertum nov. Caled.*, p. 4, T. 6. La comparaison que l'on peut faire de notre planche 8, fig. 3, *Crypt. vasc. Brés.*, avec la planche citée de Labillardière interdit ce rapprochement d'une manière absolue. — Le *L. tabularis*, Thunb., *Prodr.*, 171, *sub pteride*, du cap de Bonne-Espérance et de Magellan, où d'abord il a été trouvé, ne permet guère non plus de le reconnaître pour une fougère brésilienne.

12. BLECHNUM, *L. spec. pl.*, p. 1534.

* *Eublechnum.*

1. LANCEOLA, Sw., F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 22. — (Rio-Janeiro, Glaziou, nº 5365.) — Les sporanges sont assez petites, ovoïdes, portées sur un assez long pédicelle, l'anneau se compose de 14 articulations, les spores, lisses, ont une forme ovoïde.

2 GRACILE, Klfss., *Enum. filic.*, p. 158; Lowe, *Ferns*, IV, T. 36; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 23. — (Rio-Janeiro, à Saint-Louis, Glaziou, nº 1760; par le même à Tijuca, novembre 1870, nº 5362, var. *stolonifera.*) — Cette espèce est si bien caractérisée, qu'elle a ce rare privilége de réunir tous les auteurs dans une seule et unique synonymie. Le spécimen de Tijuca que nous avons sous les yeux, émet du collet de la racine de très-longs et très-grêles stolons qui produisent des gemmes écailleux, origine de nouvelles plantes, parfois complétement développées, comme il arrive dans les fraisiers et les potentilles. Nous retrouverons plus loin ce caractère que les botanistes n'ont pas signalé, et que la culture ne paraît pas développer.

3. UNILATERALE, Willd., F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 23. — (Brésil, Rio à Tinca, Glaziou, nº 5359.) — Nous n'avions pas encore reçu cette plante du Brésil.

Le spécimen qui nous parvient est très-conforme à la planche 62, fig. 2, de Raddi. L'anneau des sporanges est fragile, il porte 12 articulations; les spores réniformes sont lisses et semi-transparents. A cette espèce se rattache une forme plus petite (n° 4653), remarquable par des segments légèrement arqués, avec un sommet courbé en manière de bec, lorsque les sporanges ont acquis tout leur développement.

5*. TRIANGULARE, Lk., *Filic. sp.*, p. 78; F., *Crypt. vasc. Brésil*, p. 23. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 5360.) — Nous la recevons aussi pour la première fois. Elle est facile à reconnaître à ses segments inférieurs exactement triangulaires, un peu gibbeux du côté supérieur; elle est pinnatifide dans toute son étendue.

6*. HETEROCARPON, F., *Gen. filic.*, p. 74; *Crypt. vasc. Brés.*, p. 23. — (Glaziou, n° 5361, à Tijuca, côté Bennett, 12 novembre 1870.) — On la reconnaîtra sans peine à ses indusiums dont le supérieur est sensiblement plus court que l'inférieur; les segments sont gibbeux; le rhizome atteint la grosseur du petit doigt, il porte de nombreuses radicelles noirâtres. La fronde est entièrement pinnatifide.

8*. HELVEOLUM, F., *Gen. filic.*, p. 75; *Crypt. vasc. Brésil*, p. 24. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 4378.) — Rhizome émettant de très-longues radicelles et des stolons munis de petites écailles écartées; les écailles de ce rhizome sont luisantes, brunes et marginées de blanc. Elle est très-vigoureuse et prend place à côté du *B. occidentale*, L., espèce des plus répandues et tout à la fois une des moins connues.

8². COGNATUM, Presl., *Epim. bot.*, p. 107; *B. glandulosum;* Kze., *Schkh. suppl.*, I, p. 132, T. 58, fig. 2. Sud du Brésil, Colombie, Pérou, Mexico (*ex* Th. Moor. Ind., p. 195). — Frondes linéaires-lancéolées, pinnées, pinnules sous-opposées, lancéolées ou linéaires-lancéolées, cordées à la base, les inférieures réfléchies; l'indusium est denticulé; les pétioles mesurent 12-14 centim. (N.V.)

† 10². MUCRONATUM, F.

Frondibus sterilibus et fertilibus conformibus, lanceolatis, longe caudatis, ad medium partem pinnatis; frondulis inferioribus leviter reflexis, ellipticis, basi subcordiformibus, brevissime petiolatis, omnibus mucronulatis, petiolo

rachique helveolis; nervillis scalpturatis; sporotheciis breviusculis; sporangiis ovoideis, annulo 12-14 articulato, sporis reniformibus, lutescentibus.

Habitat in Brasilia fluminensi. (Grande cascade de Tinea, Glaziou, n° 5363, 24 juin 1870.)

Filix semi-pinnata, hastata, frondibus curvatis, petiolis rachibusque helveolis, surculo erecto, squamas lanceolatas, rigidas, ustulatas ferente.

(Longueur des frondes, 20-23 centim.; envergure au centre, 5 centim.; frondules, 8-9 millim. de largeur; les inférieures, 12 millim. de longueur sur 7-8 millim. de largeur.)

Cette fougère est caractérisée par la courbure de ses frondes, la forme arrondie et en ellipse des frondules, par les écailles comme brûlées du rhizome; enfin par des stolons raides et assez gros qui se développent au collet du rhizome et qui portent des gemmes de distance en distance. Quoique le mucron qui termine les frondules soit des plus évidents, on retrouve ce caractère sur d'autres espèces, mais il est bien moins marqué.

***Mesothema* (*sporothèces médians*).

13. HASTATUM, Klfss., *Enum. filic.*, p. 61; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 24.— (Brésil, Rio-Janeiro, Glaziou, n° 5364.) — Vue pour la première fois, provenant du Brésil; l'éloignement des indusiums qui se développent à une certaine distance du mésonèvre, mais non précisément médians, caractérise cette espèce; elle est à moitié pinnée; les frondules sont cordiformes et les inférieures réfléchies.

14. DIPLOTAXICUM, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 25, T. 8, fig. 1.— (Rio-Janeiro, vallée de Bonfim, Glaziou, n° 4377.) — La frondule terminale est hastée, fructifère, et peut atteindre jusqu'à 6 centim. de largeur. Les segments des frondes fertiles sont assez écartés.

*** *Blechnopsis.*

16. SERRULATUM, C. Rich., *Act. soc. hist. nat. Paris*, I, p. 114 (1792). — (Brésil, Rio, Glaziou, n° 4379, à Copacabana, 8 mai 1870.) — La plus belle du genre; à frondules denticulées en scie, dressées; les fertiles assez étroites, lancéolées aiguës, les inférieures ovoïdes; nervilles en saillie, très-rapprochées. Les plus grands spécimens atteignent près d'un mètre; les pétioles sont robustes et

presque quadrangulaires. Les sporothèces, relativement très-larges, forment le tiers de la largeur totale des frondules fertiles; l'anneau des sporanges porte au delà de 20 articulations; les spores sont arrondis, lisses et de couleur jaunâtre.

16². NITIDUM, Presl., *Rel. Hænk.*, I, 49; *Blechnopsis nitida*, Presl., *Epim. bot.*, p. 116; *Bl. elongatum*, Gaudich., *Freyc.*, p. 395. — (Brésil, Rio grande del Sur, Tweedie, n° 1122.) — Grande espèce des Philippines et des îles Mariannes, très-voisine du *B. Brasiliense*, Desv., mais plus petite; elle porte ses frondes sur un stipe ligneux. Est-elle bien brésilienne? En général, il faut y regarder de bien près pour constater l'identité de deux espèces lorsqu'elles sont séparées par un grand nombre de degrés du méridien.

NB. Les caractères qui séparent les diverses espèces du genre *Blechnum*, sont, en général, assez faibles. Certaines d'entre elles ont une synonymie inextricable, telles sont surtout le *B. hastatum*, Klfss., et le *B. occidentale;* celui-ci, en apparence, le mieux connu de tous. Le *B. integerrimum*, Spr., et *Lechleri*, Metten., demandent à être mieux connus. Certaines espèces émettent du collet de la racine de longs stolons, stériles d'ordinaire, mais parfois fertiles avec un développement complet des rejetons, ainsi qu'on peut le voir dans le *B. gracile*, Klfss. Ce fait est fort rare dans l'histoire morphologique des fougères.

III. VITTARIÉES.

14. VITTARIA, Sm., *Mém. Acad. Turin*, V, p. 413, T. 9, fig. 3.

3. LINEATA, L., *Sp. pl.*, 1530, *sub pteride*, Glaziou, *in locis var.* (Par le même à Rio-Janeiro, n° 5358.) — Malgré l'étroitesse des frondes, les nervilles sont astomosées, mais pour former une seule maille.

IV. PLEUROGRAMMÉES.

17. XIPHOPTERIS, Klfss., *Enum. filic.*, p. 85.

1. SERRULATA, Klfss., *l. c.;* F., *Crypt. vasc. Brésil*, p. 28. — Nous avons dit (*Hist. foug. des Antilles*, p. 15) que ce genre pouvait rentrer dans le groupe

des polypodiées, les sporothèces étant nervillaires, distincts et ne cessant de l'être que par confluence; la dilatation du sommet de la fronde fertile, ici très-marquée, ainsi que la plicature de cette même partie de la lame, n'a pas lieu dans une espèce provenant de la Guadeloupe et figurée (*ouvrage cité,* T. 19, fig. 3). Le genre *Xiphopteris* serait donc une polypodiée, à placer à côté du genre *Grammitis.*

V. LINDSAYÉES.

19. LINDSAYA, Dryand., *Act. soc. Linn. Lond.*, III, p. 40.

* *Frondes simples.*

1. RENIFORMIS, Dryand., *l. c.*, T. 7, fig. 1. — (Trouvée près du Rio-Vaupes, dans le Haut-Amazone par Spruce, n° 2916.) — Cette espèce, parfaitement caractérisée par sa forme, est dans le genre *Lindsæa* ce que sont, dans le genre *Adiantum,* les *A. reniforme,* de Ténériffe, et sa variété *asarifolium*, L., de Bourbon et de l'île de France. Nous avons déjà fait remarquer ailleurs que les espèces renfermées dans ces deux genres marchaient parallèlement.

** *Frondes divisées.*

6. CURVANS, F., *Gen. filic.*, p. 106; *Crypt. vasc. Brés.*, p. 30. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 5393; 1872.) — Cette forme diffère très-peu du type mexicain.

7³. DENTATA, F.

Frondibus bipinnatis, glaberrimis, siccitate pallide viridibus, pinnis linearibus, assurgentibus, rigidis, pinnulis dimidiatis, petiolo brevissimo donatis, basi truncatis, marginibus in sterilibus argute dentatis, dentibus sæpe mucronulatis, sporotheciis continuis.

Habitat in Brasilia fluminensi ad Lagoinha. (Février 1871; Glaziou, n° 5357.)

Filix subrigida, petiolo helveolo, leviter depresso, manifeste canaliculato, basi rufescente; rhizomate tenui, repente, radicellis pilos sericeos habentibus prædito.

ICON.: *Tab. LXXXVII, fig. 2.*

(Longueur totale des frondes, 36-40 centim., dont le pétiole fait plus de la moitié; frondules, 8-9 centim.; pinnules, 5 millim. sur 3 millim. de largeur.)

Cette espèce est nettement caractérisée par ses pinnules stériles, dentées en scie, celles-ci un peu plus grandes. Les frondes naissent isolées sur un rhizome presque filiforme; le sillon qui parcourt le pétiole est très-marqué.

9². OVOIDEA, F.

Frondibus glaberrimis, bipinnatis, apice decrescentibus, pinnis linearibus; pinnulis, ovatis, pauci-crenatis, dimidiatis, nervillis tenuibus, sporotheciis interruptis, indusio angusto, tenui.

Habitat in cacumine montis Serra os Orgaos, in loco dicto Pedra açu. (Glaziou, n° 3481.)

Filix cæspitosa, stipitibus fusco-rufescentibus, nitentibus, rhizomate tenui.

ICON. : *Tab. LXXXVII, fig. 1.*

(Longueur des frondes, 30-34 centim., dont le pétiole fait environ la moitié; pinnules de la base, 9-11 centim.; pinnules, 9-11 millim. de hauteur.)

Cette espèce a quelques rapports de *facies* avec le *L. polymorpha,* Wallich, de l'Inde anglaise. Les frondes sont arquées, les rachis assez flexibles; la pinnule terminale est beaucoup plus longue que les latérales; les nervilles prolifères dévient souvent vers le sommet pour prendre une direction horizontale et s'unir à leurs voisines par l'intermédiaire de l'indusium qui les recouvre.

NB. Auguste Saint-Hilaire a décrit un *L. Botrychioides, Voy. Distr. Diam.,* I, 379, trouvé dans les forêts humides de la Serra da Piedade et dans la Serra de Caraça, province des Mines; elle aurait été revue dans la Serra da Cubatâo, province de Saint-Paul, par Burchell, n°s 3732 et 4402; cette espèce ne nous est pas connue.

NB. Les *Lindsaya,* comme les *Adiantum,* ont des sporothèces continus ou interrompus et pourraient être divisés pour la facilité de l'étude en *Synechia* et en *Apotomia;* le *L. dentata* appartiendrait à la première de ces deux sections et le *L. ovoidea* à la seconde. Il est encore à remarquer que l'état fructifère modifie la marge des pinnules, qui deviennent entières de crénelées ou de dentées qu'elles sont quand elles demeurent stériles, c'est ce qui arrive à notre *L. dentata;* pour constater le caractère spécifique, il faut trouver des pinnules stériles, ce qui n'est pas toujours facile, les spécimens, dans cette espèce et dans beaucoup d'autres, étant fructifères d'une manière universelle.

VI. ADIANTÉES.

20. ADIANTUM, L., *Sp. pl.*, p. 1556.

* *Synechia* (*sporothèces continus*).

5. PULVERULENTUM, L., *Sp. pl.*, p. 1559; F., *Crypt. vasc.*, p. 32. — (Rio-Janeiro, à Belem, Glaziou, n° 5353.) — La sécrétion pulvérulente qui vaut à cette espèce le nom spécifique qui la distingue, est formée de corps allongés, fort raides, qui prennent sous le microscope l'apparence de filaments très-courts et semi-opaques. Les frondules sont dentées en scie, fertiles ou non, ces dernières ne le sont que vers le sommet.

***Apotomia* (*sporothèces interrompus*).

6². SEEMANNI, Hook., *Sp. filic.*, II, p. 5, T. 81 A. — (Trouvée dans la province de Goyaz, par Pohl.) — Les sporothèces rangent presque cette plante dans les espèces à sporothèces continus. Les frondules, vertes en dessus, ont une teinte glauque en dessous. Elle est de médiocre grandeur. (N.V.)

9. FLAGELLUM, F., *Gen. filic.*, p. 117; *Iconogr. nouv.*, p. 4, T. 2, fig. 1.; *Crypt. vasc. Brés.*, p. 33. — Espèce bien distincte de l'*A. lunulatum* de Burmann, par ses frondules cunéiformes, denticulées en leur marge. Nous ne la connaissons qu'à l'état stérile. Peut-être n'est-ce là qu'une forme de l'*A. delicatulum* de Martius. (Voyez plus bas.)

11. DELICATULUM, Mart., *Icon. pl. crypt.*, p. 94, T. 56, fig. 2; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 33. — (Rio-Janeiro, à Copacabana, Glaziou, n° 4383, mai 1870.) — Espèce très-flexible, souvent prolifère, à pinnules écartées et à marges incisées; petite souche dressée, fibreuse, à radicelles tomenteuses, fauves; bien distincte de l'*A. flagellum* par ses frondules ovales-rhomboïdales. Elle devrait être placée à côté de l'*A. lunulatum*, Burm.

17. CURVATUM, Klfss., *Enum. filic.*, p. 202; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 34. — (Rio-Janeiro, à Rodeio, Glaziou, n° 5352.) — Cette espèce, l'une des plus grandes du genre, peut atteindre un mètre au moins; elle est des plus vigoureuses; les pétioles sont presque quadrangulaires et s'attachent sur un gros rhizome

couvert d'écailles presque linéaires et fort raides. Le nom spécifique la caractérise parfaitement; elle est trois fois pinnée, les pinnules, qui sont très-rapprochées, se recouvrent parfois les unes les autres.

22. INTERMEDIUM, Sw., *Vet. acad. Handl. Stockh.*, 1817, p. 76; *A. fovearum*, Radd., *Fil. Bras.*, p. 58, T. 77; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 35. — (Rio-Janeiro, à Rodeio, n° 5354, décembre 1870.) — Espèce bien distincte ne portant jamais qu'un petit nombre de frondules et seulement bipinnée vers le bas de la fronde; elle est, quoique moins abondamment, couverte des mêmes productions pileuses que l'*A. pulverulentum*, L. Les frondes stériles sont profondément dentées.

25. PECTINATUM, Kze., Msc. Hook. et Baker, *Syn. fil.*, p. 120; Ettingsh., T. 45, fig. 14-16 *particulæ;* Baker, *Polypod. Brasil.*, p. 374, T. 23, fig. 1 et 2 *particulæ.* — (Aldea Santa-Maria et Mato del Ré, Goyaz, Pohl et Burchell, n° 7416, même province.) — Grandes frondes, deltoïdes, 3-4 fois pinnées, pétioles et rachis recouverts d'une poussière ferrugineuse; pinnules étalées, les inférieures composées, à segments rhomboïdaux courtement pétiolés, dont la marge est comme pectinée; sporothèces arrondis, nombreux, naissant sur chaque segment marginal. (N.V.) Semble se rapprocher de l'*A. hirtum*, Klotz.

27². POLYPHYLLUM, Willd., *Filic.*, p. 454; H. B. Kth., *Nov. gen.*, I, 21; *A. cardiochlæna*, Kze., *Linn.*, XVII, p. 569. — (Brésil, Glaziou, n° 437, *teste* Baker.) — Frondes quatre fois pinnées, à pinnules oblongues, dimidiées, obtuses; à base tronquée, marge supérieure denticulée en scie; 6-8 sporothèces oblongs sur la marge; pétioles brillants, lisses, noir d'ébène.

30². ÆTHIOPICUM, L., *Sp. pl.*, p. 1560; Sw., *Syn. filic.*, p. 125; Willd., *Filic.*, p. 452. — *A. thalictroides*, F., *Gen. filic.*, p. 114. — *A. tenerum*, Lk. — *A. trigonum*, Labill., *Nov. Holl.*, II, p. 99, T. 248, fig. 2. — *A. gratum*, F., *Icon. nouv.*, p. 29, T. 12, fig. 3. — Espèce très-rare au Brésil, recueillie à Rio grande del Sur, sans indication de collecteur (Baker). — Frondes trois fois pinnées, avec des pinnules presque rondes ou presque ovales, obtuses, terminées en coin; les sporothèces sont courbés en fer à cheval. Elle a été primitivement établie sur une plante du cap de Bonne-Espérance. Est-elle bien brésilienne?

36. OBTUSUM, Desv., *Berol. mag.*, V, p. 327; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 38.— (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 5356.) — Espèce fort distincte, à pétiole anguleux, fort long; le rachis est villeux; les sporothèces occupent toute la marge, ils sont épais, très-rapprochés, quoique distincts, et tendent à faire rentrer cette espèce dans la section des *Synechia*. Le rhizome est assez délié, écailleux; les frondes y naissent assez distantes les unes des autres; les frondules stériles sont dentées en scie.

38. LUNULATUM, Burm., *Fl. Ind.*, p. 235; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 38. — (Rio-Janeiro, Rio comprido, Glaziou, n° 5351, et à Copacabana, n° 4383.) — Cette espèce est-elle bien identique avec la plante de Burmann? nous n'oserions l'affirmer; le même doute existe pour décider si ce spécimen est exactement le même que l'*A. lunulatum*, dont M. Baker vient de donner une bonne figure, T. 55, fig. 1. Ici le rhizome est dressé à fibrilles couvertes de poils soyeux, étalés; les frondes, fasciculées, ne portent qu'un petit nombre de frondules très-distantes les unes des autres, grandes, tronquées du bas, à marge assez profondément incisée, et comme digitées, à digitations obtuses, toutes chargées de sporothèces étroits, rufescents; le rachis se prolonge privé de frondules et porte souvent un bourgeon à son extrémité. Serait-ce une espèce distincte?

40. CUNEATUM, Langsd. et Fisch, *Filic.*, p. 23, T. 26; Willd., *Filic.*, p. 450; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 38. — (Rio-Janeiro, à Gavia, au bord de la mer, Glaziou, n° 4382.) — A peine distincte de l'*A. Capillus Veneris*, L., dont elle ne diffère guère que par les sporothèces régulièrement courbés en fer à cheval.

21. HEWARDIA, J. Sw., *In Hook. Journ.*, III, p. 432, T. 16 et 17.

1. DOLOSA, Kze., *Linn.*, XXI, p. 219; Hook., *Sp. filic.*, p. 6, T. 79 B. — (Rio-Janeiro, à Rodeio, Glaziou, n° 5355; indiquée comme rare.) — Ce spécimen qui est bipinné vers le bas, atteint jusqu'à 75 centim., avec un pétiole qui dépasse 40 centimètres; la souche porte de très-longues fibrilles, très-étalées.

VII. PTÉRIDÉES.

23. PTERIS, L., *Emend.*

**Frondes pinnées.*

1. CRETICA, L., *Mantiss.*, p. 130, *var. Americana*, Agh.; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 40. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 4390.) — Cette fougère est heptaphylle; la dernière paire des frondules est bifide avec une branche inférieure beaucoup plus petite que la supérieure. En conservant cette variété, nous avons voulu seulement exprimer avec Agardh qu'elle n'est pas identique avec l'espèce européenne.

1². LITOBROCHIOIDES, Klotz., *Linn.*, XX, p. 341; Baker, *Polyp. Brasil.*, p. 400, T. 43, fig. 4 (particul.). — (Cataracte de l'Aripecura, province de Para, Spruce, n° 561.) — Frondes pinnées portant 3-4 frondules, très-grandes, longuement acuminées, atténuées à la base, légèrement décurrentes; les inférieures géminées. Elle est glabre avec un rachis de couleur brun jaunâtre; sa taille peut atteindre près d'un mètre. (N.V.)

***Frondes pluripinnées.*

3. GRACILIS, F., *Gen. filic.*, p. 128, et *Iconogr. nouv.*, p. 32, T. 19, fig. 2; *Crypt. vasc. Brés.*, p. 41. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 5337.) — Fougère d'une extrême délicatesse, tripinnée, à segments stériles linéaires-lancéolés, à dents aristées; pétioles gramineux, naissant sur une souche à grosses radicelles. Elle est voisine du *P. semi-dentata*, F., figuré dans le même ouvrage (Tab. 18, fig. 3); mais, dans cette dernière espèce, les segments ne sont point aristés et les frondes s'attachent à un rhizome rampant. Ces deux fougères ont le port des *Onychium*.

8²? PLATYCLAMYS, F. (Rio-Janeiro, à Itatiaia, Glaziou, n° 5350.) — Très-grande espèce, deux à trois fois pinnée, à frondules dressées, conservant la couleur verte par la dessiccation; les segments sont ovoïdes, légèrement arqués, obtus, portant au sommet 3-4 dents aiguës, les nervilles forment, en se bifurquant, la lettre *v* de l'écriture courante. Les indusiums papyracés sont très-larges et

ondulés. Le pétiole mesure 70 centim., il est fort gros, profondément canaliculé, un peu âpre au toucher, surtout vers la partie inférieure. Malgré certains caractères spécifiques assez remarquables, nous n'osons présenter qu'avec doute cette espèce comme étant nouvelle.

*** *Aquilinaires.*

9. ESCULENTA, Forst., *Prodr.*, n° 418; Agh., *Monogr.*, p. 45. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 4654.) — Les lobules qui unissent les segments frondulaires existent, mais d'une manière moins générale, et ils sont aussi moins grands; il n'y a pas de poils aranéiformes; les nervilles ne sont en relief que du côté inférieur des lames; elle est assez souple et membraneuse plutôt que coriace; la base des pétioles s'entoure d'un tomentum formé de poils fauves. Elle fructifie très-abondamment.

10. ARACHNOIDEA, Klfss., *Enum. filic.*, p. 190; Agh., *Monogr.*, p. 46; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 42. — (Rio-Janeiro, à Itatiaia, Glaziou, n° 5349.) — Cette espèce atteint jusqu'à 4 mètres de hauteur; elle est coriace, opaque, et porte sous la lame des poils blanchâtres, couchés, et plus ou moins longs; les segments frondulaires sont lancéolés, un peu obtus, et unis entre eux par des lobes qui leur donnent un aspect ailé; ce dernier caractère distingue cette espèce et le *P. caudata*, de toutes les autres ptérides aquilinaires.

24. PELLÆA, Lk., *Filic. sp.*, p. 159.

2². ITATIAIENSIS, F.

Frondibus palmato-pedatis, bi-tripinnatis, triangularibus, glaberrimis, subtus glaucescentibus; nervillis rachidis scalpturatis, nigro-purpureis, segmentis frondularum ovatis, oppositis, vespertilioniformibus, versus margines sæpe punctulatis; petiolis cylindraceis, rubescentibus, basi squamosis; sporotheciis universalibus, id est marginem et apicem occupantibus, indusio crispatulo; sporangiis ovoideis, annulo 20-24 articulato, sporis crassis, lævibus, nigrescentibus.

Habitat in Rio-Janeiro, ad Itatiaia. (Glaziou, n° 5348.)

Filix elegans, ad Pellæam geraniæfoliam accedens, sed plane diversa, rhizomate

crasso, squamoso, squamis lineari-lanceolatis, linea longitudinali atro-fusca percursis.

ICON. : *Tab. LXXXVIII, fig. 1.*

(Longueur totale, 12-15 centim.; la lame est au pétiole : : 1:4, avec une envergure de 4 centim. sur 5 centim. de hauteur. Le rhizome est gros comme une plume d'oie ou même comme le petit doigt.)

Très-jolie fougère, se rapprochant des *P. paradoxa* et *microphylla* avec des proportions supérieures et des frondes beaucoup plus divisées; les pétioles sont cylindriques et flexueux, quoique très-fermes; les partitions des lames sont très-rapprochées et s'unissent les unes aux autres, constituant un ensemble pinnatifide; les segments, qui sont opposés, s'unissent à la base, imitant de petites ailes de chauves-souris, disposition qui a valu au *Pteris vespertilionis,* Labill., le nom qui le désigne spécifiquement. Notre espèce a le port du *Pellæa geraniifolia,* Radd., *sub pteride;* elle en diffère par des pétioles cylindriques et non canaliculés, par des segments toujours obtus, des partitions plus rapprochées et plus nombreuses; une radication différente, etc.

7². CRENULANS, F.

Frondibus deltoideis, coriaceis, opacis, nudis, pedato-bipinnatifidis, petiolis cylindraceis, fusco-rufis, rhizomate repente crasso, frondibus sterilibus et fertilibus diversis; sterilibus marginatis, brevioribus, sed amplioribus, segmentis omnibus crenatis, obtusissimis, crenis in torquis speciem concatenatis; fertilibus elatioribus, partitionibus linearibus continuis; sporotheciis margines et apices vestientibus; sporangiis magnis, annulo 20-24 articulato, sporis magnis, rotundis, nigrescentibus.

Habitat in Brasilia fluminensi. (Tijuca, Glaziou, nos 5343 et 5345.)

Filix dissimilaris, frondibus fertilibus et sterilibus diversis; segmentis sterilium crenulato-concatenatis; surculo crasso, fibrilloso, radicellis plumosis.

ICON. : *Tab. LXXXVII, fig. 3.*

(Longueur des frondes stériles, 22-30 centim., sur une hauteur de 6 centim. et une envergure, à la base, de 8 centim., les fertiles mesurent 45-55 cent., le pétiole est à la lame : : 1:6.)

Les botanistes qui ont décrit les *Pellæa* pédiaires, n'ont jamais parlé des frondes stériles; s'ils l'eussent fait, il y aurait moins de vague dans la détermination de ces

plantes, d'ailleurs très-polymorphes. Ici notre espèce semble bien distincte par ses frondes dont toutes les partitions sont obtuses, nombreuses, plus ou moins larges et avec des étranglements qui les font paraître comme concatenées; la dissimilitude des frondes fertiles et stériles n'existe pas toujours.

Cette plante ressemble beaucoup au *Pellæa lomariacea,* Hook. et Baker, *Syn. filic.,* p. 164, *sub pteride,* plante figurée par M. Baker, *Polypod. Bras.,* T. 59; peut-être même n'en serait-ce qu'une forme, quoique distincte. Nous n'avons pu voir les anastomoses dont il est parlé dans la description donnée par ce botaniste; si elles étaient généralisées, ce serait un *Doryopteris.*

5. PARADOXA, F., 7e *Mém.,* p. 30, T. 20, fig. 2, *sub Cassebeeria* (1854); *Crypt. vasc. Brés.,* p. 43. — (Rio-Janeiro, à Itaiaia, 2,500m altit., Glaziou, nos 4392 et 5347.) — Frondes fasciculées sur un gros rhizome très-fibrilleux; elles sont palmées-pédiaires, à segments épais, avec des marges et un sommet envahis par un indusium fort mince et assez large. Le pétiole est cylindrique, épineux, à épines très-courtes et recourbées. Elle ne saurait se rattacher au *P. lomariacea*, ni comme espèce ni comme variété.

** *Eupellæa.*

6. FLAVESCENS, F., *Crypt. vasc. Brés.,* p. 44, T. 22, fig. 2. — (Rio-Janeiro, à Tijuca, Pedra de José Cineiro, 21 janvier 1871; Glaziou, no 3546.) — Très-belle espèce, très-vigoureuse, bi-tripinnée, pouvant atteindre 50 centim.; les pétioles sont très-longs, arrondis, mais déprimés sur une face; le rhizome est de la grosseur d'une plume d'oie, noir et chargé d'écailles de la même couleur, linéaires et très-longuement acuminées. L'indusium est universel (marge et sommet); 18-20 articulations à l'anneau; spores très-gros, noirâtres et papilleux. — Le no 2473, rapporté par nous (*Crypt. vasc., l. c.*) à cette plante, ne correspond pas au même numéro cité par M. Baker.

NB. Nous mentionnerons, d'après M. Baker, deux *Pellæa* spécifiquement établis sur des numéros Glaziouviens qui ne nous sont pas parvenus: 1o no 2473, *apud* Baker *P. Bongardiana,* Bak., Serra de Capa, Rio-Janeiro, port des *Allosorus;* toutes les partitions linéaires; — 2o no 939, *P. lonchophora,* Metten., *sub pteride, Cheil.,* T. 3, fig. 1-3, à Rio-Janeiro. Il semble que la description donnée par M. Baker s'applique à une plante de plus grande dimension. La plante de M. Mettenius ne diffère

pas de notre *Pellæa subsimplex, Crypt. vasc. Brésil,* p. 44, T. IV, fig. 3. Le nom spécifique de *Lonchophora,* porte-lance, quoiqu'il doive avoir l'antériorité, est dû à une forme accidentelle qui ne se reproduit sur aucune des spécimens que nous avons sous les yeux.

25. DORYOPTERIS, J. Sm., *In Hook. Journ. bot.,* IV, p. 162.

2. HASTATA, Radd., *Filic. Bras.,* p. 43, T. 63, fig. 2, *sub pteride;* F., *Crypt. vasc. Brés.,* p. 45.— (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 5338.) — Les formes réunies sous ce numéro nous portent à croire que les *D. sagittifolia* et *hastata,* Radd., *loc. cit., sub pteride,* ne sont qu'une seule et même espèce, les auricules se rapprochent ou se dilatent et la font varier d'aspect, formant à peine une simple variété.

3. RADDIANA, F., *Gen. filic.,* p. 133; *Pteris varians* et *collina,* Radd., *Filic. Bras.,* T. 65; *Crypt. vasc. Brés.,* p. 45. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 5344.) — Var. : γ, *multipartita,* F., *l. c.* — Pétiole robuste, cylindrique, traversé par un faisceau vasculaire en forme de fer à cheval; le rhizome est très-fibrilleux et couvert abondamment de poils fauves très-déliés, ondulés et dentés. L'anneau porte 20 articulations; les spores sont gros, brunâtres et légèrement papilleux. La planche 64 de Raddi s'applique au n° 5389 de Glaziou, récolté au Corcovado, forme dont quelques auteurs ont fait un *Litobrochia hederæfolia,* nom plus justement appliqué à notre *D. angularis.* (Voyez plus loin.)

4. ANGULARIS, F.

Frondibus quinque partitis, basi truncatis, segmentis angularibus, integris, petiolis nigrescentibus, lævibus, cylindraceis, rhizomate fibrilloso; novellis folium hederæ helicis referentibus; sporotheciis margines et apicem attingentibus; sporangiis ovatis, annulo 16 articulato, sporis rotundis, atris, papillatis.

Habitat in Brasilia fluminensi. (Glaziou, n° 5340.)

Filix aspectu peculiari, semi-translucida, basi leviter cordata. Fasciculus vasorum in stipite unicus et hippocrediformis.

ICON. : *Tab. LXXXVIII, fig 2.*

(Longueur des frondes, 26-30 centim., la lame seule 8-9, sur une envergure à la base de 12 centim.)

Jolie plante, remarquable par ses lames qui se divisent en cinq branches anguleuses, très-dilatées à leur point de terminaison; le pétiole est noirâtre, il porte un petit bourgeon au point où repose la lame dont les nervilles principales sont blanchâtres. Les jeunes frondes stériles rappellent exactement la forme de la feuille du lierre; elles sont cordiformes et pentagonales; les fertiles, dès leur apparition, se présentent avec leurs cinq digitations tronquées rigoureusement à la base.

4². REDIVIVA, F.

Frondibus glaberrimis cartilagineis, petiolis adiantinis, sterilibus rotundatis obscure quinque lobatis, basi amplissime cordatis, auriculis disjunctis aut imbricatis, nervillis pedatis, petiolis apice gemmiferis, laminas in senectute novellas 1-3 rotundas, cordatas, petiolatas producente; fertilibus majoribus, 5-7 partitis, terminali majore; sporotheciis marginem totum occupantibus, indusio tenui; sporangiis et sporis ut supra.

Habitat in Brasilia fluminensi. (Tijuca, Glaziou, n° 5341.)

Filix rupicola, rediviva, ad basim frondium laminarum sterilium morientium prolifera.

ICON. : *Tab. LXXXIX, fig. 1.*

(Longueur, 20-26 centim., souvent moins; largeur des frondes, jusqu'à 10 centim. sur 7-9 de hauteur.)

Cette espèce présente ce singulier caractère dans les frondes stériles de produire au sommet du pétiole, quand elles sont mourantes, des frondes exactement arrondies plus ou moins longuement pétiolées, naissant d'une petite souche fibrilleuse et assez semblables à des feuilles de soldanelle. Le rhizome d'où naissent les frondes est court, robuste et très-abondamment chargé de longues radicelles fauves et tomenteuses. Les jeunes frondes (*novellæ*) ont une forme très-voisine des frondes jeunes du *D. angularis*, F. Le caractère spécifique ne saurait être constant.

6. PATULA, F., *Doryopteris Raddiana*, F., var.: *patula; Crypt. vasc. Brés.*, p. 45; *Pteris pedata*, Radd., *Fil. Bras.*, p. 45, T. 66². Var.: β *Pteris elegans*, Velloz., *Fl. Flum.*, T. 81. — (Rio-Janeiro, chemin de la Pedra-Bonita, Glaziou, n°s 4655 et 5342.) — La plus grande des espèces du genre; cartilagineuse, glabre, à frondes très-profondément plurilobées pédiaires, et palmées, à segments très-longs, digités, acuminés; pétiole lisse, canaliculé dans toute sa

longueur, d'un brun rouge-foncé, ainsi que les nervures, très en saillie du côté inférieur. — Cette belle espèce est caractérisée entre toutes ses congénères par la marge de ses frondes stériles, très-finement, très-régulièrement et très-élégamment denticulées en scie, la marge des fertiles étant absolument entière. La plante atteint 75 centim. dans nos spécimens; la lame, plus ou moins découpée, mesure seule 25 centim. sur 22 centim. d'envergure dans nos plus grands spécimens. Elle est assez polymorphe et nous avons sous les yeux des frondes auriculées à auricules profondes; d'autres, plus jeunes, sont sagittées.

Icon. : *Tab. LXXXIX, fig. 2.*

NB. On trouve décrit dans Willdenow, *Filic.*, p. 357, un *Pteris palmata,* dont M. J. Smith a fait un *Doryopteris*, devenu pour M. Baker une simple variété du *D. pedata,* tab. XXV, fig. 1 et 2. On devrait s'attendre, pour confirmer le nom spécifique, à voir une fronde palmée, tandis qu'elle est pédiaire. Il semble raisonnable de croire que cette fougère rentre dans les modifications nombreuses qui rendent si difficile, sinon impossible, de caractériser nettement le *Pteris* (*litobrochia*) *pedata* de Linné et de ses successeurs.

26. LITOBROCHIA, Presl., *Tent. pter.*, p. 118.

1. splendens, Klfss., *Enum.*, p. 180, *sub pteride;* F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 45.— (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 5333.) — Les pétioles sont parcourus par un vaisseau vasculaire ayant la forme d'un upsilon dont les branches remontent à droite et à gauche du sillon pétiolaire. Le pétiole du spécimen que nous avons sous les yeux est fort dur et mesure au delà d'un mètre.

3. Brasiliensis, Radd., *Filic. Bras.*, p. 47, T. 68 et 68*, *sub pteride;* F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 47. — (Rio-Janeiro, à Copacabana, Glaziou, n° 4384.) — Ce spécimen est coriace, à marge épaisse, ondulée. Le faisceau vasculaire se trouve dans les conditions de l'espèce précédente. Le sommet des frondes est très-exactement trifide. Les pinnules sont luisantes du côté supérieur.

3². dissimilis, F.

Frondibus glabris, papyraceis, petiolis stramineis, canaliculatis ad basim rufescentibus; sterilibus subbipinnatis, basi tripartitis, apice trifidis; segmentis

subovalibus, longe acuminatis, sessilibus, decurrentibus, marginibus argute serratis, dentibus aristatis; fertilibus longioribus, pinnatis, basi sæpe partitis, segmentis linearibus, tantum in apice dentatis; sporotheciis angustis, indusio albidulo vestitis, sporangiis pyriformibus, annulo 16 articulato; sporis crassis, trigonis.

Habitat in Brasilia fluminensi. (Glaziou, n° 5335.)

Icon. : *Tab. XC.*

Filix dissimilaris, id est frondibus sterilibus et fertilibus diversis, rhizomate crassiusculo, frondulas 4-5 ferente, petiolis depressis, late canaliculatis.

(Longueur des frondes stériles, 25-30 centim., dont le pétiole fait environ la moitié; frondes fertiles, 45 centim.)

Les frondes sont tripartites vers le bas; la paire terminale est trifide, cunéiforme à la base; toutes sont ovoïdes, acuminées, dentées-aristées à la marge. Le système vasculaire est le même que celui des espèces précédentes. La fronde fertile rappelle par sa forme le *Pteris Cretica,* L.; elle a quelque parenté avec le *L. Brasiliensis.*

4. denticulata, Sw., *Syn. filic.*, p. 97, *sub pteride;* F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 47. — (Rio-Janeiro, Serra de Jacarepagna, Glaziou, n° 5336.) — Cette plante est assez polymorphe. Le faisceau vasculaire a la forme d'un upsilon, et la pointe se dirige du côté supérieur du pétiole.

6. gigantea, Willd., *Fil.*, p. 381; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 47. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 4386.) — Elle est glabre et très-souple; les nervilles des segments fertiles ne sont anastomosées que vers le mésonèvre. Le faisceau vasculaire du rachis est en υ (upsilon).

10. sericea, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 48, T. 11, fig. 3. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 5332.) — Les sporothèces, très-étroits, n'atteignent pas le sommet; elle est parfaitement inerme. Les poils sont strigilleux.

11* angustata, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 49, T. 11, fig. 1. — Cette belle espèce ne saurait être confondue avec le *Pteris* (*Litobrochia macroptera*) de Link, *Filic. sp.*, p. 58, dont il est dit : *pinnellis... sterilibus undique fertilibus, apice serratis;* ici la marge des frondules est parfaitement entière, ainsi que la pointe des frondes. Notre espèce passe au brun par la dessiccation.

12*. VARIANS, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 49, T. 12, fig. 2. — Cette espèce (n° 2472 de M. Glaziou) des plus distinctes n'a absolument rien de spinescent, et la figure que nous en avons donnée ne saurait se rapporter au fragment présenté par M. Baker (T. 44, fig. 2), comme appartenant au *L. aculeata*, Sw., *sub pteride.*

16. ELEGANS, Sw., *Act. soc. Holm.*, p. 70; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 50. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 4385. Var. α *Brasiliensis*, Agh.) — Les spores, au lieu d'être trigones, comme dans presque toutes les espèces, sont ici réniformes, ainsi se trouve justifié le facies tout spécial de cette belle espèce de couleur glauque. Les nervilles ne forment qu'une seule anastomose.

17. PALLIDA, Presl., *Tent. pterid.*, p. 149; Radd., *Fil. Bras.*, p. 49, T. 71. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 5331.) — Très-grande espèce, herbacée, papyracée, glauque en dessous, n'ayant qu'une maille près du mésonèvre, nervilles libres se terminant loin de la marge. Les faisceaux vasculaires, très-étroits, imitent d'une manière quelque peu grossière le chiffre 53. Les spores sont assez variables de forme, celui du rein prédomine, quelquefois les extrémités s'amincissent et se rapprochent en fer à cheval. Ce spécimen ne reproduit pas rigoureusement la figure citée de Raddi; il est plus herbacé et plus feuillu.

27. LONCHITIS, *L. Gen. pl.*, p. 1177.

2. LINDENIANA, Hook., *Spec. filic.*, p. 56, T. 89 A; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 51.— (Rio-Janeiro, à Alto-Macahe, Glaziou, n° 4387.) — Belle espèce qui appartient à un genre très-bien caractérisé; sporanges portant 20 articulations à l'anneau; spores réniformes papilleux. Un gros rhizome couvert de longs poils strigilleux, auquel s'attachent de très-longues fibrilles rameuses, donne naissance à une ou deux frondes poilues dans toutes leurs parties, et portées sur des pétioles déprimés parcourus par trois à quatre sillons assez superficiels.

NB. Les Ptéridées peuvent se partager en deux groupes : 1° les Euptéridées, à frondes une ou plusieurs fois pinnées avec des spores trigones, et 2° les Pellæées, à frondes palmato-pédiaires et à spores réniformes ou arrondis. Ainsi vient se confirmer encore l'importance de la forme, entraînant après elle des différences qui s'étendent jusqu'aux organes de la reproduction.

VIII. CHEILANTHÉES.

28. ADIANTOPSIS, F., *Gen. filic.*, p. 145.

5. OBTUSISSIMA, F. Voy. *A. regularis*, Th. Moor.

5*. REGULARIS, Th. Moor., *in Indice*, p. 252; *A. obtusissima*, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 52, T. 13, fig. 1; Metten., *Cheilanth.*, p. 85, pl. 3, fig. 33, *sub cheilanthe;* Baker, *Polyp. Bras.*, p. 387, T. 56, par Beyrich. — Frondes coriaces, opaques, à pétiole noir d'ébène, cylindrique, couvert, ainsi que les principales divisions du rachis, de poils couleur de rouille; les frondules fertiles sont entières à la marge et portent de chaque côté 6-8 sporothèces revêtus d'un indusium légèrement cordiforme, aplati et fort mince.

6*. INCISA, Th. Moor., *in Indice*, p. 243; Kze., Mss., *Cheilanthes incisa;* Metten., *Cheil.*, p. 88, T. 3, fig. 28-31. — (Rio-Janeiro, Serra d'Estrella, *teste* Metten.) — Les détails donnés par cet auteur (T. 3, fig. 28-30) montrent que les segments sont très-aigus, écartés; ils portent à la marge un indusium arrondi, très-mince qui s'étale à la maturité des sporanges.

29. HYPOLEPIS, Bernh., Presl., *Tent. pterid.*, p. 161.

1. REPENS, L., *Sp. pl.*, p. 1536, *sub lonchitide;* F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 52. — (Rio-Janeiro, Gavia, Glaziou, n° 5328.) — Elle est médiocrement aiguillonnée et porte des poils glanduleux qui la rendent un peu visqueuse. Les vaisseaux du stipe sont linéaires, ils consistent en quatre branches, deux extérieures plus courtes, deux intérieures plus longues, courbées en hameçon au sommet. — Elle est parfaitement identique avec la forme des Antilles.

2. PARVILOBA, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 53, T. 20, fig. 1. — Quand nous avons dit dans la description de cette espèce *sporotheciis nudis*, nous n'entendions parler que de l'état adulte et de maturité.

3. DICKSONIOIDES, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 53. — (Rio-Janeiro, Rio-Soberbo, au pied des Orgues, Glaziou, n° 4405.) — Elle trace comme ses congénères. Les

faisceaux vasculaires du bas du stipe imitent assez exactement deux SS distantes, allongées et disposées en sens inverse.

4. SERRATA, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 53, T. 13, fig. 3. Cette plante, de genre douteux, pourrait bien n'être qu'une forme de l'*Adiantopsis incisa* de Th. Moore. (Voy. plus haut.)

5. RIGESCENS, Kze., Mss., *sub cheilanthe;* Mart., *Fl. herb. Brés.*, p. 229; *Polypodium (phegopteris) punctatum, var. rigescens;* Baker, *Polyp. Bras.*, p. 503, T. 65. — Lieux stériles et arides dans les montagnes près Ilheos; elle a été distribuée par Martius (herb. du Brésil) sous le n° 383. Fronde très-ample, raide, tripinnée pinnatifide, plus simple au sommet; pinnules opposées, étalées, celles du bas pétiolées, les intermédiaires sessiles; segments oblongs ou semi-orbiculaires, crénelés, glanduleux, hispides en dessous; sporothèces arrondis, convexes, assez gros, imparfaitement recouverts par un repli de la marge qui s'amincit en faux indusium. Le stipe, de grandeur médiocre, est flexueux, roussâtre, glanduleux, hispide et spinescent. La figure citée de M. Baker est très-bonne. Ce botaniste a reconnu l'analogie qui unissait cette plante aux *Hypolepis,* et comme, à vrai dire, l'indusium n'existe pas, il a cru devoir en faire un *Phegopteris;* mais ici la parenté avec les *Hypolepis* est trop bien établie pour la méconnaître.

7. STOLONIFERA, F.

Filix triangularis, inermis, pilosa, tripinnata, apicibus acutis, petiolis rachibusque castaneis, lævibus, frondulis inferioribus primariis suboppositis, basipedatis, secundariis lanceolatis, curvatis assurgentibus, tertiariis oblongis, obtusis, crenatis; sporotheciis rufis, axillaribus; sporangiis ovoideis, annulo 16 articulato, sporis rotundis, leviter reniformibus, papillatis.

Habitat in Brasilia fluminensi. (Glaziou, n° 4435, *ad montes Orgaos, scaturigines amnis Soberbo,* et n° 5329 [*Frons magis expansa*] *ad Itatiaia.*)

Filix tenera, petiolo rachique tenuibus, segmentis apertis, rufescentibus, lævibus, primariis glabris, secundariis et tertiariis pilosis, pilis strigillosis, cum paucis pilis glandulosis immixtis, rhizomate longe repente, fibrilloso.

ICON.: *Tab. XCI, fig. 2.*

*

(Longueur : du n° 4435, 45-55 centim., dont le pétiole fait environ les 3/5 ; les pinnules de la base, 12-15 centim., qui se dégradent en dimension de la base au sommet ; le n° 5329 a des dimensions supérieures, et les pinnules de la base atteignent jusqu'à 25 centim.)

Cette espèce est triangulaire dans son pourtour et d'une grande délicatesse. Le rhizome, qui atteint à peine la grosseur d'une plume de pigeon, s'allonge sur le sol à la manière des stolons d'un grand nombre de nos dryadées ; ces stolons émettent de distance en distance de très-longues radicelles presque capillacées, simples ou rameuses, et parmi elles il en est qui mesurent au delà de 30 centimètres. Elle se rapproche des *Hypolepis* inermes.

30ᵇ. ALEURITOPTERIS, F., *Gen. filic.*, p. 153, T. 12, fig. 2.

1. FARINOSA, F., *l. c. cum icone.* — Frondes bipinnatifides, deltoïdes en leur pourtour, nues du côté supérieur des lames et couvertes abondamment d'une poussière blanche, de même nature que la matière pulvérulente sécrétée par les *Ceropteris*. Pinnules pinnatifides, sessiles et au nombre de 7-8 environ, pour chaque côté du rachis, les inférieures, plus grandes, ont une forme deltoïde et pédiaire ; les sporothèces sont arrondis et cachés sous un indusium très-mince, glabre, à marge frangée et assez ample. Cette fougère que M. Baker dit être très-rare au Brésil et n'avoir été récoltée que par Pohl, sans indication précise de localité, est robuste, cartilagineuse, raide, opaque et de dimension très-variable. Les frondes sont fasciculées sur un rhizome chargé d'écailles fauves. Il faudrait retrouver cette plante pour qu'elle pût être définitivement rattachée à la flore du Brésil.

31. CHEILANTHES, Sw., *Syn. filic.*, p. 126, T. 3, fig. 5-7.

4. TWEEDIANA, Hook., *Sp. filic.*, II, p. 84, T. 96*b*; F., *l. c.*, p. 55. *C. microphylla*, Sw., *Syn. filic.*, p. 127; Willd., *Filic.*, p. 458; Prov. Corrientes, *par d'Orbigny, teste* Baker.

5. GLANDULIFERA, F., *Gen. filic.*, p. 158, *sub nomine specifico glandulosa. Paesia viscosa*, Saint-Hil., *Voy. district diam.*, I, p. 381. — (Rio-Janeiro, à Itatiaia, n° 5322, et n° 5323 à Rio sans autre indication.)

ICON. : *Tab. LXXXVIII, fig. 3.*

Nous n'avons rien à ajouter à la description de cette plante, encore méconnue des auteurs en tant que genre, et qui est bien un *Cheilanthes;* la souche est petite et les frondes y sont réunies au nombre de 3-5; les radicelles sont assez grosses et cylindriques. Le nom de *viscosa* ne pouvait être adopté, ayant été donné par Kaulfuss à une plante du Mexique, celui de *glandulosa* se rapporte à une plante de Swartz. Dans cet état de choses voici comment nous croyons possible de régler la nomenclature de notre plante et des espèces qui s'y rattachent:

1. *Paesia viscosa,* Saint-Hil.; *Voy. distr. diam.,* I, p. 381; *Ch. glandulosa,* F.; *Ch. glandulosa?* Sw., *l. c.; Ch. glandulifera,* Th. Moor. et F., *ll. cc.; Pteris viscosa,* Th. Moor.; Gardn., *Chron.,* 1860, p. 878.
2. *Ch. glandulosa,* Sw., *Stockl. Vet. acad. Handl.,* 1817, p. 71; Metten., *Cheil.,* p. 43, T. 3, fig. 32 (*fragmentum*); *an Ch. glandulosa,* F.
3. *Ch. glandulosa,* F., *Gen. filic., l. c.,* p. 158; *Paesia viscosa,* A. Saint-Hilaire.
4. *Ch. glandulifera,* F., *Crypt. vasc. Brés.,* p. 55, 1869, et Th. Moor., *Ind.,* p. 242, 1857 (*nomen tantum*); *Paesia viscosa,* A. Saint-Hilaire.
5. *Ch. glandulifera,* Liebm., Mexic. Breyn., p. 106; *Ch. viscosa, Klfss.*
6. *Ch. glandulosa,* Papp. et Raws; *Ch. hirta,* Sw., var. γ.

6. AQUILINARIS, F.

Frondibus tripinnatis, in ambitu triangularibus, longe petiolatis; frondulis primariis infimis minoribus, remotis, alteris quinque pinnatis, suboppositis, pyramidatis; omnibus acutis, secundariis ejusdem forma, tertiariis angustis, marginibus lobatis, statu fructifero replicatis; petiolis castaneis, bisulcatis, depressis, glabris, rachidibus subpilosis; sporotheciis a margine tegente absconditis.

Habitat in Brasilia fluminensi. (Glaziou, n° 5330.)

Filix aspectu et colore pteridis aquilinæ, sed minor et magis divisa; rhizomate repente, segmentis ultimis crenatis.

ICON.: *Tab. XCI, fig. 1.*

(Longueur, 35-40 centim., dont le pétiole fait plus de la moitié; les plus grandes frondules mesurent 12 centim. sur 6 centim. d'envergure.)

Cette espèce est tout à fait remarquable par la paire de frondules qui se développe au milieu des pétioles, détachée du système général de la fronde dont elle

semble une annexe; elle est assez délicate; ses derniers segments sont crénelés, épais et opaques; les sporothèces se cachent sous un repli des lobules de la marge. Elle a, avec de moindres dimensions, la couleur, la consistance et même un peu l'aspect du *Pteris aquilina*, L., dans les spécimens *maigres*. Ajoutons qu'elle rappelle par sa forme et la disposition de ses pinnules, ainsi que par sa consistance, le *Mertensia grandis*, F., *Hist. foug. Antill.*, p. 120.

7*. HIRSUTA, Lk., *Hort. Berol.*, II, p. 42; Th. Moore, *in Indice*, p. 243, *Ch. pyramidalis*, F., *Icon. nov.*, p. 38, T. 25, fig. 3, *exclusa*. — (Brésil, Blanchet, n° 508.) — Tripinnée, oblongue en son pourtour, à frondules lancéolées, obtuses, crénelées, atténuées à la base, indusium revêtant l'aspect d'un léger tomentum. — Cette plante est-elle bien brésilienne?

8*. SELLOWIANA, Presl., *Tent. pterid.*, p. 160. — Espèce regardée comme douteuse par Hooker, *Spec. filic.*, II, p. 116. M. Th. Moore en fait une plante brésilienne, sans indiquer sur quelle autorité il se fonde.

33. JAMESONIA, Hook. et Grev., *Icon. filic.*, n° 178.

1. SCALARIS, Kze., *in Bot. Zeit.*, 1844, p. 78, et suites à Schkh., I, p. 67, T. 71 A; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 55. — (Rio-Janeiro, à Itatiaia, Glaziou, n° 5327.) — Les frondes linéaires, à frondules extrêmement nombreuses, glabres en dessus, tomenteuses en dessous, à poils roux, intestiniformes, de la grandeur et presque de la forme du *Lemna arrhiza*, L., forment des séries continues sur un rhizome très-délié pour s'élever à peu près à la même hauteur. C'est l'une des plus curieuses espèces de la famille des Polypodiacées.

IX. HÉMIONITIDÉES.

35. NEVROGRAMME, Lk., *Spec. filic.*, p. 138.

1. TOMENTOSA, Lk., *l. c.*, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 56. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 5326.) — Cette forme est exactement celle qui est reproduite par Raddi. (*Filic. Bras.*, T. 19)

3. SCANDENS, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 263. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n°s 3552 et 5321.) — Nous n'avions vu d'abord cette espèce qu'à l'état stérile et jeune; nous la figurons ici adulte et fructifiée. Elle est trop distincte pour qu'il soit besoin d'insister sur la description que nous en avons donnée. Le spécimen figuré mesure 75 centimètres.

ICON.: *Tab. XCII.*

X. ANTROPHYÉES.

36. ANTROPHYUM, Klfss., *Enum. fil.*, p. 198.

2. LINEATUM, Klfss., *l. c.;* F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 57. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 5325.) — Plante délicate, flexible, transparente, lancéolée, finissant en pétiole, parfois légèrement arqué.

XI. LEPTOGRAMMÉES.

39. GYMNOGRAMME, Desv., *Berol. mag.*, V, p. 505.

1. ASPLENIOIDES, Sw., *et auct.;* F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 58. — (Rio-Janeiro, à Tijuca, n°s 4662 et 5324.) — Cette espèce, des plus distinctes, est pinnée dans les trois quarts de son étendue.

4. ATTENUATA, F., *Crypt. vasc.*, p. 59, T. 14, fig. 2. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 4661.) — Les sporanges sont éparses dans ce spécimen.

5². SELLOWIANA, Metten., Mss. *ex* Kuhn. *in Linnæa,* XXXVI, p. 69. — Pétioles courts, flexueux, pubescents ou hispides par le haut; frondes linéaires, lancéolées, petites, épaisses, glabres en dessus, hispides en dessous ou pubescentes, bipinnées, à pinnules très-nombreuses, rapprochées, étalées, presque sessiles, les dernières partitions petites, oblongues avec quelques dents; les inférieures libres; sporothèces linéaires (*ex Mettenio*). Habite les points culminants de la Serra da Piedade, Minas-Geraes (Warming). M. Baker la déclare très-distincte et remarquable par les derniers segments de ses frondules qui sont renflés (*bullosi*). Presl (*Tent. pterid.*, p. 160) a fait un *Cheilanthes* de cette plante; elle nous est inconnue.

6*. PATULA, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 59, T. 14, fig. 2. — (Rio-Janeiro, Serra os Orgaos, Glaziou, nos 3586 et 5267.) — Cette espèce établie sur le n° 2822 est devenue pour M. Baker, *Polyp. Bras.*, p. 500, le *Polyp. pteroideum* de Klotzsch (*Linn.*, XX, p. 389). Ce botaniste semble s'adresser à une autre plante quand il dit : *Fronde lineari subscandente, pinnis deflexis, pinnellis margine involutis, rachidibus quadrangularibus;* les frondules de notre plante ont des marges tantôt entières et tantôt crénelées avec des nervilles simples ou bifurquées.

NB. L'espèce suivante demande à être mieux connue : *G. myriophylla*, Sw. *in Stockh. Vet. acad. handl.*, 1817, p. 15. (Baker, *Polyp. Bras.*, p. 554; Bahia, Luschnath; province Saint-Paul, Burchell, nos 3707 et 3074.) Elle est visqueuse et très-divisée. Nous pensons qu'elle peut être réunie à notre *Cheilanthes glandulifera*, *Paesia*, A. Saint-Hilaire.

6². INSIGNIS, Metten., *l. c.*, p. 70. — Pétioles très-longs, hispides, frondes épaisses, allongées, 3-4 pinnatifides, hispides sur les deux faces, rachis flexueux, pinnules ovales lancéolées, obtuses, lâchement pétiolées, pinnelles inégalement ovales, obtuses, les plus inférieures courtement pétiolées, pinnatifides, segments obovales, pinnatifides ou dentées; sporothèces linéaires. Elle a été trouvée par Saint-Hilaire dans la Serra negra et dans le district des Mines. Elle nous est inconnue.

39². GLAPHYROPTERIS, Presl., *Die Gefassbünd. in stip. der Farren*, p. 36 (*in notis nomen tantum*).

1. DECUSSATA, L., *Sp. pl.*, p. 1555, *sub polypodio;* Sw., *Syn. filic.*, p. 40; Willd., *Filic.*, p. 204; Plumier, *Filic.*, p. 19, T. 24? *Phegopteris;* Metten., *Hort. Lips.*, p. 83, T. 17, fig. 8; *Gymnogramme microcarpon*, F., 7e *Mém.*, p. 43, T. 20. — Fougère très-dilatée, robuste, velue, à très-longues pinnules presque opposées et divisées en segments oblongs, très-nombreux (jusqu'à 40 environ) et très-rapprochés; les sporothèces linéaires, allongés, noirâtres avant la maturité, sont au nombre de 25-35 de chaque côté du mésonèvre; elle s'élève jusqu'à 1m,50 et vit dans les grands bois. Le pétiole est spinulescent.

NB. Nous avons fait du *Glaphyropteris* un sous-genre du *Phegopteris*, après

avoir vu en lui un *Gymnogramme,* à côté duquel nous lui donnons définitivement une place. Pour peu qu'on tienne compte du port, il sera facile de comprendre que cette forme doit être isolée pour former un groupe distinct, auquel on rattachera : 1° le *Gl. rudis,* Presl., *Polypodium,* Kze., *Alsophila pilosa,* Mart. et Gal., *Foug. mexic.,* p. 78, T. 22; 2° le *Gl. erubescens,* Wallich, *sub polypodio,* de l'Inde anglaise, à sporothèces situés près du mésonèvre, et 3° notre *Gl. decussata,* à sporothèces attachés sur la partie moyenne de la nerville, le sommet du segment prolifère étant stérile. — Dernière espèce que nous n'avons pas vue du Brésil, et qui aurait été récoltée par Martius dans la province de Saint-Paul et dans les environs de Rio-Janeiro par M. Glaziou, n° 2372 (*teste* Baker).

41. ANOGRAMME, Lk., *Sp. filic.,* p. 137.

2*. Chærophyllum, Desv., *Berol. mag.,* V, p. 307, *sub gymnogrammate; Anogramme,* Lk., *l. c.,* p. 138. — (Rio-Janeiro, au Morro do Flamingo, *sine* n°, et à Tijuca, Glaziou, n°s 4404 et 5379) [1872]. — Plante très-herbacée, pellucide, glabre, fragile, à frondules inférieures bipinnatifides, les supérieures quadripinnatifides, et les derniers segments incisés. On la trouve dans plusieurs parties de l'Amérique tropicale et équatoriale.

XII. ASPLÉNIÉES.

42. ATHYRIUM, Roth., Presl., *Tent. pterid.,* p. 97.

1². incisum, F., *Gen. filic.,* p. 187. — (Sources du Rio-Soberbo, sommet des Orgues, dans les marécages, n° 4403, et à Itatiaia, n° 5320.) — Grande espèce à frondes sous-tripinnées, glabres, à pinnules lancéolées, acuminées, sessiles, pinnatifides, à segments étroits, recourbés, profondément incisés au sommet; pétioles et rachis sillonnés, gramineux; sporothèces marginaux à indusium très-large, rufescent et légèrement arqué. — Nous avons décrit cette plante pour la première fois sur un spécimen de la France centrale.

Icon. : *Tab. XCIII.*

43. ASPLENIUM, L., *Sp. pl.*, 1558.

* *Frondes simplement pinnées.*

A. *Grandes formes.*

4. Escragnollei, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 62, T. 15. — (Rio-Janeiro, Glaziou, nos 5315 et 5388) [1872]. — Cette plante a de très-grands rapports avec l'*A. oligophyllum*, Klfss., dont elle n'est peut-être qu'une forme à frondules ovoïdes, dressées, nullement *elongato-lanceolatis*, suivant l'expression de Kaulfuss; cet auteur leur donne 6-8 lignes de largeur, tandis que notre n° 1774 mesure au centre plus de 20 lignes, près de 2 pouces. Le n° 2816 rentrerait mieux dans les conditions exigées par Kaulfuss.

5. camptocarpon, F., *l. c.*, p. 63, T. 16, fig. 1. — (Rio-Janeiro à Tijuca, Glaziou, nos 5314 et 5316, sans désignation précise.) — Cette espèce emprunte son nom de la courbure très-marquée des sporothèces, courbure qui s'explique par la direction des nervures, qui sont arquées de dedans en dehors; le pétiole est chargé d'écailles ovales, acuminées; elle vit sur les troncs d'arbres. On la trouve parfois réduite à une seule frondule qui prend alors un développement considérable, 34 centimètres de longueur sur 3 de largeur, mesures prises sur le n° 5316, *subsimplex*.

7. salicifolium, Radd., *Fil. Bras.*, p. 35, T. 50, non Linné. — La plante figurée par Raddi ne rappelle en aucune manière les feuilles du saule, il faut chercher ces rapports dans notre *A. Neogranatense*, F., 7e *Mém.*, p. 47, T. 14, fig. 1, quoiqu'il en soit distinct comme espèce.

8. cirrhatum, Rich., *in* Willd., *Filic.*, p. 321, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 64. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 4397.) — La prolongation du rachis (*cirrha*) se prononce même dans les très-jeunes frondes.

9. gibbosum, F., *Gen. filic.*, p. 195; *Crypt. vasc. Brés.*, p. 64. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 5312.) — Souche dressée, très-fibrilleuse; elle est plus délicate que le n° 2345 appartenant à la même plante.

13. MACRODON, F., 10e *Mém.*, p. 28? — (Rio-Janeiro, Glaziou, Alto-Macahe, n° 4396.) — C'est avec doute que nous rattachons cette plante à l'*A. macrodon;* on ne trouvera pas ici les frondules inférieures réfléchies et de forme orbiculaire. Dans ce spécimen les frondes sont comme géminées sur leur support; les pétioles et les rachis de couleur brun foncé sont déprimés.

14. HARPEODES, Kze., *Linn.*, XVIII, p. 329; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 65. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 4657, Bas-Itatiaia, sur les rochers à 1200m.) — Ce nom spécifique exprime que les frondules sont courbées en cimeterre (*harpa*). La synonymie de cette espèce est très-chargée. M. Hooker l'a figurée T. 178 du tome III de son *Species.* Pétioles adiantins très-fragiles; frondules longuement acuminées, très-prolifères.

14². ABSCISSUM, Willd., *Filic.*, p. 321; *A. bidentatum,* Kze., *Linn.*, IX, p. 66. — (Rio-Janeiro, Belem, Glaziou, n° 5318?) — Frondes pinnées, attachées sur un petit rhizome hypogé; pétioles rougeâtres, striés, déprimés ainsi que le rachis; frondules lancéolées, arquées, presque dimidiées, terminées en coin, marge supérieure gibbeuse, irrégulièrement déchiquetée, dentée ou bidentée; sporothèces médians ou sous-marginaux. — Cette plante croît dans les terrains humides; elle est de moyenne taille; à voir la manière dont le sommet s'effile, on peut croire qu'il est radicant.

16. REGULARE, Sw., F., *Gen. filic.*, p. 66; *Crypt. vasc. Brés.*, p. 66. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 5382) [1872]. — Cette espèce n'a point été figurée et peut être considérée comme étant encore mal établie.

19. FIRMUM, Kze., *Bot. Zeit.*, III, 283; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 66. — Cette plante a été figurée par M. Hooker, *Spec. filic.*, p. 134, T. 174.

20. ALATUM, H. B., Kze., *Nov. gen.*, I, 12; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 67. — (Rio-Janeiro, Serra os Orgaos, Glaziou, n° 4394, et par le même, Alto-Macahe, n° 4401.) — Espèce bien distincte, translucide, les rachis parfois prolifères, étroitement ailés; frondules presque elliptiques, très-obtuses, cunéiformes à la base, inégalement dentées en scie en leur pourtour; les sporothèces sont assez courts et ils en occupent le centre.

22. AURITUM, Sw., *Fil. Ind. occid.*, III, p. 1616; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 67. — (Rio-Janeiro, Alto-Macahe, Glaziou, n° 4399.) — Cette forme est cirrhifère au sommet. Elle tend vers le bas à devenir pinnatifide; l'espèce à laquelle nous la rattachons est des plus mobiles dans ses formes.

B. *Frondes de grandeur médiocre.*

22². INCISURATUM, F.

Frondibus pinnatis, mollibus, petiolis depressis, fuscis, rhizomate paucifrondulifero, frondulis glabris, alternis, translucidis, lanceolatis, petiolatis, basi cuneatis, superne gibbosis, apicé acutis, marginibus dentato-incisis; sporotheciis crassis, mesonevro approximatis, indusio latiusculo; sporangiis magnis, annulo 14-16 articulato, sepimentis latis, succinoideis, sporis crassis episporiatis, fuscis, marginatis.

Habitat in Brasilia fluminensi. (Glaziou, n° 5327, Morro da fazenda.)

Filix petiolo rachique depressis, frondula terminali rhomboidali, profunde incisa; frondibus siccitate nigrescentibus.

ICON. : *Tab. XCIV, fig. 1.*

(Longueur, 30-34 centim., dont le pétiole fait environ la moitié, 5 à 6 paires de frondules, ne dépassant guère 5 centim. sur 10-13 millim. de largeur.)

Cette espèce se rapproche de l'*A. salicifolium*, L., elle est caractérisée par sa consistance et les incisions plus ou moins profondes de sa marge, par la brièveté et la grosseur de ses sporothèces, ainsi que par celle de ses spores. Les frondules sont arquées, acuminées et sous-opposées par le bas; elles naissent sur une petite souche chargée d'écailles ovoïdes, longuement acuminées. Les poils sont strigilleux.

26. JUCUNDUM, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 68, T. 17, fig. 1. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n°s 4657 et 4658, à Alto-Macahe.) — Charmante espèce à frondules courbées, prolongées en une très-longue pointe denticulée et fertile.

27. SERRONII, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 68, T. 17, fig. 2. — (Rio-Janeiro, Gavia, n° 4393.) — Le n° 419 est rapporté dans l'ouvrage de M. Baker à l'*A. pulchellum*, de Raddi. — Notre plante est bien plus vigoureuse, elle porte un nombre beaucoup plus considérable de frondules; la fronde, pinnatifide au sommet, se termine par des segments étroits et irrégulièrement dentés:

port de certaines espèces européennes. — M. Glaziou nous apprend que cette espèce croît sur la terre sèche et pierreuse à l'ombre des grands arbres et des rochers, tandis que l'*A. pulchellum* vit sur les pierres mouillées et moussues des ruisseaux.

28. PULCHELLUM, Radd., *Fil. Bras.*, p. 37, T. 52, fig. 2; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 69. — (Rio-Janeiro à Belem, Glaziou, n° 5319.) — (Voyez l'espèce précédente.)

28². TRICHOMANES, L., *Sp. pl.*, p. 1540; Schkh., *Filic.*, p. 69, T. 74. Var.: *Brasiliensis*, F. — (Rio-Janeiro à Itatiaia, Glaziou, n° 5308.) — Elle ne diffère de l'espèce européenne que par un indusium beaucoup plus large, des pétioles plus robustes et des frondules à crénulations plus marquées.

ICON. : *Tab. XCIV, fig. 2.*

C. FALCARIA; *consistance sèche; frondes raides.*

29. SERRA, Langsd. et Fisch., *Filic.*, p. 16, T. 19; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 69. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 4656.) — Le rhizome est très-gros, chargé de longs poils du plus beau noir. La marge des frondules extérieures n'est dentée que dans sa moitié supérieure.

Var.: WOODWARDIOIDES, Gardn., *Lond. Journ.*, I, 547. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 5313.) — Plus robuste; la marge est irrégulièrement dentée.

** *Frondes bi-tripinnées.*

29². CAUDATUM, Forst., *Prodr.*, 432; Schkh., *Die Farren*, p. 72, T. 77. — (Campos novos, prov. Rio-Janeiro; Bahia, Minas Geraes.) — Cette fougère qui n'avait été vue, jusqu'à présent, qu'aux îles Sandwich, à Taïti et aux Philippines, est présentée par M. Baker comme une forme spéciale. Ne serait-ce pas une espèce distincte?

32². HALLII, Hook., II, *Centur. ferns*, T. 30. — (Saint-Gabriel, Haut-Amazone, Spruce, n° 2357.) — Pétioles nus, courts, frondes membraneuses, herbacées, d'un vert obscur, à sommet radicant; elles sont oblongues, étroites, bipinnatifides, à frondules sessiles, au nombre de 20-30 paires, étalées, lancéo-

lées; segments linéaires, un peu obtus, à la base desquels naissent de courts sporothèces. (Baker, *Filic. Bras.*, p. 443.)

34. CUNEATUM, Lmrk., *Encyc., méth.*, II, p. 309; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 70. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 4400.) — Rachis déprimé, canaliculé, couvert, ainsi que le pétiole, d'écailles piliformes, brunâtres et étalées.

35². TRAPEZOIDES, Sw., *Syn. filic.*, p. 76; Schkh., *Crypt. Gew.*, p. 63, T. 67. — (Brésil austral, Rio-Grande.) — Petite plante bien caractérisée.

38. OVALESCENS, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 72, T. 18, fig 2; *A. pseudo-nitidum*, Radd. Var. : β; *crenatifolium*, Hook., *Spec. filic.*, III, p. 185. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n°s 4395 et 5307.) — Nous avons fondé cette espèce sur les n°s 2474 et 2814 de M. Glaziou que MM. Hooker et Baker rapportent à l'*A. pseudo-nitidum* de Raddi. Il est bien vrai que les rapports qui existent entre ces deux plantes sont réels, mais les lobes dans notre espèce sont largement ovales, non dentés en scie, et à dents obtuses. La figure d'une pinnule donnée par Mettenius (*Aspléniées*, T. V, fig. 25) fait pleinement ressortir ces différences, et M. Hooker (*Spec. filic., l. c.*) semble appuyer la distinction que nous établissons, quand il dit : *My specimens of this handsome fern exhibit two forms, which I dare not venture to consider distinct. In the very glossy and ebeneous stipes and rachis the var.* β crenatifolium *mostly ressembles the figure and description of Raddi, but differs in the very obtuse pinnules and in bluntly crenated, not serrated margins.*

40. PSEUDO-NITIDUM, Radd., *Filic. Bras.*, p. 39, T. 55; F., *Crypt. vasc.*, p. 72. — (Rio-Janeiro à Itatiaia, Glaziou, n° 5306.) — Partitions secondaires distantes, pinnées, pinnules ovoïdes, terminées en pétioles, écartées et dentées en scie. (Voyez l'espèce précédente.)

40². PUMILUM, Sw., *Syn. filic.*, p. 76; Plum., *Filic.*, T. 66 *a*. — (Minas-Geraes.) — Petite espèce, à frondes hétérophylles, rare au Brésil (*teste* Baker).

40³. SCHKUHRIANUM, Presl., *Tent. pterid.*, p. 107; *A. lætum*, Schkh., *Die Farren*, p. 65, T. 70; *A. abscissum*, Willd., *Filic.*, p. 321. — (Rio-Grande do Sul; Rio-Janeiro, Lyall.; Haut-Amazone, Spruce, n° 1633.) — Frondes pinnées,

frondules en trapèze oblong, aiguës, incisées en scie, la base en croissant. — Il existe cinq *A. lætum* dans les auteurs, tant est incertaine la synonymie.

D. Dareastrum.

† *Frondes pinnées.*

41. MONANTHEMUM, L., *Syst. veget. Murray*, p. 1785; Sw., *Syn. filic.*, p. 80; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 72. — (Rio-Janeiro à Itatiaia, Glaziou, n° 5310.) — Les frondes sont lancéolées-linéaires, pouvant porter jusqu'à 50 frondules, les inférieures plus courtes et plus écartées; il n'existe qu'un seul sporothèce ou rarement deux, fort gros, occupant presque en entier la base de la frondule fructifère. Nous recevons un n° 5309 de forme plus petite.

†† *Frondes bi-tri-quadripinnées.*

46. SCANDICINUM, Hook., *Spec. filic.*, III, p. 183, T. 204? F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 73, non *A. divergens*, Metten. — (Serra os Orgaos et Praja d'Alegre, prov. de Saint-Paul, Burchell, n°s 2374 et 4671; Sainte-Catherine, Tweedie.) — Frondes fasciculées, glabres, grisâtres, coriaces, tripinnatifides; pinnules pétiolées-pinnatifides, dentées à la marge externe. C'est une assez grande plante, très-herbacée; verte, pellucide et paucinervée.

NB. Le genre *Asplenium* renferme plus de 250 espèces, parmi lesquelles il en est plusieurs dont il n'est pas toujours possible de débrouiller la synonymie. Cette accumulation de noms spécifiques a lieu pour les espèces les mieux caractérisées; c'est ainsi que l'*A. Adiantum-nigrum*, L., est connu sous dix noms; l'*A. falcatum* en a quinze; l'*A. præmorsum* et ses variétés plus de trente. Qui pourrait se flatter de s'y reconnaître? Aussi croyons-nous avoir agi sagement en réduisant ces synonymes autant qu'il était possible et permis de le faire.

XIII. SCOLOPENDRIÉES.

45. ANTIGRAMME, Presl., *Tent. pterid.*, p. 120.

1. REPANDA, Presl., *l. c.*, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 74. — (Rio-Janeiro à Belem, Glaziou, n°s 4660 et 5305.) — Les écailles de la base des frondes sont cancellaires comme dans les Vittariées et les Antrophyées. Les radicelles, extrêmement nombreuses, sont très-longues et écailleuses.

3. Douglasii, Hook. et Grev., *Icon.*, T. 150, *sub asplenio;* F., *Crypt. vasc. Brés.*, T. 74. — (Rio-Janeiro, Gavia, au bord de la mer, n° 4402.) — Spécimen très-élargi à la base et largement cordiforme; les lobes se prolongent en oreillettes obtuses; elle est très-vigoureuse et ses sporothèces binaires ont 2 millim. de largeur.

5. A. Lageana, F. et Glaz., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 264. — Elle a été reçue sous le n° 3562. — Base des frondes arrondie, tronquée ou même cordiforme.

NB. Les cinq espèces indiquées comme brésiliennes pourraient se réduire à trois ou même à deux, *A. repanda*, Presl., et *A. Douglasii*, Hook.

XIV. DIPLAZIÉES.

46. DIPLAZIUM, Sw., *Syn. filic.*, p. 4.

** *Frondes pinnées, assez larges, crénelées.*

2. Callipteris, F., *Gen. filic.*, p. 214; *Crypt. vasc. Brés.*, p. 75. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 5390) [1872]. — Les nervilles sont en relief; les frondules élégamment ondulées-crénelées; elle noircit par la dessiccation.

3. grandifolium, Sw., *in Schrad. Journ.*, 1800, II, p. 62; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 75. — Mettenius ex Kuhn *in* Linn., XXXVI, 104, a fait du n° 2474 de M. Blanchet une espèce distincte sous le nom d'*Asplenium Blanchetii.*

4. dissimile, F., *Crypt. vasc.*, p. 76, T. 21, fig. 1; *A. Riedelianum*, Bongard *in* Baker, *Polyp. Brés.*, p. 450, T. 61. — Plante très-polymorphe.

5. A. celtidifolium, Kze., *Bot. Zeit.*, III, 1845, p. 285; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 76. — Ce nom spécifique est difficile à comprendre. De quel *celtis* veut-on parler ? Aucune feuille de cet arbre ne ressemble à la fronde d'une fougère, quelle qu'elle soit. La plante de Kunze n'est indiquée comme brésilienne que sur un spécimen unique, celui de M. Blanchet, n° 544.

6. parallelogrammum, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 76, T. 20, fig. 2; *Diplazium Lechleri*, Moor., *Ind. filic.*, p. 331; *Asplenium Lechleri*, Metten., *Fil. Lechler.*, p. 16, T. 2, fig. 10; Baker, *Filic. Bras.*, p. 450. — Belle espèce trouvée d'abord au Pérou.

17. LEPTOCHLAMYS, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 79, T. 22, fig. 1. — A des rapports avec le *D. ambiguum* de Radd., *Filic. Bras.*, p. 41, T. 58. — Dans notre plante les frondules sont presque pinnatifides, pétiolées, à nervilles nombreuses, très-rapprochées; sporothèces au nombre de 8-9 paires.

18. HERBACEUM, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 80, T. 23, fig. 1. *Asplenium* (*diplazium*) *Glaziovii*, Baker, *Filic. Bras.*, p. 455. — C'est sous ce nom que notre espèce a été postérieurement décrite par M. Baker. Nous lui avons donné par erreur le n° 2062, lisez n° 2061.

18². DELICATULUM, F.

Frondibus amplis, tenerrimis, tripinnatis, herbaceis, glaberrimis, petiolo rachique helveolis; partitionibus primariis petiolatis, oblongo-lanceolatis, rachi rufescente, depresso, canaliculato; secundariis lanceolatis, vix petiolatis, longe acuminatis, acumine crenato; rachi alato; segmentis oblongis, crenatis; sporotheciis quinque per seriem; sporangiis satis, parvis, rotundis, annulo 14 articulato, sporis ovoideis, pallide luteolis.

Habitat in Brasilia fluminensi. (Glaziou, n° 5303, Tijuca.)

Filix dilatata, tenerrima, rachibus delicatulis, pinnulis secundariis curvatis, longe acuminatis.

(Longueur : 1 mètre et plus; frondules primaires, 25-28 centim.; pinnules, 5-8 centim. sur 2 de largeur.)

Très-grande espèce, ayant un pétiole vigoureux et un rachis très-délié, elle est très-herbacée; toutes ses partitions sont très-écartées, elle a le port et la consistance du *D. herbaceum*, F., mais chez cette dernière tout se termine en pointe, tandis que dans l'autre toutes les partitions sont obtuses.

20. ROSTRATUM, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 81, T. 24, fig. 2. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 5304.) — Espèce assez variable dont la figure donnée ne reproduit qu'une des formes et la moins fréquente; les frondules sont légèrement cordiformes; les crénulations tronquées.

XV. MÉNISCIÉES.

48. MENISCIUM, Schrad., *Gen. pl.*, n° 1630.

1. RETICULATUM, Sw., *Syn. filic.*, p. 19; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 83. — (Rio-Janeiro, à Campo bello, Glaziou, n° 5302.) — Très-grande et très-belle espèce; elle vit dans les endroits marécageux.

XVI. POLYPODIÉES.

49. GRAMMITIS, Sw., *Syn. filic.*, p. 21.

1². ORGANENSIS, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 264, T. 78, fig. 1. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 4406, non Gardn., *in* Hook., *Icon pl.*, T. 109.) — Notre plante, à laquelle il eût été préférable de donner un autre nom, a des nervilles simples et non bifurquées, comme dans la plante de Gardner plus haut citée, une fronde crénelée et non pinnatifide; la radication est aussi différente, il n'y a pas de rhizome, mais une petite souche fibrilleuse.

1³. WITTIGIANA, F. et Glaz.

Frondibus simplicibus, linearibus, obtusis, glabris, marginibus dentatis, dentibus obtusis; mesonevro fusco, rigido; nervillis simplicibus, margines non attingentibus, leviter arcuatis, fuscis, superficialibus; sporotheciis crassis, ovoideis, costalibus; sporangiis latis, parvulis, annulo angusto, 10-12 articulato, sporis fuscis, rotundatis lævibusque.

Habitat in Brasilia fluminensi ad Itatiaia. (Glaziou, n° 5300; altitude, 2300 mètres.)

Filix parvula, translucida, linearis, cæspitosa.

ICON.: *Tab. XCV, fig. 1.*

(Longueur, 5-7 centim. sur 5 millim. de largeur.)

Cette espèce diffère de la précédente par des marges dentées ou ondulées, mais non crénelées; elle est deux à trois fois plus petite, translucide et non opaque.

1*. MUSCOSA, F.

Cæspitosa; frondibus oblongis, obtusissimis, glabris, opacis, margine crenatis, petiolo basi nudo, filiformi; mesonevro turgido, nervillis simplicibus, apice leviter inflato, translucido, punctiformi; sporotheciis costalibus, ovoideis, distinctis; sporangiis parvulis, longe pedicellatis, sporis globosis, leviter papillatis.

Habitat in Brasilia fluminensi ad Itatiaia. (Glaziou, n° 5301.)

Filix nana, frondibus cæspitosis, surculo crasso, fibrilloso.

ICON. : *Tab. XCV, fig. 2.*

Cette fougère est haute de 2 centimètres à peine, sur 2 millimètres de largeur; ses frondes naissent en touffe sur une petite souche fibrilleuse; elles sont glabres, crénelées, seulement vers les deux tiers inférieurs des lames; le sommet des nervilles se détache en un point noirâtre sur la lame supérieure.

6. MARGINELLA, Sw., Fl. *Ind. occid.;* p. 1631. *G. limbata,* F., 6e *Mém.,* p. 6, T. 5, fig. 1. — Plante nettement caractérisée par une bordure noire, continue et comme vernissée qui l'entoure et qui manque absolument dans le *G. fluminensis; Crypt. vasc. Brés.,* p. 85, T. 19, fig. 3, quoique le port des deux plantes diffère à peine.

7*. PAUCINERVATA, F.

Filix nana, linearis, glaberrima, cæspitosa, opaca, nervatione ad mesonevron reducta, aliquando 2-3 nervillas tenuissimas emittente; sporotheciis 1-3 rotundis, surculo fibrilloso.

Habitat in Brasilia fluminensi. (Pic de la Tijuca, Glaziou, n° 5384.)

ICON. : *Tab. XCVI, fig. 1.*

Cette fougère est fort petite, 2-2,5 centim. de longueur, sur un peu plus d'un millimètre de largeur; elle se termine en un court pétiole, très-délié. Il sera facile de la distinguer du *G. muscosa* à ses marges entières, très-étroites, dont les quelques nervilles qui se détachent du mésonèvre, sont très-déliées et n'impressionnent nullement la lame inférieure. Elle est aussi plus étroite.

8*. SETOSA, Klfss., *Enum. filic.,* T. 272 *sub xiphopteride; G. myosuroides,* Radd., *Filic. Bras.,* p. 12, T. 22², fig. 3. — Elle est indiquée comme vivant dans la

Serra os Orgaos; ses frondes sont dressées, à sporothèces oblongs, occupant la base des segments pinnulaires et appuyés contre le mésonèvre. Le rhizome est rampant, tandis que la radication des espèces précédentes est à l'état de souche fibrilleuse.

9. FURCATA, Hook. et Grev., *Icon. filic.*, T. 62; Hook. et Baker, *Gen. filic.*, T. 72 B, fig. 1-6. — (Haut-Amazone, rive du Juarete, par Spruce, n° 2452.) — Ordinairement dichotome, parfois simple et parfois fourchue. Le rachis est noir d'ébène. Les sporothèces occupent le sommet des nervilles. Nous ne la connaissons que de la Guyane.

50. POLYPODIUM, L., *Sp. filic.*, p. 1554.

* *Type P. vulgare.*

1 [3]. TYPICUM, F.

Frondibus pinnatifidis, segmentis ad mesonevron attingentibus, obtusissimis, basi leviter contractis, lamina superiori glabra, marginibus puncta minutissima carbonate calcis formata habentibus, lamina inferiori squamulosa, squamis fulvis, longe acuminatis, applicatis, petiolis canaliculatis, fuscis, parce squamosis; sporotheciis 6 biseriatis, crassis, immersis, annulo 12 articulato; sporis lævibus, lutescentibus, subtranslucidis, rotundatis ovoideisque.

Habitat in Brasilia fluminensi ad Itatiaia. (Glaziou, n° 5294.)

Filix facie Polypodii vulgaris, L., sed sporotheciis immersis, squamescentia sporangiis sporisque late diversa; rhizomate squamoso, crassitudine pennæ corvinæ; squamis lanceolatis, acuminatis, fuscis, margine albidulis.

ICON.: *Tab. XCVI, fig. 2.*

(Longueur, 10-12 centim. sur 3,5-4 d'envergure, le pétiole fait la moitié de cette dimension.)

Le nom spécifique a pour but d'indiquer que la plante se rapproche du *Polypodium vulgare*, L., type du genre. Les différences qui séparent les deux plantes sont manifestes et nous venons de les indiquer. Chaque fronde se compose de 8-9 segments horizontaux notablement rétrécis à la base; le terminal est elliptique et assez court, les marges portent des denticulations peu profondes et écartées, le rhizome s'étend beaucoup et les frondes qu'il porte sont notablement écartées les unes des

autres. Les spores sont lisses, jaunâtres, arrondis ou ovoïdes dans le *P. vulgare*, L., ils ont ici une forme de rein, avec une couleur brune et une surface grossièrement tuberculeuse.

2. TENUICULUM, F., *Gen. filic.*, 239, et *Crypt. vasc. Brés.*, p. 86. Ajoutez : non Humb. et Bonpl., *Nov. Gen.*, I, p. 9.

2². ARGYRATUM, Bory, *in* Willd., *Filic.*, p. 175.

Var. : *Brasiliana*, F. — (Sommité des Orgues, Glaziou, n° 3579 et non 3577 qui appartient au *P. tenuiculum*, F.) — La couche céracée qui recouvre les segments inférieurs est de même nature que la matière pulvérulente, si abondante et si variée de couleur dans les genres *Ceropteris*, *Trismeria* et *Cincinalis*. Elle est amorphe. M. Glaziou nous écrit que cette plante est fort rare.

4. PLEOPELTIDIS, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 86, T. 26, fig. 1. — Cette espèce diffère à peine du *P. Karwinskianum*, A. Br. *in* Metten., *Polyp.*, p. 66, établi sur une plante mexicaine, à laquelle Mettenius rattache comme variété le *P. plebeium* de Schlechtendal, Linn., V, p. 607.

4². LONGIPES, F.

Frondibus pinnatifidis, triangularibus, apice attenuato, sterili, segmentis lanceolatis, obtusiusculis, basi latioribus, decurrentibus, marginibus integris, parce ciliatis, petiolis longissimis, pilosulis, adiantinis, mesonevro fuscescente; sporotheciis rubescentibus, 8-12 biserialibus, superficialibus, fere marginantibus; sporangiis ovoideis, annulo 12 articulato, sporis polymorphis.

Habitat in Brasilia fluminensi in montibus Orgaos. (Glaziou, n° 4414.)

Filix elata; rhizomate crasso, squamis angustis, acuminatis, intense fuscis vestito.

ICON. : *Tab. XCV, fig. 3.*

(Longueur des frondes, 30-36 centim. sur 8 centim. d'envergure à la base; les segments, presque linéaires, n'ont que 3-4 millim. de largeur; les lames mesurent 12-14 centim., ce qui donne au pétiole au delà de 20 centim.)

Cette fougère est triangulaire, les segments inférieurs étant les plus longs; la lame supérieure n'est pas impressionnée par les sporothèces et n'offre aucune trace

de points calcaires. Les pétioles, très-velus du bas, tranchent par leur couleur avec le mésonèvre; ils sont d'un noir très-pur. Elle semble se rapprocher du *P. plebeium*, Schlect., auquel on réunit le *P. leucosticton*, Klotz., dont le caractère est tiré de la sécrétion calcaire qui se montre sur les lames supérieures.

5. REPANDUM, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 87, T. 29, fig. 1. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 4421.) — Elle est pendante et ses pétioles sont chargés d'assez longs poils étalés. On la reconnaîtra sans peine à ses sinus terminés en pointe, à la marge des segments fortement ondulés et presque dentés, très-élargis à la base et chargés de 6-9 paires de sporothèces assez gros, indiqués sur la lame supérieure par un petit renflement qui porte au centre une dépression ponctiforme.

6. HIRSUTULUM, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 87, T. 26, fig. 2.— (Rio-Janeiro, Serra os Orgaos, Glaziou, n°s 3578 et 5299 à la Pedra bonita.) — Cette espèce a été décrite tout récemment par M. Baker, *Polypod. Brés.*, p. 513, sous le nom de *P. gradatum*. Le *P. hirsutulum* de Raddi, *Filic. Bras.*, p. 21, T. 29, fig. 2, est un *Goniophlebium* encore mal connu. (Voy., *l. c.*, p. 111.)

6². VILLOSUM, F.

Frondibus oblongo-lanceolatis, in omni parte villosissimis, opacis, segmentis horizontalibus, oblongis-obtusis, basi decrescentibus; petiolis villosissimis, fuscis, mesonevro albidulo, nervillis marginem attingentibus; sporotheciis leviter immersis, 7-8, approximatis, sed non confluentibus; sporangiis latis, parvis, annulo 12 articulato, brunneis, irregulariter rotundatis.

Habitat in cacumine montium, Serra Orgaos incolarum (Glaziou, n° 4411.)

Filix villosissima, pilis tenuibus, patulis; aspectu P. vulgaris, *sed tamen longe diversa.*

ICON.: *Tab. XCVII, fig. 1.*

(Longueur, 16 centim. sur 3 d'envergure; les segments mesurent 4-5 millim.)

Cette espèce décroît à la base et au sommet. Les écailles du rhizome sont fort petites, lancéolées, dures et de couleur fauve; M. Glaziou nous apprend qu'elle est rare.

** *Type : Polypodium trichomanoides*, Sw.

8². ANGUSTISSIMUM, F.

Frondibus angustissimis, glabris, rigidis, basi decrescentibus, apice longe torulosis, petiolis filiformibus, lobis semi-ovoideis, alternis, aliquando connatis, numerosis, stipitibus gracilibus, flexuosis, longitudine varia; sporotheciis confluentibus a marginibus reflexis semi-vestitis; sporangiis ovoideis, annulo 14 articulato, sporis crassis, fuscis lævibusque.

Habitat in Brasilia fluminensi (Glaziou, n° 5297), *lobis intermediis sæpe connatis, et in* n° 5298, *petiolis gracilioribus longioribusque.*

Filix ad P. moniliforme *accedens, sed manifeste diversa; rhizomate repente, squamoso, squamis oblongis, acuminatis.*

ICON. : *Tab. XCVI, fig. 3* (*sed in natura paululum longior et angustior*).

(Longueur, 17-20 centim. sur 3-4 millim. de largeur; le pétiole est à la lame :: 1 : 2 ou : 3. Je compte sur les frondes 36-40 paires de lobes.)

L'étroitesse des frondes, le grand nombre des lobes rapprochés les uns des autres, la confluence des sporothèces, à demi recouverts par les marges, établissent entre cette espèce des rapports avec les *Jamesonia*. Le *P. moniliforme*, Cav., qui prend place à côté de notre plante, donne lieu, malgré les différences spécifiques, à des analogies évidentes. Les lobes attachés par une très-large base prennent dans leur ensemble un aspect spiraloïde.

9. IMMERSUM, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 88. — Rapporté par Mettenius au *P. jubæforme*, Klfss., *Flor.* 1823, p. 364.

9². SUBDICARPON, F.

Frondibus linearibus, flexibilibus, glabris, opacis, lobis pauci-nervatis, oblongis, petiolis pilosis, brevibus mesonevroque nigrescentibus; lamina inferiori pallidiori; sporotheciis basilaribus 1-2; annulo 12 articulato, sporis nigrescentibus, irregulariter rotundatis.

Habitat in Brasilia fluminensi. (Glaziou, n° 4410.)

Filix moniliformis, frondibus apice basique decrescentibus, marginibus leviter deorsum stricte revolutis.

ICON. : *Tab. XCVI, fig. 4* (*sed in natura segmentis leviter minoribus*).

(Longueur, 18 centim. sur 10-11 millim. de largeur.)

Cette espèce est souple, légèrement élastique, à lobes ovoïdes ou hémisphériques, à frondes arquées, notablement discolores, vertes en dessus, jaunâtres en dessous; le pétiole est assez court et squammeux; les sporanges basilaires sont ordinairement uniques et beaucoup plus rarement au nombre de deux; le rhizome est relativement assez gros; il porte des écailles noirâtres, linéaires ou étroitement lancéolées et fort dures. — Cette fougère prend place dans la série des espèces à côté des *P. Trichomanes, moniliforme, immersum* et *angustissimum.*

11*. EXIGUUM, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 89, T. 37, fig. 1. — Elle a quelque ressemblance avec le *P. Trichomanes,* Sw., tel qu'il est figuré par Schkhur., *Filic.,* T. 10, mais notre espèce, bien moins velue, est longuement pétiolée et non sessile.

12. CONFLUENS, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 89, T. 26, fig. 3. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n°s 3340 et 4408.) — Cette espèce aurait dû être placée parmi les *Polypodium* pectinés, à petites formes; elle est très-voisine du *P. apiculatum,* Klotz.; mais absolument distincte du *P. ferrugineum,* Mart. et Galeot., auquel on voudrait la réunir.

** *Type : P. pectinatum,* L.

15. PECTINATUM, L., p. 1545, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 90; Velloz., *Fl. flumin.*, p. 64. — (Rio-Janeiro à Itatiaia, Glaziou, n° 2290.) — La figure citée de Velloso reproduit exactement ce spécimen. C'est une très-grande plante, attachée aux arbres, et mesurant 1 mètre et plus, sur 11-12 centimètres d'envergure. Les segments sont lancéolés-linéaires, obtus au sommet, un peu contractés à la base, laissant entre eux des sinus de 6-8 millim.; les pétioles sont rougeâtres, un peu déprimés. Le rhizome est gros et chargé d'écailles piliformes noirâtres. Les sporothèces sont légèrement immergés; ils renferment des spores réniformes.

17*. PARADISIASTRUM, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 90, T. 29, fig. 2. — Le n° 4417, récolté à Alto-Macahe par M. Glaziou, se rattache à cette espèce; mais les sporothèces sont plus distants et un peu plus gros.

18. RECURVATUM, Klfss., *Enum.*, p. 126; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 91. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 5291.) — Ce n'est pas de haut en bas, comme il a été

dit, que les segments dirigent leur courbe, mais plutôt de bas en haut; ils sont opposés vers le tiers inférieur de la fronde et portent de chaque côté du mésonèvre 36 à 40 paires de sporothèces légèrement immergés.

3e Type : *Polypodium pectinatum*, L.

* Grandes formes.

19. OTITES, L., *Sp. pl.*, 1545; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 91. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 4416.) — Le caractère donné par Willdenow, *Filic.*, p. 177, celui de segments opposés au centre de la fronde, n'a aucune fixité et les spécimens que nous avons sous les yeux en portent le témoignage.

21. ROBUSTUM, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 92, T. 28, fig. 1. — (Rio-Janeiro, Petropolis, Glaziou, n° 4415.) — Les segments inférieurs se dégradent brusquement en dimension pour se réduire à des segments avortés, ovoïdes et inclinés de haut en bas.

21² MERIDENSE, Klotz., *Linn.*, XX, p. 380; Hook. et Bak., *Syn. filic.*, p. 333; *P. Spixianum*, Mart., *Herb.*; Kze., *teste* Metten., *Polyp.*, p. 57; *P. nidulans*, Beyr., *Herb.* — (Serra os Orgaos, Gardn., n° 128.) — Pétioles grêles, arqués; frondes pinnées, raides, portant inférieurement quelques poils; pinnules linéaires, entières; sporothèces arrondis, marginaux, au nombre de 10 à 15 par pinnule. Pétioles, 15-16 centim.; pinnules, 4-5 centim. de longueur sur 4-5 millim.

** Petites formes.

24². PECTEN, F., *Gen. filic.*, p. 240; *P. pectinellum*, F., *Icon. nouv.*, p. 61, T. 27, fig. 2. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 5295.) — Cette espèce a été établie par nous sous ces deux noms en 1840 et en 1854 sur une fougère de Merida (Linden, n° 239). — Elle est élastique, oblongue-lancéolée, courbée, un peu décroissant à la base; les segments sont presque horizontaux, linéaires, obtusiuscules, la fronde se termine par un long appendice fructifère, ce qui la distingue du type. Elle a 15-17 centimètres de long sur une envergure de 2-3 centimètres; les sporanges sont légèrement immergés, d'une couleur presque rouge, qui tranche agréablement avec la nuance verte de la fronde que ne lui enlève pas la dessiccation. Cette espèce est voisine du *P. apiculatum*, Kze., *Mssc.* Sur la lame supérieure se montrent des écailles arrondies, blanchâtres, minces et aplaties.

24³. ACRODONTIUM, F.

Frondibus pinnatis, lanceolatis, basi et apice decrescentibus, parce pilosis, plus minusve curvatis, elasticis, opacis, segmentis linearibus alternis, inferioribus oppositis, omnibus obtusiusculis; sporotheciis immersis; sporangiis ovoideis, annulo 14 articulato; sporis nigrescentibus polymorphis.

Habitat in Brasilia fluminensi. (Glaziou, nº 4409.)

Filix apice sterili longe attenuato, serrato, surculo erecto; petiolis rotundis, pilosis, pilis aureis, patulis vestitis.

Icon. : *Tab. XCVII, fig. 2.*

(Longueur des frondes, 16-18 centim. sur 12-13 millim. d'envergure; le pétiole est à la lame :: 1 : 3 ou à 4.)

Les caractères distincts de cette espèce sont tirés du sommet des frondes qui s'allonge en une très-longue pointe dentée en scie, dont les dents résultent de la dégradation en dimension des segments pinnulaires; puis, de l'opposition dans le quart inférieur de ces mêmes segments; elle est poilue dans toutes ses parties; l'immersion des sporothèces est notable. La fronde du *P. confluens*, F., espèce voisine, se termine en une pointe coudée entière et stérile.

4e Type : *Polypodium chnoophorum*, Kze. (espèces pubescentes).

26². PILOSUM, F.

Frondibus pinnatifidis, usque ad mesonevron partitis, oblongis, universaliter pilosis, pilis albis, strigillosis, applicatis; laciniis horizontalibus, oblongis, integris, approximatis, undulatis, apice decrescentibus, inferioribus minoribus deflexis; petiolo brevi; mesonevro angustissimo, tenui, helveolo; rhizomate crasso; sporotheciis superficialibus, satis remotis, rubricosis; sporangiis laxe congestis, ovoideis, annulo 12 articulato; sporis rotundatis, nigrescentibus.

Habitat in Brasilia fluminensi ad montes vulgo dictos Serra os Orgaos. (Glaziou, nº 4412.)

Filix mollis, translucida, nervillis unifurcatis, ramo inferiori fertili; rhizomate repente, crassitudine pennæ anseris.

Icon. : *Tab. XCVII, fig. 3.*

(Longueur, 20-22 centim. sur 6 d'envergure; les segments, 3 centim. sur 8 millim. de largeur; le pétiole mesure seulement 3 centim.)

Espèce souple, étalée, à demi transparente, s'amincissant brusquement pour se

réduire en lobes arrondis; les segments inférieurs se dirigent vers le bas, d'une manière de plus en plus marquée, jusqu'aux dernières paires, notablement infléchies. Elle est grisâtre, étant desséchée, et de même couleur sur les deux faces.

II. *Frondes pinnées-pinnatifides* (segments dentés).

30. CILIARE et 31 OVALESCENS, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 94, T. 27, fig. 2 et 3. — Ces deux espèces ne sont séparées que par la division des frondes, pinnatifides dans l'une et pinnées dans l'autre; il faudrait voir un grand nombre de spécimens pour s'assurer de la validité de ces deux formes; en attendant on peut, sans inconvénient, les réunir sous le nom spécifique *ciliare*. Elles ne sauraient se rattacher au *P. cultratum*, Willd., ni à aucune de ses formes.

32. SEMI-ADNATUM, Hook., *Icon. pl.*, T. 948; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 95. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 4413.) — Cette espèce doit son nom à cette particularité d'avoir des segments pinnulaires attachés au rachis par une faible portion de leur base. Le sacculus ne porte dans le spécimen cité qu'un ou deux poils noirâtres, fort longs et fort raides.

NB. Le *Polypodium rigescens*, Bory, *in Herb.* Kze.; Metten., *Polypod.*, p. 42, répondrait à un n° 2415 de M. Glaziou que nous n'avons pas sous les yeux, comme variété du *P. moniliforme*, Cavan. La plante de Bory appartient à la flore de l'île de France, et nous n'oserions croire qu'elle existe en réalité au Brésil.

34. ACHILLEÆFOLIUM, Klfss., *Enum. filic.*, p. 116; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 95. — (Rio-Janeiro, Serra os Orgaos, Glaziou, n° 4407.) — Sporothèces superficiels, 14 articulations à l'anneau, spores gros, lisses, polymorphes. — Cette espèce des plus distinctes se rapproche par le port des *Adenophorus*, de Gaudichaud.

51. PHEGOPTERIS, F., *Gen. filic.*, T. 242, T. 20 *a*.

I. *Frondes pinnées-pinnatifides.*

* *Formes à frondes plus ou moins étroites.*

3. FLAVO-PUNCTATA, Klfss., *Enum.*, p. 108, *sub polypodio;* F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 96. — Cette espèce serait mieux placée dans les espèces à frondes larges.

10². PTEROIDEA, Klotz.; *Linnæa,* XX, p. 389, *sub polypodio;* Metten., *Phegopt.* et *Aspid.,* p. 9; *Pteris fallax,* Kze., *Mssc.* — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 2822 [*ex* Baker], N. V.) — Fronde linéaire, acuminée, très-longue (1 m. 30 centim. et plus), membraneuse, presque grimpante, pinnée, lancéolée, pinnatifide au sommet; pinnules sous-opposées; stipe et rachis très-grêles; sporothèces petits et rapprochés de la marge.

II. *Frondes bi-tripinnées.*

15*. SPLENDIDA, Klfss., *Enum. filic.,* p. 112, *sub polypodio;* F., *Crypt. vasc. Brés.,* p. 101. — (Rio-Janeiro, à Itatiaia, altitude 2000 mètres; Glaziou, n°s 5379 et 5385 en 1872.) — Le rhizome est de la grosseur du doigt et abondamment couvert d'écailles brunes, étroitement lancéolées et crispées. Les sporothèces sont tri-quadrisériaux. — Elle est plus ou moins cartilagineuse, suivant les lieux où elle croît.

16*. CONNEXA, Klfss., *l. c.;* F., *Crypt. vasc. Brés.,* p. 101. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 5299.) — Consistance cartilagineuse; elle n'a qu'une seule double rangée de sporothèces.

18². CAMPTOCAULON, F.

Frondibus diffusis, amplissimis, patulis, bipinnato-pinnatifidis, pendulis, heteromorphis, rachibus helveolis, basi rufescentibus, flexuosis, sinuosis; pinnula primaria pinnato-pinnatifida, rachi sulcato, basi lana flavidula vestito, ad apicem attenuato, frondulis lanceolatis, petiolatis acuminatissimis, aliis reflexis, aliis horizontalibus, superioribus assurgentibus, pinnatifidis seu pinnato-pinnatifidis, segmentis integerrimis aut crenatis, sessilibus aut breve petiolatis, pilosulis, ad marginem breve ciliatis; sporotheciis uni seu biserialibus, rubescentibus, sporangiis laxe approximatis, annulo 14-16 articulato, sporis rotundis, papillatis, nigrescentibus.

Habitat in Brasilia fluminensi ad Itatiaia. (Glaziou, n° 4668.)

Filix diffusa, heteroclita, amplissima, basi rachium lana fulva vestita.

ICON. : *Tab. XCVIII, fig. 1.*

Nous n'avons pas la plante entière; mais une frondule primaire qui mesure seule 66 centimètres, la correspondante devant avoir la même dimension donnerait une envergure de plus de 1 mètre 30 centim.; les frondules de deuxième ordre

sont au nombre de 15 paires, courbes, tantôt dirigées de bas en haut et tantôt de haut en bas; les plus longues mesurent 14-15 centim.; le pétiole primaire est un peu déprimé et porte, dans le sillon qui le parcourt, une ligne noirâtre.

Cette espèce est des plus curieuses et toutes ses parties sont dissimilaires; la forme générale des frondes, le nombre des rangées de sporothèces sur les segments tantôt entiers et tantôt crénelés, la direction des pinnules, tout est disharmonique. Le seul caractère spécifique d'après lequel il faut conclure est le port et l'extrémité des frondes, courbées fortement en zigzag. Nous avons décrit, sous le nom d'*Aspidium flexuosum* (*Crypt. vasc. Brés.*, p. 45, T. 46, fig. 2), une fougère ayant le même port.

24². HIRSUTA, Baker, *Polypod.*, p. 503, T. 64, fig. 1. — Pétioles fasciculés, abondamment couverts de poils étalés, laineux, d'un brun jaunâtre; frondes lancéolées, pyramidales, tripinnées, avec de longs poils brillants; pinnules au nombre de 15-20 paires, courtement pétiolées, les inférieures plus grandes; sporothèces assez petits, occupant le centre des segments fructifères; la souche est chargée de très-longs poils dressés, linéaires, articulés. Elle est signalée à Ouro Preto, province des Mines, par Freyreiss. Langsdorff et Martius l'ont aussi connue. Ce serait, suivant M. Baker (*l. c.*), le *Ph. lasiernos* de Mettenius, *Phegopt.* et *Aspidiées*, p. 28.

27*. DIVERGENS, Sw., *Syn. filic.*, p. 73, *sub polypodio;* F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 104. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 5276.) — Cette espèce n'a point été figurée; c'est l'une des plus divisées du genre et même du groupe des Polypodiées.

52. GONIOPTERIS, Presl., *Tent. pterid.*, p. 181.

5. HASTATA, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 107, T. 33, fig. 2. — Ce nom spécifique doit être changé en celui de *Bahiensis*, du lieu où elle a été récoltée. Nous avions déjà créé une espèce sous le nom de *hastata* (*Histoire des fougères des Antilles*, p. 65, T. 18, fig. 2), et l'une et l'autre sont distinctes.

NB. Ce genre qui ne diffère des *Phegopteris* que par l'union des nervilles basilaires, a cependant des espèces dont le port est très-spécial; quelques-unes portent des poils sur le sacculus, comme certains *Polypodium* trichomanoïdes. La Guadeloupe est très-riche en *Goniopteris* et nous en avons décrit ou figuré 17 espèces qui en proviennent. Voici les particularités spécifiques présentées par quelques-

unes d'entre elles: *G. hastata,* sacculus avec de longs poils simples et articulés; *G. leptocladia*, sacculus avec des poils bifurqués et des frondes portant des poils étoilés; *G. pyramidata,* pédicelle des sporanges portant un poil unique; *G. quadrangularis,* sacculus glabre, trois paires de nervilles conniventes; *G. Guadalupensis,* sacculus avec de nombreux poils courts, frondes s'élevant à plus d'un mètre, poils étoilés; *G. rostrata,* poils articulés sur le sacculus, sommet des frondes hasté. M. Baker réunit sous le nom de *diversifolium* toutes ces espèces, quoiqu'elles soient pour nous non-seulement différentes de forme, de port, de consistance, de taille, etc., mais encore qu'elles aient en elles des particularités organiques spéciales.

53. GONIOPHLEBIUM, Presl., *Tent. pterid.*, p. 186.

* *Polylépidées* (POLYPODIASTRUM).

5. HIRSUTISSIMUM, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 108. — (Rio-Janeiro, Glaziou, aux Orgaos, n° 3585, Rio-Janeiro, sans autre indication, n°s 3418 et 5293.) — Elle a le port des *Polypodium,* section des *P. vulgaris.* C'est l'une des fougères les plus richement vêtues qui existent, étant couverte très-abondamment d'écailles qui diffèrent de forme suivant leur situation; celles qui entourent les sporothèces sont peltées, avec un très-long poil qui les termine; elles forment un faux involucre et l'on a pu croire qu'il en existait un véritable; c'est ainsi que Sprengel en a pu faire un *Cyathea vestita;* il faut y regarder de près pour s'assurer de la vérité.

** *Oligolépidées.*

A. *Frondes pinnatifides.*

9. LATIPES, J. Sm., *Bot. mag.*, 1846; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 108. — (Rio-Janeiro, n° 5285 à Itatiaia, n°s 5286, 5288 au Corcovado, et 5387, en 1872, sans autre indication.) — Elle est molle, transparente, à nervilles extrêmement déliées; les écailles du rhizome sont presque orbiculaires et leur réseau est extrêmement robuste. — Cette plante varie par ses dimensions, par sa consistance, par sa transparence et par ses rangées de sporothèces uni- ou bisériales.

10. LÆTUM, Radd., *sub polypodio, Fil. Bras.*, p. 19, T. 28; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 109. — (Rio-Janeiro, à Saint-Louis, Glaziou, n° 4419, et Alto-Macahe,

n° 4420.) — Frondes glabres, translucides; nervilles déliées, flexueuses; segments souvent opposés, gibbeux du côté supérieur, acuminés, opposés dans la moitié inférieure de la fronde; écailles du rhizome épaisses, laissant voir leur réseau à une forte loupe. Dans les spécimens cités les sporothèces sont rarement bisériaux.

14. GRAMMATOIDES, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 110, T. 34, fig. 2. — La nervation et la forme grammatoïde des sporothèces sont les principaux caractères qui la distinguent des espèces précédentes.

14². DEMISSUM, F.

Frondibus pinnatifidis, usque ad mesonevron divisis, glabris, nervillis omnibus apice translucidis, petiolo glabro, tenui, stramineo; segmentis approximatis oblongis, obtusis, mucronulatis aut muticis, demissis, basi leviter contractis; sporotheciis 9-11 biserialibus, crassis, apicem non attingentibus; sporangiis rotundis, longo pedicello donatis, annulo crassissimo, 12 articulato, sporis magnis, lutescentibus, leviter reniformibus lævibusque.

Habitat in Brasilia fluminensi. (Glaziou.)

Filix aspectu Polypodii vulgaris, sed nervillis anastomosantibus, nervillis apice translucidis et segmentis omnibus demissis notata.

(Dimensions du *Polypodium vulgare.*)

Cette espèce, récoltée le 7 août 1872 sur le pic de la forteresse de Santa-Cruz, sera facile à reconnaître à ses segments, tous fortement inclinés vers le bas de la fronde. Le rhizome est gros et très-chargé d'écailles cancellaires, circonstance également caractéristique.

B. *Frondes pinnées.*

15. MENISCIFOLIUM, Langsd. et Fisch., *Icon filic.*, p. 11, T. 12, *sub polypodio;* F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 110. — (Rio-Janeiro, Praia-Grande, n° 5287, Glaziou, et 5289 par le même, sans autre indication.) — Les sporanges sont très-rapprochés, bisériaux et rubescents; ils déterminent sur la lame supérieure une légère boursouflure au centre de laquelle se montre un petit point proéminent rougeâtre. Les frondes adhèrent au rachis par une très-large surface qui leur donne souvent une apparence pinnatifide et non plus pinnée.

18. DISSIMILE, L., *Sp. pl.*, 1549, *sub polypodio;* F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 111. — (Rio-Janeiro, vallée de Bomfim, Glaziou, n° 4422?) — Ce spécimen, supérieur en taille à ses congénères, mesure 1 mètre 10 centim. dont le pétiole fait environ le tiers. Les sporothèces tachent la lame supérieure en noir; au centre de cette petite tache se trouve une plaque très-mince de carbonate de chaux; je compte au delà de 30 paires de pinnules, elles sont dressées, arquées et acuminées; les nervilles sont méniscioïdes et faciles à voir.

19. ALBO-PUNCTATUM, J. Sm., *Bot. mag.*, 1846, comp. 12; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 111. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 5397.) — Les points blancs qui ont fait donner à cette plante le nom spécifique qui la distingue sont dus à une sécrétion de carbonate de chaux à laquelle sont soumises un assez grand nombre de fougères.

22. ELATIUS, Th. Moore, *Ind.*, p. 389; *Crypt. vasc. Brés.*, p. 112. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 5292? spécimen tronqué.) — Gros rhizome écailleux, écailles fauves, lancéolées, pointues; pétiole noirâtre, raide, déprimé; frondules opaques, presque linéaires, amincies en pétiole, acuminées; lame supérieure poilue, poils blanchâtres, couchés; sporothèces unisériaux, au nombre de plus de 40 paires; l'anneau porte 40 articulations; les spores sont sous-réniformes, nus, jaunâtres et translucides.

54. CAMPYLONEVRON, Presl., *Tent. pterid.*, p. 189.

* *Frondes simples.*

B. *Nervation à deux courbes émettant une droite fructifère.*

4. LUCIDUM, Th. Moor., *Ind.*, p. 225; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 114. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 4666.) — Cette plante a une teinte jaunâtre très-prononcée; sa longueur totale est de 32-34 centim. sur 16-17 millim. de largeur, le pétiole est ailé par décurrence de la base des frondes qui sont notablement et irrégulièrement ridées sur leurs deux surfaces.

C. *Nervation à cinq ou six courbes.*

7. REPENS, Presl., *l. c.*, p. 190; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 115. — (Rio-Janeiro, Alto-Macahe, Glaziou, n°s 4427 et 4428, sans autre indication.) — Le rhizome ne dépasse pas la grosseur d'une plume de pigeon; il se charge de

radicelles atteignant parfois jusqu'à 40 centim. de longueur. Le n° 4427 porte jusqu'à 6 courbes et même, exceptionnellement, 7. — Plante flexible, transparente, à marge ondulée.

D. *Nervation à cinq ou six courbes.*

9. PHYLLITIDIS, Presl., *l. c.*, p. 190; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 115. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n°s 4425, 4664 et 5284.) — Cette espèce laisse voir ses nervilles par transparence; elles sont quelquefois pellucides à leur sommet.

G. *Nervation à dix ou douze courbes.*

13. LATUM, Th. Moor., *Ind.*, p. 225; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 116. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 4429.) — Très-grande espèce pouvant atteindre un mètre sur 7 centim. de largeur; elle est papyracée, transparente; les nervilles constituent 10-12 courbes, surmontées de deux droites; les lames transparentes sont décurrentes sur le pétiole qui est ailé dans toute son étendue. En voyant la faible grosseur du rhizome, on s'étonne de la dimension des frondes qu'il supporte.

NB. Nous sommes persuadé plus que jamais de l'impossibilité de trouver pour ce genre un caractère spécifique ailleurs que dans le nombre des courbes. La nervation est la charpente de la fronde, et en quelque sorte son squelette; le secours qu'on peut en tirer pour la distinction des espèces ne saurait rien avoir de vague ou d'incertain.

55. CRASPEDARIA, Lk., *Spec. filic.*, p. 117.

2. AURISETA, Radd., *Filic. Bras.*, p. 12, T. 23, fig. 1, *sub polypodio;* F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 118. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 5281.) — Elle forme sur les vieux troncs des touffes inextricables. Les frondes fertiles cachent les sporothèces sous une épaisse couche d'écailles piliformes, dorées; les rhizomes s'étendent en serpentant au loin; ils sont filiformes.

† 4². CAMPTOCARPA, F.

Frondibus dissimilaribus, sterilibus ovoideis, acutis, basi leviter cordatis, breve petiolatis, pilis squamosis ample vestitis; fertilibus oblongis, pilis rufis, longissimis obsitis, apice ad basim deflexis, tunc aspectu similibus annulis; sporotheciis subconfluentibus; sporangiis crassis, annulo 30-36 articu-

lato; sporis crassissimis, ovoideis, opacis, papillatis, papillis rotundis, perfacile labentibus.

Habitat in Brasilia fluminensi. (Tijuca, Glaziou, n° 5280.)

Filix parvula, rhizomate filiformi, radiculas numerosas emittente; frondibus fertilibus curvatis notata.

Icon. : *Tab. XCVIII, fig. 1.*

(Frondes stériles, 9-10 millim. sur 7 millim. de largeur; les fertiles un peu plus longues, ainsi que le pétiole.)

Dans cette curieuse espèce, couverte dans toutes ses parties de poils roux, plus ou moins longs, linéaires, à marge entière ou dentée, les frondes sont attachées sur un rhizome filiforme, portant d'espace en espace de courtes radicelles, flexueuses et noirâtres; le caractère spécifique le plus saillant consiste dans la courbure normale de toutes les frondes fertiles, dont le sommet se recourbe vers le pétiole, ne laissant voir qu'une très-petite ouverture annulaire. Ce fait qui n'existe point ailleurs est exprimé par le nom spécifique *camptocarpa*, fruit recourbé.

7. crispata, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 119, T. 36, fig. 2. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n°s 4423, 5282 à Gavia, et 5283 à Itatiaia.) — Elle varie par des frondes stériles plus ou moins obtuses; le rhizome est rameux.

8. grandis, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 119, T. 37, fig. 2. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 4424.) — Peut-être cette plante serait-elle mieux placée dans les *Drynaria* à côté des *D. iteophylla*, *lycopodioides* et *serpens*. La dissimilitude des frondes fertiles et stériles n'existe que dans les proportions et non dans la forme. La nervation est très-élégante.

NB. Le *Craspedaria serpens*, Sw., *sub polypodio*, est une fougère de la flore des Antilles, qui aurait été trouvée à Rio-Janeiro par Sello; elle est encore mal définie spécifiquement.

57. DRYNARIA, Bory, *Dict. class.*, art. *Polypodium.*

1. percussa, Cav., *sub polypodio;* F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 120. — Rio-Janeiro, à la Pedra Bonita, Glaziou, n° 5278, au Corcovado, n° 4665; un n° 5277 recueilli à Tijuca est une très-notable variété *Caudata*, à forme oblongue et non linéaire; la fronde se termine par une très-longue pointe linéaire, très-effilée au sommet, mesurant 5-7 centim. sur une fronde de 40 centim. de hauteur et 5-6 de largeur.

1*². EXUL, Metten. *ex* Kuhn, *Linn.*, XXXVI, p. 138. — (Campos et Victoria, prov. Spiritu Sancto, Sello.) — Souches rampantes; frondes simples, presque entières, oblongues-lancéolées, à peine pétiolées, nues sur les deux faces; aréoles immergées, appendiculées; sporothèces arrondis, superficiels, 6-7 par série, situés entre le mésonèvre et la marge (Baker). N. V.

4. LEPIDOTA, Schlecht., *Adumbr.*, p. 17, T. 8; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 121. — (Rio-Janeiro à Itatiaia, Glaziou, n° 5279.) — Quelques botanistes ont conservé à cette espèce le nom spécifique de *macrocarpa*, et il est des plus mérités; les sporothèces sont au nombre des plus gros qui existent dans les polypodiées et nous en avons vu qui mesurent jusqu'à 7 et 8 millim. de diamètre. Nous recevons un spécimen sous le n° 5398 de forme plus petite.

5*². LINDBERGII, Metten., *Mssc.;* Hook. et Bauer, *Syn. filic.*, p. 358. — (Minas Geraes, arboricole, forêts vierges, Lindberg, n° 576, Lagoa Sancta; même localité, par Warming.) — Rhizome longuement rampant, frondes simples, sessiles, allongées, lancéolées, entières, papyracées, couvertes, surtout près du mésonèvre, de petites écailles linéaires; nervilles grêles, immergées; aréoles appendiculées; sporothèces unisériaux, plus rapprochés du mésonèvre que de la marge, superficiels et au nombre de 20-30 par série (Baker). N. V.

6. ITEOPHYLLA, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 121. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n°s 4426 et 4663.) — Les tiges sont ligneuses, un peu déprimées, chargées d'écailles fauves, appliquées et caduques, on voit sur leur trajet des gemmes globuleux; les frondes jaunissent par la dessiccation; les sporothèces sont profondément immergés et boursouflent la lame supérieure à leur point de développement. Le nom spécifique est destiné à consacrer la ressemblance des frondes avec la feuille du saule.

ICON. : *Tab. XCV, fig. 4.*

59. HETEROPTERIS, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 123.

1. DORYOPTERIS, F., *l. c.*, T. 10, fig. 2. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 4388.) — La marge des frondes est dentée et à dents irrégulières; quelquefois même presque déchirée; elle ne se réfléchit pas sur les sporothèces.

XVII. CYCLODIÉES.

60. POLYSTICHUM, Roth., *Tentam. Fl. german.*, III, p. 69 (reduct.).

I. *EUPOLYSTICHUM.*

§ 1. *Mutiques* (TECTARIA, Cavan.).

1. CORIACEUM, Schott., 2e *Fasc.*, T. 4; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 124. — (Rio-Janeiro, à Itatiaia, Glaziou, n° 5275.) — Plante vigoureuse, extrêmement féconde; sporothèces souvent confluents et couvrant la fronde de grandes plaques brunâtres, les indusium sont des plus caducs et les spores en nombre immense, papilleux et noirâtres.

† 2². QUADRANGULARE, F.

Frondibus bipinnatis, in ambitu oblongis, apice obtusiusculis, crassis, opacis, glabris, petiolo rachique quadrangularibus, squamosissimis, squamis rufis, lanceolatis, longe acuminatis; frondulis oblongis, apice obtusiusculis, inferioribus suboppositis, lobulis ellipticis, crenatis; sporotheciis approximatis, 4-8 per seriem, sed non confluentibus, indusio persistente; sporangiis rotundis, annulo 16 articulato; sporis atris, papillatis, reniformibus curvatisque.

Habitat in Brasilia fluminensi, ad scaturigines rivi vulgo dicti Rio Soberbo, intra surculos graminarum. (Glaziou, n° 4430.)

Filix elegans, rigida, stipite quadrangulari, squamis rufis obsita, rigida, crassa et opaca; frondulis inferioribus conformibus.

ICON. : *Tab. XCIX, fig. 1.*

(Longueur des frondes, 89-95 centim.; frondules centrales, 9-11 centim., les fructifères un peu plus petites; les lobules mesurent à la base 2 à 5 centim. sur 5 millim. de largeur.)

Cette espèce est caractérisée par des pétioles et des rachis quadrangulaires, ou plutôt aplatis, abondamment couverts d'écailles rousses, lancéolées et longuement acuminées. Les lobules sont glabres sur les deux faces, de consistance raide, opaques, obtus et très-élégamment crénelés. On trouve dans le pétiole plusieurs faisceaux vasculaires inégalement ponctiformes.

§ 2. *Aristées.*

† 4². ROCHALEANUM, Glaz., *in litter.*

Frondibus bipinnatis, glabris, longe acuminatis, lanceolatis, petiolo longo, flexuoso, depresso, late canaliculato, squamis biformibus, sublinearibus aut ample ovalibus, fuscescentibus; frondulis primariis breviusculis, lanceolatis, assurgentibus, curvatis, apice obtusis, lobulis subrotundis, basi cuneatis, marginibus undulato-dentatis, dentibus brevissime aculeatis; sporotheciis 4-6 per seriem, rufescentibus; indusio crasso perfacile caduco; sporangiis oblongis, annulo lato, 16 articulato; sporis irregulariter rotundis, papillatis.

Habitat in Brasilia fluminensi ad Itatiaia, altitudo 2200^{m}. (Glaziou, n° 5272.)

Filix aspectu ad species Europæanas tendens.

ICON. : *Tab. XCIX, fig. 2.*

(Longueur des frondes, 36-40; des frondules, 4-5 centim.; des lobules, 6-7 millim.; les pétioles égalent les frondes.)

Les frondules sont très-rapprochées les unes des autres; le sommet des frondes, très-allongé, n'est que simplement pinnatifide; les dernières frondules sont un peu plus petites que les autres; toutes sont courbes et dressées; le pétiole est largement sillonné dans toute sa longueur; le rachis porte quelques écailles; le rhizome est couvert de larges écailles ovoïdes, très-brunes et comme charbonnées. Les faisceaux vasculaires sont ponctiformes et unisériaux.

II. *PHEGOPTEROIDES.*

5. LANOSUM, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 126. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 4467, et par le même à Thérésopolis, n° 4667.) — Au moyen des auricules, largement développées, les sporothèces ont une apparence bisériale; les lobes sont amplement développés et d'un beau vert après dessiccation. Les écailles des pétioles sont très-larges et d'une belle couleur dorée.

8. GIGANTEUM, F., *l. c.*, p. 127, T. 38, fig. 2. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 5274.) — Malgré le nom spécifique donné, il est des espèces qui rivalisent de longueur avec elle; les écailles de la base des pétioles sont rubanées, étroites et crispées.

10. PLATYLEPIS, F., *l. c.*, p. 129, T. 40, fig. 1. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 5273.) — Le pétiole est un peu tordu et fortement sillonné, il atteint la grosseur du doigt d'un enfant et porte à la base des écailles largement ovoïdes, luisantes, ayant plus de 2 centim. de longueur sur 4 millim. de largeur.

60². PHANEROPHLEBIA, Presl., *Emend.;* F.; *Gen. filic.*, p. 281, T. XXII B, fig. 2.

Sporothèces orbiculaires, bisériaux; indusium pelté; frondes pinnées, nervilles dichotomes, atteignant la marge et donnant lieu à des dents raides et courtes. — Genre mexicain.

†1. AURITA, F.

Frondibus pinnatis, oblongis, apice decrescentibus, subopacis, petiolo longiculo, ad basim squamas latas, fuscas, ovatas, ferente, rachi squamoso, squamis lutescentibus, acuminatis angustioribusque; frondulis lanceolatis, leviter furcatis, apice auricula magna, aliquando soluta, instructo; sporotheciis centralibus, subbiserialibus; indusiis delapsis; sporangiis rotundis, annulo 14 articulato; sporis crassis, rotundatis, nigrescentibus.

Habitat in Brasilia fluminensi ad scaturigines riparum fluvii vulgo dicti Rio Soberbo. (Glaziou, n° 4431.)

Filix statura mediocri, marginibus crenatis, crenis sæpe breviter apice aculeatis; nervillis liberis.

ICON.: *Tab. C, fig. 1.*

(Longueur, 65 centim. sur 14 d'envergure moyenne; les frondules mesurent 8 centim. sur 10-12 millim. de largeur.)

L'auricule des frondules est dressée, très-grande, nettement dessinée avec une très-petite arête; elle tend à s'isoler de son attache et se termine par un petit mucron raide et délié; elle est facile à reconnaître.

60³. HEMICARDION, F., *Gen. filic.*, p. 282, T. 22 B, fig. 1.

1. NEPHROLEPIS, F., *l. c.; Aspidium semicordatum*, SW., *Syn. filic.*, p. 45; Willd., *Filic.*, p. 222. — (Haut-Amazone, à l'embouchure du Solimoës dans le fleuve Amazone, Spruce, n° 1610, et par Martius, dans la province de Para.) — Cette fougère, dont la patrie est assez étendue, est remarquable par la base des frondules, qui est auriculée et comme semi-cordée; le lobule supérieur s'ap-

plique sur le rachis, mais non si complétement qu'il ne laisse libre une portion de cette base qui détermine sur la totalité des frondes une sorte d'ouverture arrondie, il en résulte un aspect singulier que l'on retrouve dans toutes les espèces.

60[4]. CYCLODIUM, Presl., *Tentam. pterid.*, p. 85.

1. MENISCIOIDES, Presl., *l. c.*, p. 85, T. 2, fig. 20, *conditio nervationis.* — (Indiquée dans le Brésil méridional et central, dans le Para, le Piauhy, à Bahia.) — Très-grande fougère à nervilles anastomosées, aréoles non appendiculées; elle est pinnée, coriace et grossièrement dentée. Les sporothèces sont bisériaux. (N. V. *ex Brasilia.*)

XVIII. ASPIDIÉES.

63. ASPIDIUM, Sw., *Syn. filic.*, p. 51, emend.

* *Indusium glabre* (frondes pinnées-pinnatifides).

1. RIVULORUM, Radd., *Filic. Bras.*, p. 23, T. 35, non Kze.; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 131. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 5259.) — Forme plus dilatée que le spécimen figuré par Raddi dans la planche citée plus haut. Elle appartient aux espèces dont les frondes se dégradent en dimension vers le bas, pour ne laisser sur le pétiole que des rudiments informes de frondes. La souche est dressée.

† 4[2]. PLATYRACHIS, F.

Frondibus elatis, pinnato-pinnatifidis, glabris, pellucidis, petiolo crasso, perfacile depresso, junciformi, helveolo, rachi planiculo, pilos breves vestito; pinnellis patulis, lanceolatis, sessilibus, apice longe serratis, mesonevro superne canaliculato, hirto, segmentis oblongis, subciliatis, costam non attingentibus, sporotheciis centralibus, 5-6 per seriem, cum aliquis squamis immixtis; indusio glabrescente; sporangiis rotundatis, annulo 14 articulato; sporis globosis, fuscis, papillatis, in juventute lutescentibus.

Habitat in Brasilia fluminensi, ad Itatiaia. (Glaziou, n° 5261.)

Filix maxima, lanceolata; petiolo rachique flaccidis notata.

ICON.: *Tab. C, fig. 2.*

(Longueur, 1 mètre 80 centim.; pinnules centrales, 17-18 centim. sur 16-17 millim. de largeur; le pétiole est de la grosseur d'une plume de cygne.)

Très-belle espèce, qui rivalise en dimensions avec les plus grandes feuilles de nos plantes herbacées; elle est remarquable par ses pétioles lisses ainsi que par ses rachis, très-riches en tissu cellulaire, très-mou et qui se dessèche facilement pour laisser l'intérieur fistuleux; le pétiole, notamment, ressemble à des tiges de gros *scirpus* desséchés; il ne résiste pas à la compression.

12. PARALLELOGRAMMUM, Kze., *Linn.*, XIII, p. 146; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 135. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 4432.) — Ce n'est pas là l'*A. Filix-mas.*, L., d'Europe; les frondules sont alternes vers le haut seulement et très-exactement opposées dans le reste de la fronde; les segments eux-mêmes ont cette disposition; les rachis et les pétioles sont très-abondamment chargés de belles écailles lancéolées, acuminées, d'un rouge pâle; elles donnent à la plante une très-belle apparence, rehaussée par les sporothèces, très-régulièrement ordonnés et d'un rouge de brique très-intense.

***Indusium villeux.*

31. PATENS, Radd., *Filic. Bras.*, p. 32, T. 48; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 143. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 4669.) — Les sporothèces sont marginaux et n'atteignent pas le sommet du segment; les frondules sessiles portent à la base des segments parfois pinnatifides.

32. CONSPERSUM, Schrad., *Gœtt. Gel. Anz.*, 1864, p. 869; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 143. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 5263?) — Elle est légèrement velue et l'indusium consiste en un petit pénicille de poils blancs, dressés; nous ne la possédons pas entière.

†39². TIJUCENSE, F.

Frondibus pinnato-pinnatifidis, oblongis; petiolo rachique rufis, canaliculatis, squamas lineares ferentibus, pinnellis oblongis, infimis majoribus, petiolatis, segmentis inferioribus minoribus, superioribus basi truncatis, omnibus pilosulis; segmentis oblongis, obtusissimis, leviter curvatis, conniventibus, margine parce ciliatis, nervillis simplicibus, marginem attingentibus; sporotheciis parvis, centralibus; indusio glabro, parvulo; sporangiis rotundis parvis, pedicello crasso, noduloso; annulo 12-14 articulato; sporis fuscis, subreniformibus, papillosis, papillis crassis.

Habitat in Brasilia fluminensi. (Glaziou, n° 5262.) [Itatiaia.]

Filix glabrescens, flexibilis, pellucida, nervillis simplicibus; rachi superne tomentoso; sporotheciis punctiformibus.

ICON. : *Tab. CII.*

(Longueur, 75 centim.; pinnules inférieures, 16-18 centim. sur 4 de largeur.)

Cette plante conserve la couleur verte après dessiccation; elle est assez délicate, souple et transparente; les segments n'atteignent pas le mésonèvre; il est digne de remarque de trouver la base des frondules supérieures tronquée, tandis que chez les inférieures elle se termine par réduction des segments, ce qui influe sur la forme, les unes étant lancéolées et les dernières obovées.

41*2. PUBESCENS, Radd., *Fil. Bras.*, p. 23, T. 34, *sub polypodio.* — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 4434, à la source du Rio-Soberbo, sommet des Orgues.) — Cette espèce a un aspect européen; les frondules inférieures se dégradent de forme; les sporothèces sont marginaux; l'indusium est très-difficile à voir. Cette espèce mesure de 40 à 45 centim. dont le pétiole fait le tiers; les frondules atteignent à peine 7 centim. de longueur sur 15 millim. de largeur.

*** *Indusium difficile à constater.*

41*3. ERIOSORUS, F.

Frondibus pinnato-pinnatifidis, ambitu lanceolatis, longe petiolatis, decrescentibus, pilosis, pilis brevibus hirtis; petiolo longissimo, sulcato, nudo, inferne fusco, superne helveolo, rachi quadrangulari ad apicem attenuato; frondulis pinnatifidis, lanceolatis, sessilibus, acuminatis, patulis, imis minoribus, nunquam deformibus, aliquandoque oppositis, segmentis obtusis, margine ciliatis, siccitate sæpe inflexis; nervillis simplicibus, sporotheciis circa marginem evolventibus, penicillum pilorum ad instar indusii sporangias vestiens; sporis atris subreniformibus.

Habitat in Brasilia fluminensi. (Glaziou, n°s 5264 et 5265.)

Filix elata, cinerea, petiolo depresso, sulcato et rachibus quadrangularibus.

ICON. : *Tab. CI.*

(Longueur, 1 mètre, dont le pétiole fait la moitié; envergure au centre, 10-12 centim.; segments, au nombre d'une trentaine, 9-10 millim., séparés par un entre-nœud de 2 centim. environ.)

Les pinnules sont ouvertes presque à angle droit, lancéolées, sessiles, acuminées, multipartites, velues, conservant leurs dimensions et ne se dégradant nullement comme dans l'*A. rivulorum*, de Raddi, auquel ressemble notre plante; cependant on trouve sur le pétiole et très-distancés, deux ou trois rudiments de pinnules; le petit pénicille de poils qui tient lieu d'indusium (?) n'est point indiqué dans la plante de Raddi, non plus que la forme quadrangulaire du rachis, dans sa partie supérieure.

**** *Frondes décomposées.*

42. GRACILIPES, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 146, T. 49, fig. 2. — (Rio-Janeiro, à Itatiaia, Glaziou, n°s 4436, 5268, 5269, 5270.) — Cette espèce est fort élégante; les derniers segments sont dentés et la dent se prolonge en une courte arête. Nous avons constaté la présence de l'indusium dans les n°s 4436 et 5270; les n°s 5268 et 5269 ne nous ont point dévoilé le leur; le n° 5270 a des segments plus élargis et le n° 5268, au contraire, en a de fort rétrécis, circonstance qui en fait une variété, *strigosa*. — Il paraît que cette fougère est assez commune au Brésil.

44. DENTICULATUM, Sw., *Syn. filic.*, p. 57; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 147. — Cette espèce très-voisine de l'*A. gracilipes*, F., n'en est peut-être même qu'une simple forme.

NB. Ce genre donne lieu aux observations suivantes, déduites du dernier ouvrage de M. Baker (*Polypodiaceæ Brasilianæ*).

Espèce 3, n° 2364. A. HELVEOLUM, F. Ce numéro a été rapporté à l'*A. oligocarpon* de Willd. (*Fil.*, p. 201), duquel il est dit: *laciniis... ciliatis... venis hirtis*, tandis que l'*A. helveolum*, F., *l. c.*, p. 132, T. 42, fig. 2, qui est aussi notre n° 2364, est glabre dans toutes ses parties.

Espèce 10, n°s 390 et 2367. A. TENERRIMUM, F. Ces numéros sont devenus pour nous l'*A. tenerrimum*, *l. c.*, p. 134, et pour M. Baker l'*A. Sprengelii*. On trouve dans la synonymie notre *A. Rivoirei* (*oochlamys*) qui ne peut en aucune sorte y figurer; dimensions, port, nature des tissus, tout est différent.

Espèce 16, n° 2369. A. ERIOCAULON, F. Se rapporte à notre *A. eriocaulon, l. c.*, p. 136, décrit plus tard par M. Baker, *Polyp.*, p. 473, sous le nom d'*A. ramentaceum, sub lastrea.*

Espèce 17, n°s 963, 1680, 2370. A. AMAUROLEPIS, F., *l. c.*, p. 137, T. 44, fig. 2, serait l'*A. Caripense*, Hook., *sub nephrodio;* le *Polypodium submarginale*, Langsd. et Fisch., *Fil.*, T. 13. — La figure que nous avons donnée reproduit une plante différente de celle citée de Langsdorff et Fischer, *l. c.*

Espèce 19, n° 2359. A. NEPHRODIOIDES, F., *l. c.*, p. 138, T. 46, fig. 1. *A. patens*, Sw., *Syn. filic.*, p. 49; forme plus étroite et moins étalée.

Espèce 21, n° 2458. A. FLEXUOSUM, F., *l. c.*, p. 138, T. 46, fig. 2. *Nephrodium flexuosum*, Baker, *l. c.*, p. 483.

Espèce 22, n° 2393. A. BIFORME, F., *l. c.*, p. 139, notre espèce qui est seulement bipinnée, ne saurait être l'*A. amplissimum*, Baker, lequel est 4-5 fois pinnatifide.

Espèce 26, n° 1782. A. PHÆOCHLAMYS, F., *l. c.*, p. 140, T. 47, fig. 2. — Cette espèce très-distincte ne saurait être rapprochée ni de l'*A. amplissimum*, Baker., ni de l'*A. latissimum*, F.

Espèce 27, n° 2391. A. RAMOSUM, F., *l. c.*, p. 141, T. 47, fig. 1. L'une des espèces les plus distinctes du genre, sans aucun rapport avec le n° 2391 de M. Baker, qui voit en lui l'*A. amplissimum.*

Espèce 28, n° 979. A. LATISSIMUM, F., *l. c.*, p. 142, T. 48, fig. 2. Ajoutez : *partim ;* sous le nom d'*amplissimum*, M. Baker, *l. c.*, p. 485, réunit à sa plante nos n°s 979 et 2389; et les n°s 393, 967, 1781, 2350 et 2394 au *Phegopteris subincisa*, Willd., *sub polypodio.* — Au n^d 979, qui se rapporte à l'*A. consobrinum, l. c.*, p. 140, il convient aussi d'ajouter le mot *partim.*

M. Baker indique comme brésiliennes les espèces suivantes :

1. ASPIDIUM (*Nephrodium*) SANCTI GABRIELI, Baker., *Polyp. Bras.*, p. 469; Hook., *Spec. filic.*, IV, 333. — (Haut-Amazone, près le fleuve Rio-Negro, Spruce, n° 2153.) — Frondes bipinnées, papyracées; nervilles simples, formant 3-4 séries.

2. SUBOBLIQUATUM, Baker., *in Synop. filic.*, p. 261. — (Para, près le fleuve Acara, Spruce, n° 36.) — Rhizome rampant; frondes glabres bipinnées, à segments linéaires oblongs, très-entiers, à indusium glabre.

3. A. ALSOPHILACEUM, Kze., *in Regensb. Flor.*, 1837, I, 320. — (Près de Para, prov. de Saint-Sébastien et au Corcovado, Gardn., n° 16.) — Frondes ovales-oblongues, pinnées, herbacées, segments laissant entre eux un étroit sinus, nervures légèrement poilues, sporothèces petits. C'est une grande plante. (N. V.)

4. A. (*Nephrodium*) PALUSTRE, Baker., *in Syn. filic.*, p. 270. — (Minas Geraes, Lindberg, n° 633.) — Frondes herbacées, glabres, oblongues-lancéolées, bipinnatifides, atténuées au sommet et à la base; 30 paires environ de pinnules, sporothèces médians. C'est une grande plante.

5. A. PTARMICA, Kze., *Mss.*, Metten., *Phegopt.* et *Aspid.*, p. 80. — (Rio-Janeiro, Serra d'Estrella et Serra os Orgaos, Gardn., n° 113.) — Frondes bipinnées, cartacéo-herbacées, glabriuscules, oblongues-lancéolées, atténuées au sommet et à la base; sporothèces couvrant tout le segment fructifère à la maturité; indusium glabre. Plante de médiocre grandeur.

6. A. PATULUM, Sw., *Stockh. Vet. Akad. handl.*, 1817, p. 64. — (Prov. des Mines, Rio-Janeiro, Serra da Piedade, Regn. III, 1452.) — Ce serait là l'*A. Mexicanum*, Presl., *sub Lastrea.* (Cfr., F., *Catalog. méth. foug. mexic.*, p. 30.)

7. A. ACUTUM (*Lastrea*), Hook., *Sp. filic.*, IV, p. 147, T. 271. — (Brésil, entre Campos et Victoria: Sello.) — Frondes tripinnatifides; sporothèces cordiformes, glabres; segments ligulés, lancéolés, denticulés, aristés au sommet; très-grande plante de consistance coriace. Semble très-voisine de notre *A. phæochlamys*, *Crypt. vasc. Brés.*, p. 140, T. 47, fig. 2.

8. A. MACROSTEGIUM, Hook., *Spec. filic.*, IV, p. 148, *sub nephrodio.* — (Près du Rio-Uapes, tributaire de l'Amazone, Spruce, n° 2545.) — Croît par touffes; le stipe a près d'un mètre; la fronde 750 centimètres; elle est coriace, plusieurs fois pinnée; l'indusium est glabre.

63². LEPIDONEVRON, F., *Gen. filic.*, p. 301, Tab. XXIII C, fig. 1.

3. RUFESCENS, F., *l. c.; Aspidium rufescens*, Schrad., *Gœtt. Gel. Anz.*, 1824, p. 629; *A. paludosum*, Radd., *Fil. Bras.*, p. 29, T. 44. — (Para, Spruce, n°s 45 et 322, *ex* Baker, Goyaz, Bahia, Rio-Janeiro, Glaziou.) — Frondes pinnées, médiocrement velues, lancéolées, inégalement crénelées, faiblement auriculées vers le haut; frondules alternes lancéolées-acuminées, marge

bidentée à dents écartées; sporothèces petits, se développant près de la marge, au nombre de 30 environ par rangée; ils sont rufescents.

NB. Le caractère différentiel qui sépare le genre *Lepidonevron* du genre *Nephrolepis,* est tiré de l'indusium fixé au centre et libre dans tout son pourtour dans le premier de ces genres et largement attaché à la base dans le second; l'un très-facilement caduc et l'autre persistant. (Cfr. dans le *Genera* les figures citées Tab. 23 C, fig. 1 et 2.)

66. OLEANDRA, Cav., *Præl.*, n° 623.

2*. HIRTA, Braken., *Fil. Un. St. exped.*, 214. — (Rio-Janeiro, Brakenridge.) — Stipes grêles, raides, portant une articulation au centre. (Elle demande à être mieux connue.)

67. NEPHRODIUM, Rich., *in Mich. Fl. Amer. bor.*, II, p. 266.

1. MOLLE, Schott., *Gen. filic*, *cum icone.* — L'indusium est représenté par Schott avec de longs poils sur le sacculus.

2. POHLIANUM, Presl., *Tentam. pterid.*, p. 81; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 148. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 5260.) — Belle espèce, des plus distinctes et cependant chargée d'une lourde synonymie, tour à tour *Aspidium, Nephrodium, Polystichum*, *Pteris, Polypodium, Goniopteris.* — Notre spécimen mesure 1 mètre 30 centim.

XXI. NÉPHROLÉPIDÉES.

70. NEPHROLEPIS, Schott., *Gen. filic.;* F., *Gen. filic.*, p. 319, T. 23, fig. 2.

1. EXALTATA, Schott., *l. c.;* F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 150. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 5258.) — Très-remarquable par la courbure des frondules et par des marges très-ondulées. Très-bien caractérisée spécifiquement par le nom de *undulata*, J. Sm.

6*. TUBEROSA, Presl., *Tent. pterid.*, p. 79; F., *Gen. fil.*, p. 319, T. 25, fig. 1. — (Rio-Janeiro.) — Frondes pinnées; frondules oblongues-obtuses, dentées au

sommet, cordiformes, sessiles, amplexicaules, auriculées à la base; stipe et rachis écailleux. — Espèce entre toutes remarquable par le tubercule qu'elle produit, particularité sans autre exemple à nous connu.

7*. BISERRATA, Sw., *in Schrad. Journ.*, 1800, II, 52, *sub aspidio.* — (Haut-Amazone et Para, par Spruce, n° 1292, *teste* Baker.) — Frondes pinnées, à frondules acuminées, doublement et obtusement dentées, auriculées; sporothèces marginaux, stipes glabres.

XX. DAVALLIÉES.

72. MICROLEPIA, Presl., *Tentam. pterid.*, p. 124.

1. FLUMINENSIS, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 151, T. 51, fig. 1. — (Rio-Janeiro, à Itatiaia, Glaziou, n°s 5256, 5257 et 5396 [1872].) — Rachis villeux et non tomenteux. Elle rentre dans le genre *Dennstædtia*, de Bernhardi, *in Schrad. Journ.*, 1800, II, p. 124, T. 1, fig. 3. — Nous ne sommes pas très-assuré de la validité de cette espèce, qui pourrait n'être qu'une forme du *Dicksonia cicutaria* des auteurs.

73. DAVALLIA, Sm., Sw., *Syn. filic.*, p 5.

2*. SCHIMPERI, Hook., *Spec. filic.*, I, p. 193, T. 50 R; F., *Gen. filic.*, p. 328, T. 27 C, fig. 4; *Asplenium, Microlepia, Loxoscaphe, auct. var.*, Baker, *Fil. Bras.*, p. 345, T. 21, fig. 13 et 14; T. 41, fig. 11. (*Davallia thecigera*, Humb., *Nov. gen.*, I, p. 23 [1815].) — (Province Saint-Sébastien, Serra os Orgaos, Gardner, n° 200.) — Frondes coriaces, glabres, oblongues-lancéolées, bi-tri-pinnatifides; pinnules longuement pétiolées, uninervées; à segments étroitement linéaires, simples, bi- ou trifurquées, sporothèces marginaux, solitaires, latéraux et surmontés d'un appendice cornu; indusium bombé, s'ouvrant par le sommet. (N. V. *ex Brasilia orta.*)

3*. SPRUCEI, Hook., *in* Hook. et Baker, *Syn. filic.*, p. 108. — (S. Carlos, bords du Rio-Negro, dans le Haut-Amazone, Spruce, n° 2988.) — Rhizome brièvement rampant, avec des pétioles un peu écartés, raides, nus, luisants, gramineux; frondes coriaces, oblongues-lancéolées, bipinnées, à pinnules

linéaires, ligulées, étalées, parallèles, pinnelles deltoïdes atteignant le rachis, segments linéaires aigus; nervilles solitaires; sporothèces terminaux, autant que de segments, presque aussi larges que hauts. (Baker, *Fil. Bras.*, p. 346.) [N. V.]

74. STENOLOMA, F., *Gen. filic.*, p. 330, T. 27[2] A.

2. Glaziovii, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 153, T. 52, fig. 2 et non fig. 1, comme il est indiqué planche citée. — (Rio-Janeiro, n°s 5254 et 5255, forme naine.) — C'est le *Davallia bifida*, Klfss., l'*Odontoloma bifidum*, Metten., l'*Acrophorus bifidus* de Th. Moore. La plupart des espèces de ce genre portent des segments bifides.

Nous avons reçu sous le n° 5255 une forme naine de cette plante. Si ces proportions n'étaient pas une réduction du type normal, il faudrait la regarder comme une variété ou même comme une espèce.

XXI. DICKSONIÉES.

75. DICKSONIA, L'herit., *Sert. anglic.*, p. 30.

5. apiifolia, Sw., *Syn. filic.*, p. 137. — (Rio-Janeiro à Itatiaia, Glaziou, n°s 4427 et 5253.) — Plante très-ample, pluripinnée, partitions terminées en pointe dentée. Le pétiole est extrêmement robuste, il est entouré à la base par un coussinet d'écailles dorées ou plutôt par de longs poils strigilleux, étranglés d'espace en espace. Il est largement canaliculé et montre, sur le trajet de ce canal, une suite de petites protubérances régulièrement espacées, assises sur une ligne proéminente très-apparente. On les retrouve sur les principales divisions du rachis.

76. BALANTIUM, Presl., *Tent. pterid.*, p. 134.

1. Sellowianum, Presl., *l. c.*; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 155; *Dicksonia Sellowiana*, Hook., *Spec. filic.*, I, p. 67, T. 22 B. — (Rio-Janeiro, Alto-Macahe, Glaziou, n° 4438.) — C'est à cette plante qu'il faut rapporter les n°s 1787 et 2281, récoltés à Saint-Louis, et le n° 2824, de la Serra do Couto, tous provenant

de M. Glaziou. Les longs poils dorés et intestiniformes qui chargent la base des pétioles lui donnent un caractère remarquable de beauté.

XXII. ALSOPHILÉES.

77. ALSOPHILA, R. Br., *Prodr. Fl. N. Holl.*

6. SCROBICULATA, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 157, T. 53, fig. 1. — (Rio-Janeiro, n° 5249, et à Itatiaia, n° 5250.) — Toute la plante est velue et grisâtre d'aspect; les écailles sont de couleur fauve, luisantes, lancéolées et assez raides.

10. APERTA, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 158, T. 54, fig. 2, et *A. Glaziovii*, F., *l. c.*, p. 160, T. 55, fig. 2, très-distincts l'un et l'autre; le premier avec des pétioles armés de longues épines, portant à la base de belles et longues écailles blanches, glumacées; le second avec des pétioles inermes dans presque toute leur étendue, et des écailles roussâtres et luisantes.

20. LEPTOCLADIA, F., *l. c.*, p. 161, T. 55, fig. 1. — Cette espèce, fondée sur le n° 2299 de M. Glaziou, est rapportée par M. Baker à l'*A. villosa*, Desv., qui serait l'*A. rigidula* de Martius; la comparaison de notre planche citée et de la planche 51 des icones de Martius exclut tout rapprochement.

Même dissimilitude entre l'*A. phalerata*, Mart., et l'*A. Corcovadensis*, F.; entre l'*A. procera*, Klfss., Mart., *Icon. crypt.*, T. 40, et les *A. dichromatolepis*, F., *Ludoviciana*, F., *l. c.*, p. 169, T. 60, fig. 2; entre l'*A. leucolepis*, Mart., *l. c.*, T. 46, l'*A. glumacea*, F., *l. c.*, p. 170, T. 61, fig. 2, et l'*A. nigrescens*, F., *l. c.*, p. 170, T. 54, fig. 1. Voy. Baker, *Polyp. Brasil.*, p. 318-332.

22. CORCOVADENSIS, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 163, T. 56, fig. 2. — (Rio-Janeiro à Tijuca, Glaziou, n° 5248.) — Les sporothèces forment des groupes serrés; ce n'est que vers le sommet des frondes que les segments ne portent qu'un sporothèce.

24. DICHROMATOLEPIS, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 164, T. 57, fig. 2. — (Rio-Janeiro à Itatiaia, Glaziou, n° 5351.) — Les sporanges, lâchement unies, sont attachées sur un petit réceptacle bombé. Le pétiole seul est épineux et les épines sont cachées sous les écailles.

25. IMPRESSA, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 165, T. 58, fig. 1. — (Rio-Janeiro, à Tijuca, Glaziou, n° 5247.) — Ce spécimen nous a permis de voir que les pétioles de cette belle espèce sont épineux, à épines courtes, dressées et parfois en crochet vers leur partie inférieure; par la dessiccation elle prend une couleur jaune assez prononcée.

† 44. DECIPIENS, F.

Frondibus glabris, petiolo armato, fuscescente, lucidulo; spinis numerosissimis; inferioribus uncinatis, superioribus rectis, supremis acicularibus; squamis linearibus, integris, basi dilatatis aureisque; pinnis pinnatis, oblongis, rachibus depressis, tomentosis, fuscis, tomento rufescente, brevi; frondulis lanceolatis, alternis æqualiter crenatis, basi truncato, cordatis, mesonevro laminæ inferioris, squamas turgidas, indusium cyatheæ simulantes ferente; sporotheciis crassis, rubescentibus, annulo 30-32 articulato, sporis trigonis.

Habitat in Brasilia fluminensi, declivitatibus montis vulgo dicti Itatiaia.

Filix arborescens, aspectu splendido, nervillis scalpturatis.

ICON.: *Tab. CIII, fig. 1.*

(Longueur des pinnules, 30 centim.; des frondules, 5 sur 1 de largeur; il en existe de 17 à 19 paires.)

Magnifique fougère en arbre, rarement fertile; le stipe s'élève seulement à la hauteur de 60-80 centim. sur 50-60 centim. de diamètre. Le pétiole atteint la grosseur du petit doigt d'un enfant; il est chargé à la base d'une très-grande quantité d'épines; il décroît assez rapidement et l'on voit successivement les épines s'écarter, se redresser et devenir aciculaires. Les rachis des pinnules sont largement canaliculés et le canal est rempli par un tomentum fauve, très-épais et très-serré. M. Glaziou nous la signale comme étant des plus belles. Les écailles du mésonèvre sont très-singulières et simulent des sporothèces, étant bombées, blanchâtres et attachées par leurs bords; le tissu réticulé présente de petites ponctuations à la base des mailles nervillaires.

† 45. GUIMARAENSIS, F. et Glaz.

Frondibus heteromorphis, glabris, bipinnatis, petiolis longiculis, basi squamosis, squamis ovoideis, discoloribus, marginibus laceratis; pinnis pinnatis, apicibus pinnatifidis, pinnulis aliis breve petiolatis, oblongis, obtusiusculis, marginibus crenatis, basi subcordatis, aliis ovoideis sessilibus, basi rotun-

dis, marginibus integerrimis; in omnibus rachi tenui, alato subtomentosoque; sporotheciis parvulis, tot nervillæ quot sporothecia; annulo latissimo, sporis trigonis.

Habitat in Brasilia fluminensi. (Glaziou, n° 5252.)

Filix ampla, pinnulis heteromorphis.

Icon. : *Tab. CIII, fig. 2.*

(Longueur des pinnules, 30 centim. environ sur 8 d'envergure.)

Les mésonèvres portent des écailles simulant des sporothèces, comme dans l'espèce précédente, dont elle est du reste fort distincte. Il ne nous est parvenu que de grands fragments de frondes, mais non pas la fronde tout entière. Nous avons figuré, Tab. 103, fig. 2 *a*, le sommet d'une grande fronde, très-différente des pinnules dont on peut voir un fragment, planche citée, fig. 2 *b*. Les pinnules sont entières et fortement crénelées; elles se terminent par une longue pointe, très-entière, les nervilles basilaires ont une tendance manifeste à se réunir pour former une sorte de boucle. Les écailles de la base des pétioles sont dans cette plante tout à fait spéciales. (Voyez la figure que nous en avons donnée.)

78. LOPHOSORIA, Presl., *Die Gefässb.*, p. 37.

1. pruinata, Presl., *l. c.;* F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 172. — (Rio-Janeiro à Itatiaia, Glaziou, n° 5245.) — Frondes très-amples, glabres en dessus, portant en dessous, principalement sur le mésonèvre, des écailles roussâtres, lâchement appliquées; la teinte glaucescente des lames inférieures est très-prononcée; les sporothèces sont assez gros, au nombre de 7-9, de couleur roussâtre; les poils strigilleux du rhizome sont très-déliés, crêpus et forment un épais coussinet luisant.

2. cæsia, Presl., *l. c.;* F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 172. — (Rio-Janeiro, au Corcovado, Glaziou, n° 5246.) — Magnifique fougère dont les frondes naissent sur un très-gros rhizome; les pétioles sont extrêmement vigoureux, courbés, très-chargés de poils dorés, intestiniformes, fort longs et un peu crêpus; les radicelles sont aussi couvertes de poils soyeux, étalés et dorés; ainsi revêtues, elles prennent une apparence des plus remarquables. Les frondes sont absolument nues; la lame inférieure revêt une belle couleur bleue. Elle est glabre sur les deux faces avec des segments assez étroits et profondément

crénelés; les sporothèces forment des rangées de 5-6 groupes; ils ne dépassent pas les deux tiers inférieurs du segment.

Icon.: *Tab. CIV.*

NB. A l'exception du *L. dorsalis*, la plus belle espèce du genre et qui est une magnifique fougère en arbre, toutes sont réduites à un rhizome plus ou moins gros, toujours couvert d'écailles qui lui font une épaisse fourrure dorée. Ce rhizome semble se traîner sur la terre; aucune de celles-ci n'est épineuse. Les espèces à tige dressée et celles à rhizome semblent un peu disparates. (Glaziou *in litteris.*)

3. DORSALIS, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 173, T. 51, fig. 3. — Cette espèce est peut-être un *Alsophila;* elle n'a pas les poils strigilleux des autres *Lophosoria;* d'autre part le pétiole est épineux, circonstances qui, si elles ne sont pas absolument déterminantes, peuvent cependant faire hésiter sur la place à lui donner dans l'un ou l'autre genre.

79. TRICHOPTERIS, Presl., *Delic. Prag.*, I, p. 172.

2. ELEGANS, Presl., *Tent. pterid.*, p. 59; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 175. — (Rio-Janeiro, Serra os Orgaos, Glaziou, n° 4439.) — Plante ligneuse de la grosseur du bras. Ce spécimen diffère légèrement de la planche de Martius. (*Icon. crypt. Bras.*, p. 63, T. 38.) Les frondules sont un peu obtuses et plus longuement pédicellées. Ces différences, au reste, ne sont pas notables.

81. HEMITHELIA, Presl., *Die Gefässb.*, p. 41.

1. GARDNERIANA, Presl., *l. c.; Alsophila Capensis*, Hook., *Spec. filic.*, I, p. 36; *Syn. plur. exclusis;* F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 175. (Rio-Janeiro, Serra os Orgaos, Glaziou, n° 4440.) — La base du stipe produit cette singulière radication à divisions nombreuses, les dernières capillacées que nous avons déjà vues sur les spécimens de la même espèce venant du cap de Bonne-Espérance et récoltés par Drège. Serait-ce une fronde déformée ou réduite au système vasculaire? Telle est la singularité de son aspect qu'elle a été décrite par Klfss., *Enum. filic.*, p. 266, comme un *Trichomanes* douteux.

2. SELLOWIANA, Presl., *Crypt. vasc.*, p. 175; ajoutez à la suite du n° 980 le mot *partim.*

4*. MULTIFLORA, R. Br., *Prod. Fl. Nov. Holl.*, p. 158. — Cette plante de la Guyane aurait été trouvée dans la province de Para et dans le Haut-Amazone. — Fougère arborescente à sporothèces nombreux, protégés par un petit indusium membraneux, à demi cupuliforme.

5*. PLATYLEPIS, Hook., II, *Centur. fern's*, T. 100. — (Sur les rives du Rio-Negro, Spruce, n° 3127.) — Pétioles inermes; fronde tripinnée à peu près deltoïde; sporothèces très-gros portés sur un réceptacle hispide, indusium membraneux, semi-globuleux, caractérisé par l'ampleur des écailles.

82. HEMISTEGIA, Presl., *Die Gefässb.*, p. 46.

2*. WILLDENOWII, F., *Gen. filic.*, p. 351, T. 27 A, fig. 1; *Cyathea grandifolia*, Willd., *Filic.*, p. 490; *Microstegnus grandifolius*, Presl., *Die Gefässb.*, p. 46, non *Hemithelia grandiflora*, Hook., *Spec. filic.*, I, p. 30, T. 14. — Cette belle fougère, type du genre *Microstegnus*, est commune dans les Antilles et dans les Guyanes; elle aurait été trouvée dans la province de Para, d'après M. Baker, sans nom de collecteur. Le pétiole est vigoureux et glabre; la fronde, pinnée, excède un mètre; les frondules sont presque opposées et mesurent 30 centimètres et souvent plus. Les nervilles sont en relief, libres, à l'exception des inférieures qui se réunissent en arc. Presl, *l. c.*, trouve entre l'*Hemithelia grandiflora* de Hooker et le *Cyathea grandiflora* de Willdenow, *l. c.*, la différence d'un genre; sans aller aussi loin que cet illustre ptéridographe, nous nous sommes contenté de la séparer spécifiquement.

XXIV. CÉRATOPTERIDEES.

89 (83²). CERATOPTERIS, A. Brong., *in Dict. Sc. nat.*, III, 350.

1*. THALICTROIDES, Brong., *l. c.*, *Acrostichum, Belvisia, Furcaria, Parkeria, Pteris, Chladostachys, Cryptogenis, Ellobocarpus, Onychium, Schizæa, Teleozoma, auct. var.* — (Rio-Janeiro, prov. Capocabana, Gardner, n° 5667; Bahia, Saltzmann; Goyaz, prov. Saint-Paul, Maranhâo, par divers.) — Plante aquatique, annuelle, diffuse, succulente, hétéromorphe; sporothèces d'aspect ptéroïde. Sporanges presque sessiles, hyalinées, arrondies, comprimées; anneau ver-

tical, large, étalé; souvent très-court, s'ouvrant par une fente transversale; spores gros, obtusement triangulaires, portant trois stries concentriques. — Nous ne l'avons point vue provenant du Brésil.

II. HYMÉNOPHYLLACÉES.

I. TRICHOMANOIDÉES.

87. DIDYMOGLOSSUM, Presl., *Hymen.*, p. 22.

† 4. SOCIALE, F.

Frondibus glabris, in ambitu oblongis, cæspitosis, pedicello capilliformi, marginibus subdigitatis, glabris, nervillis furcatis; pyxidulis exsertis, scyphimorphibus, ore rotundo; sporangiis rotundis; columella brevi.

Habitat in Brasilia fluminensi. (Glaziou, n° 5249, Tijuca.)

Filix parvula, humifusa, frondibus pilos 2-4 atros, rigidos ferentibus; rhizomate longo, tomento fusco vestito.

ICON. : *Tab. LXXXV, fig 3.*

Dimensions (voir la planche citée).

Cette petite espèce est gazonnante, les frondes s'enchevêtrent sur des rhizomes tomenteux fort longs et filiformes, les lames sont plus larges que longues, comme digitées, à digitations irrégulières; elles portent trois ou quatre poils simples, raides, noirs et assez courts. Les pyxidules s'élèvent au-dessus des marges au moins des quatre cinquièmes de leur longueur totale. Elle diffère du *Didymodon Hookerii*, Presl., *l. c.*, entre autres caractères, par les poils nombreux et étoilés qui dans cette espèce couvrent les lames. On ne saurait, non plus, accepter pour notre plante les mots: *frondibus obovato-oblongis, cuneatis, brevissime stipitatis*, Willd., *Filic.*, p. 501.

II. HYMÉNOPHYLLÉES.

29. HYMENOPHYLLUM, Smith *et auct. emendat.*

2. ASPLENIOIDES, Sw., *Syn. filic.*, p. 145; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 192, T. 70, fig. 2.

Var. β *palmatum.* — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 5240.) — Espèce pendante,

d'un très-beau vert, à nervilles n'atteignant pas la marge. Nous avons écrit qu'elle avait du rapport avec l'*A. macrocarpon*, F. et Schaff.; il faut rectifier cette citation en mettant F. (*Catalog. méth. Foug. mexic.*, p. 39.)

† 7 ². DELICATISSIMUM, F.

Cæspitosum, intricatum, repens; rhizomate capillaceo; frondibus pinnatis, villosis, pilis longis, bifurcatis, ramis divaricatis, segmentis linearibus, emarginatis; marginibus leviter undulatis, nervillis nigrescentibus, pyxidulis parvis, labiis plane apertis.

Habitat in Brasilia fluminensi. (Serra os Orgaos, Glaziou, n° 3591.)

Filix delicatissima, segmentis ciliatis.

ICON. : *Tab. CV, fig. 1.*

(Longueur variable, 1,5-3 centim.)

Elle est plus ou moins divisée, tantôt palmée et tantôt pinnatifide; cette espèce n'est pas la seule à laquelle on pourrait donner l'épithète de *delicatissimum.*

13. JALAPPENSE, Schlecht., *Linn.*, V, p. 619? F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 195. — (Rio-Janeiro, Serra os Orgaos, Glaziou, n° 3590.) — Les pyxidules sont glabres, les valves entières et appliquées étroitement les unes contre les autres. On doit la regarder comme une variété.

14. POLYANTHOS, Sw., *Syn. filic.*, p. 149; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 195. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 3351.) — Elle doit son nom au grand nombre de pyxidules qui chargent ses frondes; le spécimen que nous avons sous les yeux est dans ce cas et nous remarquons, comme caractère, que les pyxidules sont pédicellées, arrondies, ayant leur plus grand diamètre transverse. — Ce n° 3351 est porté mal à propos comme appartenant à l'*H. microcarpon*, p. 246.

** *Sphærocionium.*

19. CAUDICULATUM, Mart., *Icon. crypt. Bras.*, p. 102, T. 67; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 197. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 5241.) — On peut facilement la reconnaître à la décurrence des frondes qui donne au pétiole un aspect ailé; elle est parfaitement glabre et conserve en herbier une belle couleur verte.

25. CAULOPTERUM, F., *Crypt. vasc.*, p. 197, T. 70, fig. 3. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 5238.) — Espèce dilatée; frondes naissant écartées sur un rhizome filiforme; segments souvent imbriqués.

26². RUFUM, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 198, T. 70, fig. 4. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 5237.) — Le système pileux est des plus remarquables; elle pend aux arbres. Les mailles du tissu cellulaire sont assez larges.

III. GLEICHÉNIACÉES.

90. MERTENSIA, Willd., *Act. holm.*, 1864, p. 165.

5. FURCATA, Willd., *Filic.*, p. 71; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 200. — (Sommet du versant méridional de los Orgaos, Glaziou, n° 4453.) — Son pétiole, écrit M. Glaziou, atteint près d'un mètre avant d'émettre ses frondes.

* *Segments glabres inférieurement.*

† 5². LONGIPES, F.

Parva, glaberrima, di-trichotomo-flabellata; petiolo longissimo, superne depresso, canaliculato, flavescente; rhizomate crassitudine pennæ columbariæ, sinuato; dichotomiis omnibus gemmiferis; gemmis parvulis, squamis fulvis laxe vestitis; frondulis linearibus, acuminatissimis, mesonevris squamosis; segmentis obovatis, leviter replicatis, sporangiis ad marginem evolventibus.

Habitat in Brasilia fluminensi. (Serra do Pica, Glaziou, n° 5235, *frequens.*)

Filix gracilis, longe stipitata, gemmis inertibus.

ICON. : *Tab. CV, fig. 2.*

(Longueur, 32-36 centim., dont le pétiole fait presque les $^3/_4$; bifurcation primaire, 10 centim., la dernière atteignant à peine 4; largeur des frondules, 1 centim.; je compte près de 30 segments sur chaque côte des frondules.)

Cette espèce est d'aspect agréable, assez flexible, ayant quelques écailles dans toutes ses parties, moins le pétiole qui est nu; la base des dichotomies est ailée par le développement de segments pareils à ceux des frondules; celles-ci sont arquées, à segments rapprochés dont les nervilles sont largement bifurquées dès leur point d'insertion. Il fallait s'assurer s'il n'existait pas des formes plus grandes

qui peut-être l'auraient fait rapporter à quelque autre espèce, mais M. Glaziou nous apprend que ce spécimen est de grandeur normale; les individus de cette espèce, dit-il, gardent toujours les mêmes dimensions, sauf de très-légères différences en plus ou en moins.

** *Segments tomenteux inférieurement.*

19*. LATISSIMA, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 203, T. 73, fig. 1. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 5234.) — Var.: *Lana albicante.* Dans le type le tomentum, qui charge si abondamment les lames inférieures, est d'une belle couleur rousse. C'est une très-grande et très-belle espèce.

IV. SCHIZÉACÉES.

I. EUSCHIZÉACÉES.

II. ANEIMIACÉES.

94. ANEIMIA, Sw., *Syn. filic.*, p. 195.

5. ROTUNDIFOLIA, Schrad., *Gœtt. Gel. Anz.*, 1824, p. 865, n° 8; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 206. C'est sur le vu de la planche donnée par Raddi, *Filic. Bras.*, T. 11 (*Aneimia radicans*, var. β), que nous avons écrit qu'elle était très-velue; la description n'en dit rien, non plus que Presl qui l'énumère (*Supp. pterid.*, p. 81) et qui se contente de dire : *Icon. Raddiana specimen nimis glabrum refert*, tandis que le contraire nous apparaît nettement. Nous n'avons aucun moyen de dissiper cette contradiction. Le spécimen n° 5231, récolté dans la vallée du Rio-Comprido, est au plus haut point prolifère, elle reproduit assez exactement la forme donnée par Raddi; mais à l'exception de quelques poils épars sur les pétioles, la plante est absolument glabre. La souche est dressée et se charge de 5-7 frondes. A la voir il est permis de penser que la plante n'a qu'une courte durée : elle est élancée, flexible, laisse voir facilement ses nervilles; les rejets prolifiques sont filiformes, le gemme produit d'abondantes radicelles et des frondules de forme variable; le terme *rotundifolia*, qui la désigne, ne doit pas être pris à la rigueur; les frondules ne sont qu'arrondies, ou elliptiques, crénelées finement en leur pourtour et terminées en coin par un très-court pétiole.

13. RADDIANA, Lk., *Hort. Berol.*, II, p. 144; *A. flexuosa*, Radd., *Fil. Bras.*, p. 71, T. 13; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 208. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 5380, [1872.]) — Ce spécimen est médiocrement velu; les rameaux des épis sont très-serrés et d'une belle couleur ferrugineuse; la figure donnée par Raddi laisse aux segments une disposition ondulée qui ne se trouve pas ici. Les *A. Raddiana*, Lk., et *tomentosa*, renvoient l'une et l'autre à la planche 13 de Raddi et nous croyons devoir les réunir, les différences qui les séparent n'étant que des modifications d'une même forme.

16. ADIANTIFOLIA, Sw., *Syn. filic.*, p. 157; Willd., *Filic.*, p. 94; *Dict. Levrault*, Tab. 100. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 5391.) — Cette espèce n'avait pas été, que nous sachions, recueillie au Brésil; les frondes sont bipennées, à segments oblongs, dentés et presque laciniés au sommet; elle est d'un vert foncé; les épis sont géminés.

21. CILIATA, Presl., *Delic. Prag.*, p. 158; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 210. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n°s 4459 et 5381 [1872], et n° 5232 à Sao Christovao.) — Les épis (*Anthuri*, Lk.) sont contractés, la souche est relativement fort grosse et radicelleuse.

94[2] ANEIMIÆBOTRYS, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 267.

1. ASPERA, F., *l. c.* — (Rio-Janeiro, au Morro Queimado, entre la Tijuca et la Gavia, Glaziou, n° 4460.) — Les frondes sont bipennées; les frondules primaires, presque opposées, s'ouvrent à angle droit; le pétiole et les rachis sont canaliculés, gramineux; la souche est couverte de longs poils fauves de couleur dorée. Le pétiole que nous avons sous les yeux mesure près d'un mètre, sur 32-35 centimètres d'envergure.

95. ANEIMIÆDICTYON, J. Smith., Presl., *Supp. pterid.*, p. 105.

1. PHYLLITIDIS, J. Sm., *in London. Journ. bot.*, II, p. 387; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 211. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 5395 [1872.]) — Var.: β. *fraxinifolium*, J. Sm., *l. c.* — Variété très-grande qui constitue une espèce qu'il est permis de regarder comme distincte. Les frondules, courtement pétiolées, ont une marge ondulée, dentée; elles sont obliques et acuminées, la terminale est régulièrement ovoïde; les épis portent des rameaux très-grêles; elle mesure près d'un mètre.

V. LYGODIACÉES.

97. LYGODIUM, Sw., *Syn. filic.*, p. 152.

2. HASTATUM, Desv., *Prodr. Ann. soc. Linn. Paris*, VI, p. 204; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 212. — (Rio-Janeiro, Glaziou, nos 4461 et 4462 [*sterilis*], no 4464, fertile.) — Elle est grimpante à la manière de nos clématites.

5. POHLIANUM, Presl., *Supp. pterid.*, p. 105. — (Rio-Janeiro, Barrière des Orgues, Glaziou, no 4463.) — Même port que ses congénères; elle a des proportions inférieures à celles de l'espèce précédente, avec des épis beaucoup plus courts.

VI. MARATTIACÉES.

98. GYMNOTHECA, Presl., *Tent. pterid. supp.*, p. 12.

1. CICUTÆFOLIA, Presl., *l. c.* — (Brésil, Rio-Janeiro, Glaziou, no 5231.) — Le rachis des frondules est seul ailé. C'est aux frondes radicales et stériles que s'adresse le nom spécifique.

VII. DANÆACÉES.

100. DANÆA, Smith., *Act. Taur.*, V, p. 420, T. 9.

2. LONGIFOLIA, Desv., *Berol. mag.*, 1811, p. 307. — (Rio-Janeiro, Alto-Macahe, Glaziou, no 4674.) — Les frondules sont elliptiques, opposées, courtement pétiolées, acuminées, à marge légèrement ondulée; elle est glabre dans toutes ses parties.

IX. OPHIOGLOSSACÉES.

103. OPHIOGLOSSUM, L., *Sp. pl.*, 1518.

103. RETICULATUM, L., *l. c.;* F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 218. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 5230.) — Var. : *cordatum.* Toutes les espèces d'*Ophioglossum* ont des nervilles anastomosées; c'est un caractère de genre et qui ne fournit aucune indication comme espèce; il en est de même de l'épithète *cordatum,* attribuée à la variété, les frondes de presque toutes les espèces ayant une base cordiforme. Lorsque les noms ne sont pas caractéristiques, au lieu de guider, ils égarent.

II. LYCOPODIACÉES.

1. LYCOPODIUM, Spring., *Monogr.*, T. 1 et 2.

1. Type : SELAGO.

1*. SELAGO, L., *Sp. pl.*, 1565, et *auct.* — (Rio-Janeiro, sommet des Orgues, Glaziou, n° 4477.) — L'aire botanique de cette plante est fort étendue; elle est robuste, dichotome, à feuilles toutes semblables, dressées et imbriquées; la nervure moyenne est plus apparente que dans les spécimens d'Europe. M. Spring ne l'indique pas comme brésilienne.

1². Type : REFLEXUM.

2 (1). REFLEXUM, Lmk., *Encyc. méth.*, III, p. 653; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 220. — (Rio-Janeiro, Alto-Macahe, Glaziou, n° 4476.) — Espèce nettement caractérisée, allongée, souple, à dichotomies très-espacées; anthéridies axillaires, occupant le sommet des tiges.

† 3 (1²). FLACCIDUM, F.

Caulibus subsessilibus, assurgentibus, 6-7 dichotomis, laxissimis, ramis approximatis, fili crassi similibus; foliis verticillatis, linearibus, subpatulis, curvatis, longe acuminatis, uninervatis, mesonevro donatis; antheridiis parvulis, axillaribus, magnitudine seminis sinapeos.

Habitat in Brasilia fluminensi. (Alto-Macahe, Glaziou, n° 4677.)

Lycopodium flaccidum, viride, pendulum; dichotomiis angustis.

ICON.: *Tab. CVI, fig. 1.*

(Longueur, 32-34 centim.; feuilles, 7-8 millim.)

Cette espèce est d'une souplesse extrême et ne montre aucune trace d'élasticité, les dichotomies sont étroites, presque parallèles; les rameaux nombreux portent des feuilles linéaires, médiocrement étalées, très-étroites et notablement courbées; les anthéridies, de couleur jaune pâle, sont bombées.

4 (2). INTERMEDIUM, Spring., *in Flor. Bras.*, I, p. 111; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 220. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 5224.) — Espèce faiblement caractérisée, plusieurs fois dichotome, à dichotomies assez rapprochées; rameaux courbés, ondulés, chargés de feuilles linéaires, médiocrement divergentes, étroites et carénées. Les rameaux dans leur ensemble forment une sorte de réseau. Elle a des rapports avec le *L. verticillatum.*

† 4² (2²). HETEROCARPON, F.

Caulibus flaccidis, pendulis, longissime dichotomis, crassitudine pennæ columbæ, foliis linearibus, acutis, basi latioribus, patulis, fructibus dimorphis, in spicis breviusculis, aut ad ramos axillaribus; foliis spicarum carinatis, longe acuminatis, sporangiis crassis, lutescentibus.

Habitat in Brasilia fluminensi. (Glaziou, n° 5636.)

Espèce très-nettement caractérisée par des sporanges axillaires le long des tiges ou réunies en épis, circonstance qui infirme la division de ces plantes, fondée sur la disposition de la fructification spiciforme ou axillaire.

Le *Lycopodium heterocarpon* peut atteindre ou même dépasser 40 centim.; il est pendant, parfaitement glabre, avec des rameaux courbés en arc. Les feuilles des tiges, très-étroites, sont longues de 11 à 13 millim.; celles qui portent des fruits à leur aisselle ne diffèrent pas des autres, tandis que les feuilles des épis ont une forme carénée et se terminent brusquement en une longue pointe, très-légèrement pubescente.

2. *Type :* LINIFOLIUM.

5*. LINIFOLIUM, L., *Sp. pl.*, 1565; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 221. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 5222.) — Belle espèce à feuilles étalées, exécutant un demi-tour de torsion à la base; elle est assez polymorphe.

† 8 (5 [2]). FLEXIBILE, F.

Caulibus flexuosis, filiformibus æqualiter 1-2 dichotomis, sæpe puniceis; foliis lanceolatis, irregulariter patulis, lanceolatis, basi leviter semi-contortis, longe acuminatis, acumine longo, tenui, curvato, mesonevro perspicuo; antheridiis remotis, orbiculari-reniformibus.

Habitat in Brasilia fluminensi. (Glaziou, n° 5220.)

Lycopodium statura mediocri, caulibus flexuosis notatum.

ICON.: *Tab. CV, fig. 3.*

(Longueur totale : tiges, 14-16 centim.; feuilles, 11-13 millim. sur 2 millim. de largeur.)

Les feuilles prennent toutes sortes de directions en s'écartant de la tige; elles sont distiques, très-légèrement contournées vers le bas. Le mésonèvre est très-apparent et se termine en une pointe molle, diversement infléchie et comme flétrie. Ce qui caractérise cette espèce, consiste dans les tiges et leurs divisions, fléchies dans toute leur étendue en zigzag, et dont les courbures sont très-rapprochées; la racine est filiforme.

4. Type: VERTICILLATUM.

9. VERTICILLATUM, L., *Supp.*, p. 448; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 221. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 5225.) — Var.: *filiforme.* Très-grande espèce, pendante, flexible, presque filiforme, à feuilles étalées, courbées en dedans, tubulées, très-entières.

11. FONTINALOIDES, Spring., *Fl. Bras.*, I, p. 112, T. 5, fig. 2; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 222; *Lycop. serpyllifolium*, F., *l. c.*, T. 73, fig. 3. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 4471, Alto-Macahe; n°s 5218 et 5219, Morro da Fazenda, à Tijuca.) — Nous avions été frappé de l'amplitude et de la forme toute spéciale des feuilles de la base des tiges, très-semblables à celles du serpolet. Nous constatons maintenant que notre espèce rentre dans le *L. fontinaloides* de Spring. Elle varie par des tiges plus ou moins grêles et plus ou moins souples. Les anthéridies occupent le sommet des rameaux. Nous indiquons comme variétés, les formes suivantes qui méritent peut-être d'être élevées à la condition de ce genre.

β CORONATA, F. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 3219.)

Tiges plus robustes que dans le type, à feuilles carénées, médiocrement appliquées, branches dichotomiques très-longues. Elle est remarquable par un bouquet de feuilles lancéolées, obtusiuscules, pointues ou même acuminées; elle atteint un demi-mètre et s'attache aux arbres par une racine fibreuse. Les tiges sont grosses comme une plume de pigeon. Cette variété reproduit très-exactement la forme des tiges du *Fontinalis antipyretica*, L.

γ ADPRESSA, F., *L. serpyllifolium;* F., *Crypt. vasc. Brés.*, 2e appendice, p. 267. — (Rio-Janeiro, Glaziou, nº 3600.)

Tiges à branches dichotomes arquées, les supérieures très-courtes et comme bifurquées; elles sont plus raides et plus grosses que dans le type; les feuilles sont épaisses, ridées, comme cartilagineuses, marginées de blanc et très-étroitement imbriquées, le sommet seul se détache un peu de la tige et la rend rugueuse au toucher.

6². Type : PHLEGMARIA.

†14². ERYTHROCAULON, F.

Caulibus sessilibus, dichotomis alatis, puniceis, flexuosis, angulatis, patulis; foliis alternis, lanceolatis acutis, spicis 2-3 dichotomis, cylindricis, foliis ramorum fertilium crassis, arcte imbricatis, ovatis, apice rostratis, gibbolosis, trifariis; antheridiis albidulis, lævissimis.

Habitat in Brasilia fluminensi. (Glaziou, nº 5221.)

Lycopodium caulibus puniceis, flexuosis, cæspitosis, dichotomo-diffusis, foliis alternis remotis; surculo lanoso.

ICON. : *Tab. CVI, fig. 2.*

(Longueur des tiges, 12-14 centim.; feuilles, 10-12 millim.)

Cette jolie espèce est remarquable par la belle couleur pourpre de ses tiges, notablement flexueuses, mais non courbées en zigzag; les feuilles sont un peu écartées les unes des autres, vertes, très-étalées et quelquefois même réfléchies; les épis, au nombre de 10-12, se recourbent de dehors en dedans; le sommet a une tendance à se bifurquer, c'est-à-dire à former de nouvelles dichotomies. La couleur pourpre s'étend à toutes les divisions des tiges.

7. Type : OPHIOGLOSSOIDES.

†15². ASSURGENS, F.

Caulibus ramosis, assurgentibus; rhizomate horizontali, crassitudine pennæ columbarum, foliis quadrifariis, aphlebiis, angustissimis, rigidis, apice

mucronulatis, curvatis; ad basim remotioribus; ramis fertilibus elongatis, pauci-foliatis; spicis 2-3 dichotomis, cylindraceis, squamis ovoideis, siccitate reflexis fuscisque, antheridiis ad maturitatem basi ad apicem hiantibus, labiis flexuosis.

Habitat in Brasilia fluminensi. (Glaziou, n° 5228.)

Lycopodium repens, ramosum, spicis dichotomis, squamis apice reflexis.

Icon. : *Tab. CVI, fig. 3.*

(Longueur des tiges, 20-22 centim.; feuilles, 5 millim.; épis, 3 à 4 centim. sur un rameau de 5-7 centim.)

Les rameaux stériles sont moins feuillus à la base que dans les parties supérieures. Les épis prenant une couleur brune à la maturité, dans cet état les anthéridies deviennent béantes et il est difficile d'en déterminer rigoureusement la forme.

8. Type : Inundatum.

16*. alopecuroides, L., *Spec. pl.*, 1565; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 223. — (Brésil, Serra os Orgaos, Glaziou, n°s 4489 et 4481.) — Les rameaux, très-vigoureux et très-obtus, ont une tendance bifide très-marquée. Les spores sont globuleux, lisses, assez gros et visibles à l'œil nu.

9. Type : Annotinum.

18. cernuum, L., *Sp. pl.*, 1566; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 224. — (Rio-Janeiro, à Larangeiros, Glaziou, n° 4479.) — Plante assez mobile dans ses formes; les épis sont courts, penchés, discolores et formés plutôt de poils que d'écailles.

†18². Eichleri, Glaz. *in litteris.*

Caulibus ramosis, rotundis, lapsu squamarum asperrimis; ramis subpendulis, foliis linearibus, incurvis, mesonevro prominente, dorso sulcatis; foliis ramulorum magis curvatis, transverse et regulariter rimosis, amentis erectis, ellipticis, squamis ovoideis, longe acuminatis.

Habitat in Brasilia fluminensi. (Alto-Macahe, Glaziou, n° 4478; altitude, 1,600 mètres.)

Lycopodium facie L. cernui, L., sed ramis inflexis et spicis erectis.

Icon. : *Tab. CVI, fig. 4.*

(Longueur, 75-95 centim.; la base des tiges est de la grosseur d'une plume de cygne.)

Les tiges sont arrondies, finement striées; elles portent sur leur trajet les débris des anciennes feuilles; cette espèce est très-vigoureuse, et quoiqu'elle ait en elle quelque chose de l'aspect général du *L. cernuum*, elle en est des plus distinctes. Son port rappelle en petit un arbre pleureur.

10. Type : CLAVATUM.

19*. CLAVATUM, L., *Sp. pl.*, 1564; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 224. — (Rio-Janeiro, sommet des Orgues au sud-ouest du Rio-Soberbo, Glaziou, n° 4474; n° 5227, Rio sans autre indication.) — Plante longuement traçante dont les tiges ne s'étendent qu'en longueur, avec des épis qui n'excèdent pas le nombre de trois et qui sont latéraux.

21. TRICHIATUM, Bory., *Voy. aux quatre îles afric.*, I, 350; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 225. — (Rio-Janeiro, à Tijuca, Glaziou, n°s 4472 et 4475; sommet des Orgues, n° 4473.) — Var.: β, *spicis longioribus.* Bien voisine du *L. clavatum*, L.; à feuilles plus étroites et plus étalées; elle est caulescente; l'extrémité de ses rameaux stériles porte une petite touffe d'écailles transparentes, denticulées et d'un blanc très-pur. Nous avons cru utile de figurer cette belle espèce longtemps controversée.

ICON. : *Tab. CVII.*

11. Type : CAROLINIANUM.

22. CAROLINIANUM, L., *Spec. pl.*, 1567; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 225. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 5229.) — Les épis, toujours simples, sont hors de proportion avec la tige qui les supporte. Le nom spécifique semble indiquer une localité restreinte, tandis que l'aire botanique de cette curieuse espèce s'étend bien au delà des limites qu'elle semble indiquer; c'est ainsi, par exemple, qu'elle a été trouvée au cap de Bonne-Espérance, à Madagascar, à Bourbon, à Maurice et même à Ceylan. Elle est commune à la Guadeloupe.

12. Type : COMPLANATUM.

24. COMPLANATUM, L., *Spec. pl.*, 1567; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 225. Var.: β, *adpressifolium*, Spring., *Monogr.*, I, p. 102. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 5226.) — La plante brésilienne semble différer des individus européens par des proportions très-supérieures, par une ramescence moins serrée et par des

épis formant trois dichotomies. Nous avons sous les yeux deux spécimens dont l'axe des épis se continue sous forme d'appendice, dépourvu d'anthéridies. La longueur des tiges atteint 40 centimètres, celle des épis entre 5 et 6.

2. SELAGINELLA, Spring., *Monogr.*, T. II.

3. *Type:* Apus.

4. APUS, Spring., II, p. 24; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 227. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n°s 4487 et 5217.) — Elle est annuelle, fort délicate et d'aspect assez variable.

5. CRASSINERVIA, Spring., *Monogr.*, II, p. 77; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 227. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 4498 *partim.*) — M. Spring n'a pas connu les épis; ils sont quadrangulaires, assez courts, formés de feuilles scarieuses. La nervure est noirâtre et n'atteint pas le sommet.

6. POLYSPERMA, Spring., *Monogr.*, II, p. 78; F., *l. c.*, p. 227. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 4498 *partim.*) — Les épis sont quadrangulaires, longs de 2 centimètres, formés de feuilles semi-étalées et longuement acuminées.

6². TENUISSIMA, F.

Repens, caulibus capilliformibus, ramosis, ramis brevibus; foliis glabris remotiusculis, ovatis, obtusiusculis, intermediis minoribus, acuminatis, spicis brevibus gemmiformibus.

Rio-Janeiro, Alto-Macahe. (Glaziou, n° 4499.)

Parvula, cæspitosa, radicans.

Icon. : *Tab. CVIII, fig. 1.*

Très-petite espèce, très-radicante, radicelles capilliformes sur lesquelles reposent les tiges. Nous n'avons pu voir les anthéridies. Elle a quelques rapports avec la *S. delicatissima*, A. Braun.

6. *Type:* Porelloides.

7. MUSCOSA, Spring., *Monogr.*, II, p. 100. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 4675.) — Épis courts, tétragones, souvent bifides, à feuilles carénées, aiguës. Les tiges sont radicantes, les radicelles capillacées, assez courtes.

7. Type : SERPENS.

9². SERPENS, Spring., *l. c.*, p. 102? — (Rio-Janeiro, grand marécage des Orgues, Glaziou, n° 4486 et n° 4485, sommet des Orgues [forme].) — Tiges radicantes à rameaux distiques, rameaux courts, garnis de feuilles légèrement distantes, à nervure médiane facile à voir; les latérales ovoïdes, petites, un peu obliques; les intermédiaires convexes, aristées; les épis sont courts et formés d'un petit nombre de feuilles lâchement appliquées. Elle a des rapports avec la *S. apus*, Spring.

7². Type : JUNGERMANNIOIDES.

10*. JUNGERMANNIOIDES, Spring., *l. c.*, II, p. 117. — (Rio-Janeiro, à Tijuca, Glaziou, n° 4493.) — Grande espèce élégamment pectinée. On trouve une très-bonne figure de cette plante dans l'atlas du *Dictionnaire des sciences naturelles* de Levrault, donnée par Turpin.

11. BRENNII, Spring., *l. c.*, p. 119. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 5216.) — Plante d'un vert très-intense, élégamment pectinée; les feuilles intermédiaires, très-longuement aristées, sont sur deux rangs.

†11². CANESCENS, F.

Caule prostrato radicanti, striato, helveolo, ad basim denudato, ramis brevibus, bifurcatis, excurvatis; foliis lateralibus ovoideis, subobliquis, acutis, basi cordiformibus, intermediis angustioribus, ovalibus, longe acuminatis; spicis parvis.

Habitat in Brasilia fluminensi. (Glaziou, n° 4489.)

Species canescens, ramis excurvatis notata.

ICON. : *Tab. CVIII, fig. 2.*

(Longueur : 8-10 centim.)

Les radicelles sont capilliformes; elle est canescente, circonstance à peu près exceptionnelle dans le genre. Les épis (?), très-courts, sont formés de feuilles lâchement disposées en rosette. — Il serait utile de la revoir sur de plus nombreux spécimens.

9. Type : DIDYMOSTACHYA.

13. FLEXUOSA, Spring., *Monogr.*, II, p. 131; F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 229. — (Rio-Janeiro, Glaziou, nos 4483 et 4676.) — Feuilles intermédiaires ciliées, ovoïdes et aristées, les latérales pectinées, se succédant sans intervalle; tiges arrondies.

†14². BELLA, F.

Caulibus elongatis, flexuosis, radicantibus, ramosis, foliis lateralibus ovoideo-obliquis, glabris, intermediis duplo minoribus, ovatis, aristatis, marginibus minutissime ciliatis; spicis triquetris, longissimis, vario modo curvatis, gracilibus, bracteis arcte imbricatis, carinatis, ovatis, acuminatis, acumine dentato; antheridiis oblongis, magnis; oophoridiis rotundis, papillatis.

Habitat in Brasilia fluminensi. (Glaziou, Petropolis, n° 4491, *spicis brevioribus;* Morro Queimado, n° 4504; Rio-Janeiro, *spicis longissimis,* n° 4494.)

Formosa, magna, radicellis rigidis, apice ramosis subnitidis.

ICON. : *CVIII, fig. 3.*

(Longueur totale : 36-40 centim.; rameaux latéraux, 7-8 centim.; épis, 2-4 centim.) [*Tab. XXX, fig. 3.*]

Très-belle espèce, très-prolifère; les feuilles des rameaux qui portent les épis sont beaucoup plus étroites que les caulinaires; les épis, de la grosseur d'une plume de pigeon, sont flexueux, sessiles et se dirigent tantôt en dedans de la tige et tantôt en dehors. Elle n'est pas rampante comme le *S. macrostachya*, Spring.; les feuilles intermédiaires ne sont pas marginées de blanc; les latérales sont ici obtuses et nullement *pungenti-acutis, apice tortis*, etc.]

†15². GEMINATA, F.

Caule firmulo, rigido, ramulis curvatis seu assurgentibus, omnibus ad exclusionem ramulorum superiorum fertilibus; foliis lateralibus obovatis, obtusis, basi ciliatis, apice mucronulatis, intermediis rotundatis, aristatis; spicis brevibus, semper geminatis; bracteis ovatis, brevibus, mucronatis, laxe inter se unitis.

Habitat in Brasilia fluminensi. (Serra os Orgaos, Glaziou, n° 4484.)
Foliosa ramosa, intense viridis, subtus pallidior, radicellis rigidis, albidulis.
Icon. : *Tab. CVIII, fig. 4.*

(Longueur : 16-18 centim. ; rameaux principaux, 8 centim. ; épis, 5-6 millim.)

Cette espèce sera facile à reconnaître à ses épis courts, ovoïdes, réunis 2 à 2 et légèrement divariqués. Les feuilles dans leur ensemble sont pectinées et couvrent la feuille de la base au sommet; elle est d'un vert intense en dessus et d'un vert plus pâle en dessous.

29*. Glaziovii, F., *Crypt. vasc. Brés.*, p. 232, T. 75, fig. 4. — (Rio-Janeiro, Glaziou, n° 4482; par le même à la Nouv. Fribourg, n° 4502, et au Alto-Macahe, n° 4503.) — Cette espèce est peut-être la plus vigoureuse du genre; les feuilles des deux ordres sont glabres ; la tige est ligneuse, sillonnée et presque canaliculée, gramineuse et flexueuse. Les feuilles de la tige et celles de ses principales divisions sont étalées et toujours distantes.

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL DES CRYPTOGAMES VASCULAIRES DU BRÉSIL

CORPS DE L'OUVRAGE, APPENDICE ET SUPPLÉMENT.

NB. Les numéros sans astérisque se rapportent à l'ouvrage principal, et avec astérisque, au supplément. La synonymie porte d'ordinaire le nom du créateur de l'espèce, même quand elle a passé dans un autre genre.

I. FOUGÈRES.

I. POLYPODIACÉES.

I. ACROSTICHÉES.

1. Acrostichum, F.

I. Oligolépidées.

* *Frondes ovales-lancéolées ou lancéolées.*

1. latifolium, Sw. p. 1, 1*.
2. macropodium, F. 1.
3. alismæfolium, F. 1, 2*.
† 4. (3²) Macahense, F. 2*.
5. brevipes, Kze. 2.
6. crassinerve, Kze. 2, 3*.
7. Scapellum, Mart. 2.
8. consobrinum, Kze. 2, 237.
9. Lingua, Radd. 2, 3*.
† 10. ovalifolium, F. 3.
† 11. ovatum, F. 3*.
† 12. hymenodiastrum, F. 3, 4*.
† 13. producens, F. 4*.
† 14. papyraceum, F. 4.
† 15. amplissimum, F. 5.
16. Lechlerianum, Metten. 5, 5*.
17. minutum, Pohl. 5, 5*, 237.
18. craspedariæforme, F. 261, 5*.
19. acrocarpon, Mart. 6.
20. fimbriatum, Cavan. 6.
21. Sellowianum, Presl. 6.
22. apodum, Klfss. 6.
23. scolopendrifolium, Radd. 6.
† 24. Glaziovii, F. 6, 237.
† 25. mollissimum, F. 7, 5*.
26. Plumieri, F. 7.
† 27. spissum, F. 8, 5*.
28. erinaceum, F. 8, 6*, 237.
† 29. insigne, F. 6*.
† 30. hirtipes, F. 6*, 238, 261.
† 31. omphalodes, F. 7*.

** *Frondes linéaires ou tendant à cette forme.*

32. Martinicense, Desv. 8, 7*.
33. stramineum, F. 238, 261, 8*.
† 34. rigidum, F. 7*.
35. leptophyllum, F. 8, 261.
36. durum, Kze. 8.
37. pachydermum, F. 9.
38. lineare, F. 9.
† 39. gracile, F. 8*.
40. rubiginosum, F. 9.
41. Herminieri, F. 43, 9*.
42. viscosum, Sw. 9.
† 43. acutum, F. 9*.
† 44. obliquatum, F. 261, 9*.
† 45. Beaurepairii, F. 10*.

II. Polylépidées.

† 46. prælongum, F. 9, 10*.
† 47. chrysolepis, F. 10, 10*.
48. Lindenii, Bory. 10, 261.
49. brachynevron, F. 11.
50. strictum, Radd. 11.
51. actinotrichum, Mart. 11.
52. plumosum, F. 11, 261.
† 53. elegans, F. 11*.
54. perelegans, F. 11.
† 55. viscidum, F. 12*.
† 56. angustum, F. 12.
57. Gardnerianum, Kze. 11.
† 58. Lisianum, Glaz. 13*.
59. Langsdorffii, Hook. Grev. 11, 13*, 239.
60. Meridense, Klotz. 12.
61. cuspidatum, Willd. 12, 239.
62. lepidotum, Willd. 12.
† 63. acuminans, F. 12.

*** *Piloselloides.*

64. piloselloides, Presl. 13.
65. ovatum, James. 13.
66. horridulum, Klfss. 13, 14*.

APPENDICE.

67. alpestre, Gardn. 13.

2. Lomariopsis, F.

1. phlebodes, Kze. 13.
2. erythrodes, Kze. 14, 262.
3. elongata, F. 14.

3. Polybotrya, H. Bonpl.

1. osmondacea, H. Bonpl. 14.
2. caudata, Kze. 14.
3. pubens, Mart. 14.
4. acuminata, Lk. 14.
5. incisa, Lk. 14.
6. cylindrica, Klfss. 15.
† 7. frondosa, F. 15.
8. semi-pinnata, F. 16.

4. Rhipidopteris, Schott.

1. peltata, Sw. 16.
var. stenophylla. 14*.

5. Olfersia, Radd.

1. cervina, H. et Grev. 16.
2. Corcovadensis, Radd. 16.

6. Soromanes, F.

1. integrifolium, F. 17.

7. Gymnopteris, Bernh.

1. nicotianæfolium, Sw. 17.
2. semi-pinnata, F. 17.
var. β subsimplex. 17.

8. Heteronevron, F.

1. meniscioides, F. 17.
2. serratifolium, F. 17.
var. β undulatum, F. 18.
3. Raddianum, F. 18.

9. Anetium, Splitg.

1. citrifolium, Splitg. 18.

10. Chrysodium, F.

1. vulgare, F. 18.
2. hirsutum, F. 18.
3. Danaæfolium, F. 18, 239.

II. LOMARIÉES.

11. Lomaria, Willd.

* *Frondes pinnatifides.*

1. Plumieri, Desv. 20.
2. pteropus, Kze. 20.
† 3. mucronata, F. 20.
4. Fialhoi, F. et Glaz. 239, 15*.
5. Penna-marina, Metten. 16*.

** *Frondes pinnées.*

6. Brasiliensis, Radd. 21.
7. striata, Sw. 21.
8. Regnelliana, Kze. 21.
† 9. imperialis, F. et Glaz. 21, 262.

12. Blechnum, L.

* *Eublechnum.*

1. Lanceola, L. 22, 16*.
2. gracile, Klfss. 23, 16*.
3. unilaterale, Willd. 23, 16*.
4. asplenioides, Willd. 23.
5. triangulare, Lk. 23, 17*.
6. heterocarpon, F. 23, 17*.
7. occidentale, L. 24.
   var. β caudatum, Cav. 24.
   — γ minus, Th. Moor. 24.
8. helveolum, F. 24, 17*.
9. cognatum, Presl. 17*.
10. intermedium, Lk. 24.
11. integerrimum, Spr. 24.
† 12. mucronatum, F. 17*.
13. Lechleri, Metten. 24.

** *Mesothema.*

14. plantagineum, Presl. 24.
15. hastatum, Klfss. 24, 18*.
† 16. diplotaxicum, F. 25, 18*.

*** *Blechnopsis.*

17. Brasiliense, Desv. 25.
18. serrulatum, C. Rich. 25, 18*.
19. nitidum, Presl. 19.
20. extensum, F. 26, 18*.

13. Salpichlæna, J. Sm.

1. volubilis, Klfss. 26, 240.

III. VITTARIÉES.

14. Vittaria, Sm.

* *Tæniopsis.*

1. Gardneriana, F. 26, 262.
2. stipitata, Kze. 27.
3. lineata, L. 27, 19*.

** *Euvittaria.*

4. scabrida, Klfss. 27.

15. Pteropsis, Desv.

1. angustifolia. Sw. 27.

16. Cuspidaria, 27.

1. furcata, F. 27.

IV. PLEUROGRAMMÉES.

17. Xiphopteris, Klfss.

1. serrulata, Klfss. 28, 19*.

18. Pleurogramme, Presl.

1. linearis, Klfss. 28.
2. graminifolia, Hook. 28.
3. graminoides, Klfss. 28.
4. ? pumila, Klfss. 28.

V. LINDSAYÉES.

19. Lindsaya, Dryand.

* *Frondes simples.*

1. reniformis, Dryand. 20*.

** *Frondes divisées.*

2. rigescens, Willd. 29.
3. quadrangularis, Radd. 29.
4. trapeziformis, Dryand. 29.
5. horizontalis, Hook. 29.
6. Gardneri, Hook. 29.
7. curvans, F. 30, 20*.
8. stricta, Dryand. 30.
† 9. dentata, F. 20*.
10. Raddiana, Klotz. 30.
11. Catharinæ, Hook. 30.
† 12. ovoidea, F. 21.
13. consanguinea, F. 30.
14. Guyanensis, Dryand. 31.

VI. ADIANTÉES.

20. Adiantum, L.

* *Synechia.*

1. macrophyllum, Sw. 31, 262.
2. platyphyllum, Sw. 31.
3. lucidum, Sw. 32.
4. Jacobinæ, F. 32.
5. pulverulentum, L. 32, 22*.
6. Claussenii, F. 32.
7. Seemanni, Hook. 22*.

** *Apotomia.*

A. *Frondes pinnées.*

8. obliquum, Willd. 32.
9. macrodon, Klfss. 32.
10. Flagellum, F. 33, 22*.
11. rhizophytum, Schrad. 33.
12. delicatulum, Mart. 33, 22*.
† 13. subaristatum, F. 33.

B. *Frondes pluripinnées.*

14. subcordatum, Sw. 33.
    var. latius, obtusum et lobatum.
15. truncatum, Radd. 34.
16. trapeziforme, L. 34.
    var. β pentadactylon, L. Fisch. 34.
17. cultratum, Hook. 34.
18. curvatum, Klfss. 34, 22*.
19. deflectens, Mart. 34.
20. sinuosum, Hook et Gardn. 35.
21. tetragonum, Schrad. 35.
22. pensile, Kze. 35.
23. intermedium, Sw. 35, 262, 23*.
24. Brasiliense, Radd. 35.
† 25. subramosum, F. 36.
26. prionophyllum, H. B. Kth. 36.
27. pectinatum, Kze. 23*.
28. rhomboideum, H. B. Kth. 36.
29. fructuosum, Kze. 36.
30. polyphyllum, Willd. 23*.
31. glaucescens, Klotz. 37.
32. proximum, Gaud. 37.
† 33. tomentellum, F. 37.
34. Æthiopicum, L. 23*.
35. angustatum, Klfss. 37.
36. gracile, F. 37.
37. hirtum, Klotz. 37.
38. calcareum, Gardn. 37.
39. incisum, Presl. 38.
40. obtusum, Desv. 38, 24*.
41. extensum, F. 38.
42. lunulatum, Burm. 38, 24*.
43. dolabriforme, Hook. 38.
44. cuneatum, Langs. Fisch. 38, 24*.
45. Capillus-Veneris, L. 38.

21. Hewardia, J. Sm.

1. dolosa, Kze. 39, 24*.
† 2. diphylla, F. 39.

22. Cassebeera, Klfss.

1. triphylla, Lmrk. 39.
2. pinnata, Klfss. 40.
3. Gleichenioides, Hook. 40.

VII. PTÉRIDÉES.

23. Pteris, L.

* *Frondes pinnées, pinnules entières.*

1. Cretica, L. var. Americana, Agh. 40, 25*.
2. litobrochioides, Klotz, 25*.

** *Frondes bi-, tri-, quadripinnées*

3. heterophylla, L. 40.
4. gracilis, F. 40, 25*.
5. quadriaurita, Willd. 40.
6. nemoralis, Willd. 262.
7. deflexa, Lk. 41.
8. Gaudichaudii, Agh. 41.
9. pilosiuscula, Desv. 41.
10. rostrata, L. 41, 262.
† 11. platychlamys, 25*.

*** *Aquilinaires.*

12. esculenta, Forst. 41, 26*.
13. arachnoidea, Klfss. 42, 26*.
14. caudata, L. 42.
15. psittacina, Presl. 42.

24. Pellæa, Lk.

A. *Doryopteridastrum.*

1. quinquelobata, F. 42.
2. geraniæfolia, Radd. 43.
† 3. Itatiaiensis, F. 26*.
† 4. crenulans, F. 27*.
5. lomariacea, Kze. 43.
† 6. microphylla, F. 43.
† 7. paradoxa, F. 43, 28*.

B. *Eupellæa.*

† 8. flavescens, F. 44, 262, 28*.
† 9. subsimplex, F. 44.

25. Doryopteris, J. Sm.

1. sagittifolia, Radd. 45.
2. hastata, Radd. 45, 29*.
3. Raddiana, F. 45, 29*.
var. patula et multipartita. 45, 29*.
† 4. angularis, F. 29*.
† 5. rediviva, F. 30*.
† 6. patula, F. 30*.

26. Litobrochia, Presl.

1. splendens, Klfss. 45, 31*.
† 2. Organensis, F. 240.
† 3. præalta, F. 46.
4. Brasiliensis, Radd. 47, 262, 31*.
† 5. dissimilis, F. 31*.
6. denticulata, Sw. 47, 262, 32*.
7. leptophylla, F. 47.
8. gigantea, Willd. 47, 262, 32*.
9. decurrens, Radd. 47.
10. biformis, Splitg. 47.
† 11. horizontalis, F. 48.
† 12. sericea, F. 48, 32*.
13. angustata, F. 49, 32*.
† 14. varians, F. 49, 33*.
15. aculeata, Sw. 50.
16. polita, Lk. 50.
17. biaurita, L. 50.
18. elegans, Sw. 50, 33*.
19. pallida, Presl. 50, 33*, 241.

27. Lonchitis, L.

1. macrochlamys, F. 51.
2. Lindeniana, Hook. 51, 33*.

VIII. CHEILANTHÉES.

28. Adiantopsis, F.

1. dichotoma, Poir. 51.
2. radiata, L. 51.
3. monticola, Gard. 51.
4. spectabilis, F. 52.
† 5 obtusissima, F. 52, 34*.
6. regularis, Th. Moor. 34*.
7. incisa, Th. Moor. 34*.

29. Hypolepis, Bernh.

1. repens, L. 52, 34*.
† 2. parviloba, F. 53, 34*.
3. Dicksonioides, F. 55, 34*.
† 4. serrata, F. 53, 35*.
5. rigescens, Kze. 35*.
† 6. stolonifera, F. 35*.

30. Myriopteris, F.

1. paleacea, F. 54.

31. Aleuritopteris, F.

1. farinosa, F. 36*.

32. Cheilanthes, Sw.

1. flexuosa, Kze. 54.
† 2. glaberrima, F. 54.
3. micropteris, Sw. 54.
4. Tweediana, Hook. 55, 37*.
5. glandulifera, F. 55, 36*.
† 6. aquilinaris, F. 37*.
7. ? hirsuta, Lk. 38*.
8. ? Sellowiana, Presl. 38*.

33. Nothochlæna, Hook. Gr.

1. Pohliana, Kze. 55.
2. rufa, Presl. 55.
3. eriophora, F. 55.

34. Jamesonia, Hook et Gr.

1. scalaris, Kze. 55, 38*.
2. adnata, Kze. (*espèce tardivement reçue et non insérée dans le texte.*)

IX. HÉMIONITIDÉES.

35. Trismeria, Lk.

1. argentea, F. 56.

36. Nevrogramme, Lk.

1. tomentosa, Lk. 56, 38*.
2. rufa, Lk. 57.
† 3. scandens, F. 263, 39*.

X. ANTROPHYÉES.

37. Antrophyum, Klfss.

1. Cayennense, Desv. 57.
2. lineatum, Klfss. 57, 39*, 241.
3. subsessile, Kze. 57.

XI. LEPTOGRAMMÉES.

38. Pterozonium, F.

1. reniforme, F. 57.

39. Hecistopteris, J. Sm.

1. pumila, J. Sm. 58.

40. Gymnogramme, Desv.

1. asplenioides, Sw. 58, 39*.
2. polypodioides, Spreng. 58.
† 3. oppositans, F. 58.
† 4. attenuata, F. 59, 263, 39*.
5. pteridioides, F. 59.
6. Sellowiana, Metten., 39*.
† 7. patula, F. 59, 40*.
8. insignis, Metten. 40*.
† 9. expansa, F. 60.
10. myriophylla, Sw. 60.

41. Glaphyropteris, Presl.

1. decussata, L. subpolypodia, 40*.

42. Ceropteris, Lk.

1. calomelæna, Lk. 60.
2. tartarea, Lk. 60.
3. distans, Lk. 60.

43. Anogramme, Lk.

1. villosa, F. 61.
2. Chærophyllum, Desv. 41*.
3. Biardii, F. 241*.

XII. ASPLÉNIÉES.

44. Athyrium, Roth.

1. decurtatum, Presl. 61.
2. incisum, F. 41*.

45. Asplenium, L.

* *Frondes simples.*

A. *Une nervure marginale.*

1. Raddii, F. 61.

B. *Point de nervure marginale.*

2. crenulatum, Presl. 61, 263.
3. angustum, Sw. 62.

** *Frondes simplement pinnées.*

A. *Grandes formes.*

† 4. Escragnollei, F. 62. 42*.
† 5. camptocarpon, F. 62, 42*.
6. oligophyllum, Klfss. 63.

B. *Frondes de médiocre grandeur.*

7. salicifolium, L. 64, 42*.
8. cirrhatum, Cl. Rich. 64, 42*.
9. gibbosum, F. 64, 42*.
10. anisophyllum, Kze. 64.
† 11. stenocarpon, F. 64.
12. auriculatum, Sw. 65.
13. macrodon, F. 65, 43*.
14. harpeodes, Kze. 65, 43*.
15. abscissum, Willd. 43*.
16. falx, Desv. 65.
17. regulare, Sw. 66, 43*.
18. Brasiliense, Radd. 66.
19. pteropus, Klfss. 66.

20. firmum, Kze. 66, 43*.
21. alatum, H. B. Kth. 67, 43*.
22. repandulum, Kze. 67.
23. auritum, Sw. 67, 44*, 242 var. plures.
† 24. incisuratum, F. 44*.
25. rhizophorum, L. 67.
26. sanguinolentum, Kze. 67.
27. Sellowianum, Presl. 68.
28. jucundum, F. 68, 44*.
† 29. Serronii, Glaz. 68, 44*.
30. pulchellum, Radd. 68, 44*.
31. Trichomanes, L. var. Brasiliensis, 45*.

C. *Falcaria.*

32. Serra, Langsd. et Fisch. 69, 45*.
33. caudatum, Forst. 45*.
† 34. incurvatum. F. 69.
35. præmorsum, Sw. 70.
36. Schkhurianum, Presl. 46.

D. *Frondes allongées, pendantes.*

37. mucronatum, Presl. 70.

*** *Frondes bi-, tripennées.*

38. Hallii, Hook. 45*.
39. sulcatum, Lmrk. 70, 46*.
40. cuneatum, Lmrk. 70, 46*.
† 41. Gastonis, F. 70.
42. trapezoides, Sw. 46*.
43. angustatum, Presl. 71.
† 44. chærophylloides, F. 71.
† 45. ovalescens, F. 72, 46*.
46. fragrans, Sw. 72.
47. pseudo-nitidum, Radd. 46*.
48. pumilum, Sw. 46*.

D. *Dareastrum.*

* *Frondes pinnées.*

49. monanthemum, Sw. 72, 47*.
50. formosum, Willd. 73, 263.

** *Frondes bi-, tri-, quadripennées.*

51. fœniculaceum, H. Bl. Kth. 73.
52. rachirhizon, Radd. 73.
53. adiantoides, Radd. 73, 263.
54. scandicinum, Klfss. 73, 47*.
55. cicutarium, Sw. 73, 263.

46. Hemidictyon, Presl.

1. marginatum, Presl. 73.

XIII. SCOLOPENDRIÉES.

47. Antigramme, Presl.

1. repanda, Presl. var. discreta, F. 74, 47*.
2. lancifolia, Presl. 74.
3. Douglasii, Hook. 74, 48*.
4. populifolia, Presl. 74.
5. Lageana, F. 264, 48*.

XIV. DIPLAZIÉES.

48. Diplazium, Sw.

* *Frondes simples.*

1. plantagineum, Sw. var. β serratum, F. 75, 264.

** *Frondes pinnées.*

2. Callipteris, F. 75, 48*.
3. grandifolium, Sw. 75, 48*.
† 4. dissimile, F. 76, 48*.
5. celtidifolium, Kze. 76, 48*.
† 6. parallelogrammum, F. 76, 48*.
† 7. longipes, F. 77.

*** *Frondes pinnées-pinnatifides.*

8. mutilum, Kze. 78.
9. radicans, Desv. 78.
10. Rœmerianum, Presl. 78.
11. striatum, L. 78.
12. biserratum, Presl. 78.
13. costale, Sw. 78.
14. Tussaci, F. 79.

**** *Frondes pluripinnées.*

15. ambiguum, Radd. 79.
16. expansum, Willd. 79, 264.
† 17. leptochlamys, var. β leptorachis, F. 79, 49*.
† 18. herbaceum, F. 80, 49*.
† 19. delicatulum, F. 49*.
† 20. leptocarpon, F. 80.
† 21. rostratum, F. 81, 49*.
22. remotum, F. 81.

49. Didymochlæna, Desv.

1. sinuosa, Desv. var. microtheca, F. 82.

XV. MÉNISCIÉES.

50. Meniscium, Schrad.

1. reticulatum, Sw. 83, 50*.
2. macrophyllum, Kze. 83.
3. rostratum, F. 83.
4. sorbifolium, Jacq. 83.
† 5. elongatum, F. 83.
6. sessilifolium, Pohl. 84.
† 7. longifolium, F. 84.

XVI. POLYPODIÉES.

51. Grammitis, Sw.

* *Frondes entières.*

1. punctata, Radd. 85.
2. Organensis, F. 264, 51*.
† 3. Wittigiana, F. Glaz. 50*.
† 4. muscosa, F. 51*.
† 5. Fluminensis, F. 85.
6. marginella, Sw. 51*.
† 7. paucinervata, F. 51*.
8. setosa, Klfss. 51*.

** *Frondes divisées.*

9. furcata, Hook et Grev. 52*.

52. Polypodium, L. emend.

* *Frondes pinnatifides.*

A. *Dressées.*

1er type : Polypodium vulgare, L.

† 1. extensum, F. 85.
† 2. gratum, F. 242.
† 3. typicum, F. 52*.
4. tenuiculum, F. 86, 265, 53*.
5. argyratum, Bory. 265 var. Brasiliensis, F. 53*.
6. Spixianum, Mart. 86.
† 7. Pleopeltidis, F. 86, 53*.
† 8. longipes, F. 53*.
9. Peruvianum, Desv. 242, 265.
† 10. repandum, F. 87, 54*.
† 11. hirsutulum, F. 87, 265, 54*.
† 12. villosum, F. 54*.

2e type : P. trichomanoides, Sw.

13. trichomanoides, Sw. 88.
14. moniliforme, Cav. 88.
† 15. angustissimum, F. 55.*
† 16. immersum, F. 88, 265, 55*.
17. blandum, F. 265.
† 18. subdicarpon, F. 55*.
19. Serricula, F. 89, 243.
† 20. exiguum, F. 89, 56*.
† 21. confluens, F. 89, 56*.
22. Organense, Metten. 90.
23. pilosissimum, Mart. Gal. 90.

3e type : P. pectinatum, L.

* *Grandes formes.*

24. pectinatum, L. 90, 56*.
25. Paradisiæ, Langs. et Fisch. 90.
† 26. Paradisiastrum, F. 90, 56*.
27. recurvatum, Klfss. 91, 56*.
28. ? otites, L. 91, 57*.
29. Plumula, Willd. 91.
† 30. robustum, F. 92, 57*.
31. meridense, Klotz. 57*.

** *Petites formes.*

32. Filicula, Klfss. 92.
† 33. heteroclitum, F. 93, 243.
34. Schkhurii, Radd. 93.
35. Pecten, F. 57*.
† 36. acrodontium, F. 58*.

4e type : P. chnoophorum, Kze.

37. chnoophorum, Kze. 93.
38. sublanosum, Hook. 93.
† 39. pilosum, F. 58*.

B. *Pendantes; sacculus pileux.*

40. pendulum, Sw. 93.
41. suspensum, L. 93.

42. cultratum, Willd. 94, 243.
† 43. ciliare, F. 94, 59*.
† 44. ovalescens, F. 94, 59*.
45. semi-adnatum, Hook. 95, 59*.
46. apiculatum, Kze. 95.

** *Frondes pinnées-pinnatifides.*

45. achilleæfolium, Klfss. 59*.

53. Phegopteris, F.

* *Frondes pinnées-pinnatifides.*

A. *Fr. plus ou moins étroites.*

1. prionitis, Kze. 96.
2. Tijuccana, Radd. 96.
3. flavo-punctata, Klfss. 96, 59*.
4. Blanchetiana, F. 97.
† 5. Fluminensis, F. 97.
† 6. oreopteridastrum. F. 97.
7. pubescens, Radd. 98.
† 8. tricholepis, F. 98.
9. rivulorum, Radd. 98.
10. falciculata, Radd. 99.
11. pteroidea, Klotz. 60*.

B. *Frondes larges.*

12. macroptera, Klfss. 99.
† 13. tenuis, F. 99.
† 14. denticulata, F. 100.
† 15. heterocarpa, F. 100.
* 16. brevinervis, F. 243.

** *Frondes bi-, tripennées.*

17. splendida, Klfss. 101. 60*.
18. connexa, Klfss. 101, 60*.
19. canescens, Kze. 101.
20. subincisa, Mart. 101.
† 21. camptocaulon, F. 60*.
22. mollivillosa, F. 101.
23. caudata, Klfss. 102.
† 24. scrobiculata, F. 102.
25. eriopodia, F. 102.
† 26. adnata, F. 103.
27. propinqua, F. 103.
28. hirsuta, Baker. 61*.

*** *Frondes pluripennées.*

29. spectabilis, Klfss. 103.
30. epireoides, F. 104.
31. divergens, Sw. 104, 61*.
† 32. marginans, F. 104.

54. Goniopteris, Presl.

1. prolifera, Klfss. 105.
2. tetragona, Presl. 105.
† 3. macrocladia, F. 106.
† 4. platypes, F. 106.
† 5. hastata, F. 107, 61*.

55. Goniophlebium, Presl.

* *Polylépidées* (*polypodiastrum*).

1. incanum, J. Sm. 107.
2. microlepis, F. 107.
3. ceteraccinum, F. 107.
4. lepidopteris, Th. Moor. 108.
5. hirsutissimum, F. 108, 265, 62*.

** *Oligolépidées* (*Eugoniophlebium*)

A. *Frondes pinnatifides.*

6. xiphophorum, Kze. 108.
7. Catharinæ, J. Sm. 108.
† 8. pictum, F. 244.
9. pectinatum, J. Sm. 108.
10. latipes, J. Sm. 108, 62*.
11. lætum, J. Sm. 109, 62*.
12. loriceum, J. Sm. 109.
13. chnoodes, Spreng. 109.
† 14. pectinans, F. 109.
† 15. grammatoides, F. 110, 63*.
† 16. demissum, F. 63*.

B. *Frondes pinnées.*

17. meniscifolium, Langs. Fisch. 110, 63*.
18. neriifolium, Schk. 110.
† 19. excelsior, F. 244.
20. fraxinifolium, Jacq. 111.
21. dissimile, L. 111, 64*.
22. albo-punctatum, J. Sm. 111, 64*.
23. hirsutulum, Th. Moor. 111.
24. rhizocaulon, Presl. 112.
25. elatius, Th. Moor. 112, 64*.
26. articulatum, Presl. 112.
† 27. Gauthieri, F. 112.

56. Campylonevron, Presl.

* *Frondes simples.*

A. *Nervation à une seule courbe.*

1. angustifolium, F. 113, var. tenerum, Glaz.

B. *Nervation à deux courbes.*

2. tæniosum, F. 113.
† 3. leuconevron, F. 113.
4. lucidum, Th. Moor. 114, 64*.

C. *Nervation à trois ou quatre courbes.*

5. fasciale, Presl. 114.
† 6. fallax, F. 114, 245.

D. *Nervation à quatre ou cinq courbes.*

7. repens, Presl. 115, 64*.
8. decumanum, F. 115.

E. *Nervation à cinq ou six courbes.*

9. Phyllitidis, Presl. 115, 65*.
† 10. acrocarpon, F. 115.

F. *Nervation à sept ou huit courbes.*

11. crispum, F. 116.

G. *Nervation à neuf ou dix courbes.*

12. nitidum, Presl. 116.

H. *Nervation à dix ou douze courbes.*

13. latum, Th. Moor. 116, 65*.

** *Frondes pinnées.*

A. *Nervation à cinq ou six courbes.*

14. decurrens, Presl. 116.

B. *Nervation à huit ou neuf courbes.*

† 15. juglandifolium, F. 117, 265.

57. Craspedaria, Lk.

1. piloselloides, F. 118.
2. auriseta, F. 118, 65*.
3. Gestasiana, F. 118.
4. ciliata, Lk. 118.
† 5. camptocarpa, F. 65*.
6. vaccinifolia, Lk. 118.
† 7. cordifolia, F. 118.
† 8. crispata, F. 119, F. 66*.
† 9. grandis, F. 119, 66*.

58. Chrysopteris, Lk.

1. aurea, Lk. 120.
2. areolata, Lk. 120.
3. Martinicensis, F. 120.
4. pulvinata, Lk. 120.
5. Raddiana, F. 120.

59. Drynaria, Bory.

* *Frondes simples.*

1. percussa, F. 120, 66*.
2. exul, Metten, 67*.
3. Moricandii, Mett. 121.
4. Schomburgkiana, Kze. 121.
5. lepidota, Schlech. 121, 245, 67*.
6. elongata, F. 121.
7. Linbergii, Mett. 67*.
8. iteophylla, F. 121, 67*.
9. persicariæfolia, F. 121.
10. acuminata, F. 122.

** *Frondes pinnatifides.*

11. Raddiana, F. 122.

60. Pleuridium, F.

1. crassifolium, F. 123.

61. Heteropteris, F.

† 1. Doryopteris, F. 123, 67*.

XVII. CYCLODIÉES.

62. Polystichum, Roth.

I. Eupolystichum.

§ 1. Mutiques : *Tectaria*, Cav.

1. coriaceum, Schott, et les var. platychlamys, acuminatum et callochlamys. 124, 68*.
† 2. remotum, F. 125.
† 3. quadrangulare, F. 68*.

§ 2. *Aristées.*

† 4. aculeatum, Roth. 125.
† 5. microsorium, F. 125.
† 6. Rochaleanum, F. 69*.

II. Phegopteroides.

† 7. lanosum, F. 126, 69*.
8. caudatum, Cav. 127, 69*.
† 9. Tijucense, F. 127.
† 10. giganteum, F. 127.
† 11. aculeolatum, F. 128.
† 12. platylepis, F. 129, 70*.
† 13. longecuspis, F. 129.
14. platyphyllum, Willd. 130.
15. crispatum [1], F. (non décrite).

63. Phanerophlebia, Presl.

† 1. aurita, F. 70*.

64. Hemicardion, F.

1. Nephrolepis, F. 70*.

65. Cyclodium, Presl.

1. meniscioides, Presl. 71*.

66. Cyrtomium, Presl.

1. abbreviatum, F. 131.

67. Bathmium, Lk.

1. plantagineum, F. 131.

XVIII. ASPIDIÉES.

68. Aspidium, Sw. emend.

A. *Indusium glabre.*

† **Oochlamys.**

1. rivulorum, Radd. 131, 71*.
2. conterminum, Desv. 132.
† 3. helveolum, F. 132, 74*.
† 4. elatior, F. 132.
† 5. platyrachis, F. 71*.
6. Berteroanum, F. 133.

†† **Euaspidium.**

* *Frondes pinnées.*

7. Imrayanum, Hook. 133.
8. brachynevron, F. 133.

** *Frondes pinnées-pinnatifides.*

9. vestitum, Radd. 134.
† 10. tenerrimum, F. 134, 74*.
11. falciculatum, Radd. 135.
12. Filix-mas, L. 135.
13. parallelogrammum, Kze. 135, 72*.
† 14. basilare, F. 135.
† 15. nervatum, F. 136.
† 16. eriocaulon, F. 136, 75*.
† 17. amaurolepis, F. 137, 75*.
† 18. Isabellinum, F. 137.
† 19. nephrodioides, F. 138, 75*.

*** *Frondes tri-ternées.*

20. cicutarium, Willd. 138.

**** *Frondes bi- ou pluripinnées.*

† 21. flexuosum, F. 138, 75*.
† 22. biforme, F. 139, 75*.
23. acutum, Hook. 139.
† 24. crenulans, F. 139.
25. consobrinum, F. 140.
† 26. phæochlamys, F. 140, 75*.
† 27. ramosum, F. 141, 75*.
† 28. macrum, F. 141.
† 29. latissimum, F. 142, 75*.
† 30. Dicksonioides, F. 143.
31. furcatum, Klotz. 143.

B. *Indusium villeux.*

32. patens, Radd. 143, 72*.
33. conspersum, Schrad. 143, 72*.
34. oligocarpon, Willd. 144.
35. Germani, L'herm. 144.
36. violascens, Lk. 144.
37. Kaulfussii, Lk. 144.
38. ctenitis, Lk. 144.
39. tetragonum, Hook. 144.
† 40. sericeum, F. 144.
† 41. Tijucense, F. 72*.
† 42. rivularioides, F. 145.
† 43. quadrangulare, F. 145.
44. pubescens, Radd. 73*.
† 45. eriosorus, F. 73*.

††† *Espèces se rapprochant des Polystichum.*

† 46. gracilipes, F. 146, 74*.
47. tenerum, F. 147.
48. denticulatum, Sw. 147, 74*.
49. amplissimum, Hook. 147.

69. Cystopteris, Bernh.

1. Brasiliana, Presl. 147.
2. emarginulata, Presl. 147.

70. Lepidonevron, F.

1. longifolium, F. 147.
2. obtusatum, F. 147.
3. rufescens, F. 148, 76*.
4. sesquipedale, F. 148.

71. Oleandra, Cav.

1. nodosa, Presl. 148.
2. hirta, Brak. 77*.

72. Nephrodium, Rich.

1. molle, Schott. 148, 77*.
2. Pohlianum, Presl. 148, 77*.
3. chrysolobum, Lk. 149.

73. Sagenia, Presl.

1. sorbifolia, Presl. 149.

74. Cardiochlæna, F.

1. macrophylla, Sw. 149.
2. pilosa, F. 150.

XIX. NÉPHROLÉPIDÉES.

75. Nephrolepis, Schott.

1. exaltata, Schott. 150, 77*.
2. Schkhurii, Lk. 150.
3. pendula, F. 151.
4. intermedia, F. 151.
5. neglecta, Kze. 151.
6. tuberosa, Presl. 77*.
7. biserrata, Sw. 78*.

76. Saccoloma, Klfss.

1. elegans, Klfss. 151.

XX. DAVALLIÉES.

77. Microlepia, Presl.

* *Frondes bipinnées.*

1. Fluminensis, F. 151, 76*.
2. lindsayæformis, F. 152.

** *Frondes tri- ou pluripinnées.*

3. inæqualis, F. 152.
4. distans, F. 152.
5. polypodioides, Presl. 152.

78. Davallia, Sm.

1. Corcovadensis, Lodd. 152.
2. Schimperi, Hook. 78*.
3. Sprucei, Hook. et Baker. 78*.

79. Stenoloma, F.

1. bifida, Klfss. 153.
† 2. Glaziovii, F. 153, 79*.
3. gratissima, F. 153.

XXI. DICKSONIÉES.

80. Dicksonia, Lher.

1. cicutaria, Sw. 154, var. plures. 154.
2. rubiginosa, Klfss. 154.
3. dissecta, Sw. 154.
4. cicutarioides, F. 155.
5. apiifolia, Sw. 155, 79*.

81. Balantium, Presl.

1. Sellowianum, Presl. 155, 79*.
2. Martianum, Klotz. 155.

XXII. ALSOPHILÉES.

A. *Eualsophilées.*

82. Alsophila, R. Br.

* *Segments à marge dentée ou à peine dentés au sommet.*

1. Miersii, Hook. 156.
2. procera, Klfss. 156.

[1] Espèce tardivement reçue qui pendant la vie se présente crêpue dans toutes ses parties.

3. arbuscula, Presl. 156.
4. pungens, Klfss. 157.
5. Hookeriana, Klotz. 157.
† 6. scrobiculata, F. 157, 80*.
7. Pœppigii, Hook. 157.
8. villosa, Desv. 158.
9. rigidula, Mart. 158.
† 10. aperta, F. 158, 80*.
† 11. flexuosa, 159.
12. Gardneri, Hook. 159.
13. infesta, Kze. 159.
14. radens, Klfss. 160.
15. setosa, Klfss. 160.
16. plagiopteris, Mart. 160.
17. pycnocarpa, Kze. 160.
18. phalerata, Mart. 160.
† 19. Glaziovii, F. 160.
† 20. leptocladia, F. 161, 80*.
† 21. eriocarpa, F. 162.
22. Corcovadensis, F. 163, 80*.
† 23. Ceropteris, F. 163.
† 24. dichromatolepis, F. 164, 80*.
† 25. impressa, F. 165, 81*.
† 26. Unguis cati, F. 165.
27. compta, Mart. 166.
28. nigra, Mart. 166.

** *Segments dentés et crénelés.*

29. armata, Presl. 166.
† 30. rufa, F. 166.
† 31. contracta, F. 167.
32. aculeata, J. Sm. 168.
33. leucolepis, Mart. 168.
34. paleolata, Mart. 168.
35. hirta, Klfss. 168.
36. axillaris, Radd. 168.
† 37. pectinata, F. 168.
† 38. Ludoviciana, F. 170.
† 39. glumacea, F. 170.
† 40. nigrescens, F. 170, 265.
41. Mexicana, Mart. 171.
42. Blanchetiana, Presl. 171.
† 43. Tijucensis, F. 171.
† 44. decipiens, F. 80*.
45. Guimaraensis, F. 81*.

83. Lophosoria, Presl.

1. pruinata, Presl. 172, 82*.
2. caesia, Presl. 172, 82*.
† 3 dorsalis, F. 173, 83*.
† 4. prostrata, 173.
† 5. acaulis, F. 174.
6. affinis, Presl. 174.

84. Trichopteris, Presl.

1. excelsa, Mart. 174.
2. elegans, Presl. 175, 265, 85*.
3. crenata, Pohl. 175.

85. Amphidesmium, Schott.

1. Paskeri, Schott. 175.

B. *Hémithéliées.*

86. Hemithelia, Presl.

1. Gardneriana, Presl. 175, 265, 83*.
2. Sellowiana, Presl. 175, 83*.
3. macrocarpa, Presl. 175.
4. multiflore, R. Br. 84*.
5. platylepis, Hook. 84*.

87. Hemistegia, Presl.

1. insignis, F. 175.
2. Willdenowii, 84*.

XXIII. CYATHÉES.

88. Cyathea, Sm.

* *Segments à marge entière.*

1. arborea, Sm. 176.
Var. β Steinbergii, Pohl.
2. Gardneri, Hook. 176.
† 3. mamillata, F. 176.
4. acanthomelas, F. 177.
† 5. Taunaysiana, F. 178.
6. attenuata, F. 178.

** *Segments dentés.*

† 7. Feei, Glaz. 179.
8. Serra, Willd. 180.
9. vestita, Mart. 180.
10 Mexicana, Schlech. 180.
11. Schanschin, Mart. 180.
12. hirtula, Mart. 180.
† 13. sphœrocarpa, F. 181.
14. incurvata, Kze. 181.
15. monticola, Presl. 181.
16. Beyrichiana, Presl. 181.
† 17. leucosticta, F. 182.
† 18. abrupte caudata, F. 183.
19. denticulata, Goldm. 183.

XXIV. CÉRATOPTÉRIDÉES.

89. Ceratopteris, Brong.

1. thalictroides, Brong. 84*.

II. HYMÉNOPHYLLACÉES.

I. TRICHOMANOÏDÉES.

90. Hymenostachys, Bory.

1. diversifrons, Bory, 184.
2. Humboldtii, V. d. Bosch. 184.

91. Nevrophyllum, Presl.

1. Hedwigii, V. d. Bosch. 185.
2. pennatum, Klfss. 185.
3. abruptum, F. 185.

92. Trichomanes, Presl.

* *Frondes dressées, souples.*

1. incisum, Willd. 185.
2. Bancroftii, Hect. Gr. 185.
3. bicorne, Hook. 185.
4. sinuosum, Willd. 186.
5. pellucens, Kze. 186.
† 6. auratum, F. 186.
7. crispum, L. 186.
8. cristatum, Klfss. 186, 266.
9. pilosum, Radd. 187.
10. Martiusii, Presl. 187.
11. Plumula, Presl. 187.
12. Sellowianum, Presl. 187.
† 13. Tranninense, F. 187.
14. pyxidiferum, L. 187.
† 15. acrocarpon, F. 188.
16. emarginatum, Presl. 188.
17. Brasiliense, Desv. 188.
18. leptophyllum, V. d. Bosch. 188.
19. Schiedeanum, C. Mull. 188.
20. tenerum, Spreng. 188.

** *Frondes dressées, raides, toujours pluripennées.*

21. rigidum, Sw. 189.
22. Prieurei, Kze. 189, 265.
† 23. Serricula, F. 189.
24. anceps, Hook. 189.

*** *Frondes couchées, radicantes.*

25. radicans, Sw. 189.
26. brachypus, Kze, 190.
27. Luschnathianum, Presl. 190.
28. abrotanifolium, V. d. Bosch. 190.
† 29. frondosum, F. 190.
F 30. læte-virens, F. 191.

93. Didymoglossum, Presl.

1. pumilum, V. d. Bosch. 191.
2. nummularium, V. d. Bosch. 191.
3. quercifolium, H. et Gr. 191.
† 4. sociale, F. 85*.

II. HYMÉNOPHYLLÉES.

94. Leptocionium, Presl.

1. fucoides, Presl. 192.
2. attenuatum, Hook. 192.

95. Hymenophyllum, Sw.

* *Euhymenophyllum.*

1 Sturmii, V. d. Bosch. 192.
2. asplenioides, Sw. 192, 85*.
† var. β palmatum, F. 192.
3. megachilum, Presl. 193.
4. pusillum, Schott. 193.
5. aculeolatum, V. d. Bosch. 193.
6. hirsutum, Sw. 193, 266.
7. Willsoni, Hook. 193, 266.
† 8. delicatissimum, F. 86*.
† 9. notabile, F. 193.
10. angustum, V. d. Bosch. 194.
11. elegans, Spreng. 194.
12. Organense, Hook. 194.
† 13. viridissimum, F. 194.

14. Jalappense, Schlecht. 195, 266, 86*.
15. polyanthos, Sw. 195, 86*.
16. crispum, H.-B. Kth. 195, 266.
† 17. microcarpon, F. 245.
18. ectocarpon, F. 266.
19. Boryanum, Willd. 195.
† 20. podocarpon, F. 196, 266.
† 21. producens, F. 196.

** *Sphærocionium*, Presl.

22. caudiculatum, Mart. 197, 86*.
β productum, Presl. 197.
23. plumosum, Klfss. 197.
24. lineare, Sw. 197.
25. remotum, V. d. Bosch. 197.
26. Surinamense, V. d. Bosch. 197.
27. commutatum, Presl. 197.
28. caulopteron, F. 197, 87*.
† 29. rufum, F. 198, 266, 87*.

III. GLEICHÉNIACÉES.

96. Mertensia, Willd.

* *Segments glabres inférieurement.*

1. pectinata, Willd. 198.
2. dichotoma, Willd. 199.
3. rubescens, Mart. 199.
† 4. scalpturata, F. 199.
5. furcata, Willd. 200, 87*.
† 6. longipes, F. 87*.
7. remota, Klfss. 200.
8. rufinervis, Mart. 200.
9. revoluta, H.-B. Kth. 200.
† 10. spissa, F. 200.
† 11. trifurcans, 201.

** *Segments tomenteux inférieurement.*

12. nervosa, Klfss. 201.
13. lanuginosa, Moric. 202.
14. rigida, J. Sw. 202.
15. pubescens, H.-B. Kth. 202.
† 16. squamosa, F. 202.
17. bifida, Spreng. 203.
18. longipinnata, Klotz. 203.
19. gracilis, Mart. 203.
20. latissima, F. 203, 88*.
21. pennigera, Mart. 204.

IV. SCHIZÉACÉES.

I. EUSCHIZÉACÉES.

97. Actinostachys, Wall.

1. pennula, Hook. 204.
2. subtrijuga, Presl. 204.

98. Schizæa, Sw.

1. bifida, Sw. 205.

99. Lophidium, Rich.

1. spectabile, Presl. 205.
2. pacificans, Presl. 205.
3. flabellum, Presl. 205.
4. elegans, Presl. 205.

II. ANEIMIACÉES.

100. Aneimia, Sw.

* *Coptophyllum.*

1. millefolium, Gardn. 205.
2. triniæfolia, Gardn. 206.
3. dichotoma, Gardn. 206.

*** *Euaneimia.*

† 4. microstachys, F. 206.
5. rotundifolia, Schrad. 206, 88*.
6. humilis, Sw. 206.
† 7. Glaziovii, F. 207.
8. oblongifolia, Sw. 207.
9. glareosa, Gardn. 207.
10. Gardneri, Hook., 207.
11. rutæfolia, Mart. 208.
12. deltoidea, Sw. 208.
13. Raddiana, Lk. 208, 89*.
Var. tomentosa, Sw. 208, 266.
14. Cheilanthoides, Klfss. 208.
15. fulva, Sw. 209.
16. radicans, Radd. 209, 266.
17. collina, Radd. 209, 266.
18. pilosa, Mart. Gal. 209.
19. filiformis, Sw. 209.
20. ciliata, Presl. 210, 89*.
21. incisa, Schrad. 210.
22. tenuifolia, Presl. 210.
23. tenella, Sw. 210.
24. Schraderiana, Mart. 210.
25. Langsdorffiana, Presl. 210.
26. Brenteliana, Presl. 210.
27. Mandioccana, Radd. 211.
28. trichorhiza, Hook. 211.
29. adiantifolia, Sw. 89*.

101. Aneimiædictyon, Presl.

1. Phyllitidis, Sw. 211, 89*.
Var. plures.
2. Tweedieanum, T. Moor. 211.
3. hirtum, Sw. 211.

102. Aneimiæbotrys, F.

† 1. aspera, F. 267, 89*.

103. Trochopteris, Gardn.

1. elegans, Gardn. 212.

V. LYGODIACÉES.

104. Lygodium, Sw.

1. volubile, Sw. 112.
2. hastatum, Desv. 212, 90*.
3. hirtum, Klfss. 213.
4. venustum, Sw. 213.
Var. β spiciferum.
5. Pohlianum, Presl. 213, 90*.

VI. MARATTIACÉES.

105. Gymnotheca, Presl.

1. cicutæfolia, Presl. 214, 90*.
2. Raddiana, Presl. 214.
3. polyodon, Presl. 214.
4. obtusidens, Presl. 214.

VII. DANÆACÉES.

107. Danæa, Sw.

* *Frondes simples.*

1. simplicifolia, Rudg. 215.

** *Frondes pinnées.*

2. longifolia, Desv. 215, 90*.
3. elliptica, Sw. 215.
4. dubia, Presl. 216.
† 5. cordata, F. 216.
6. Sellowiana, Presl. 216.
7. alata, Sm. 216.
8. stenophylla, Kze. 216.

108. Danæopsis. Presl.

1. paleacea, Presl. 217.

VIII. OSMONDACÉES.

109. Osmunda, L.

1. spectabilis, Willd. 217.
2. gracilis, Lk. 217.
3. cinnamomea, L. 217.

IX. OPHIOGLOSSACÉES.

110. Ophioglossum, L.

1. reticulatum, L. 218.
β cordatum, 91*.
2. nudicaule, L. 218.
† 3. Spruceanum, F. 218.

111. Cheiroglossa, Presl.

1. palmata, Presl. 219.

II. LYCOPODIACÉES.

1. Lycopodium, Spring.

1er type : Selago.

1. Selago, L. 92*.

2e type : reflexum.

2. reflexum, Lmrk. 220, 92*.
† 3. flaccidum, F. 92.*
† 4. heterocarpon, F. 93*.
5. intermedium, Spring. 220, 93*.
6. myrsinites, Lmrk. 220.
7. sarmentosum, Spring. 221.

3e type : linifolium.

8. linifolium, L. 221, 93*.
Var. β sanguineum.
† 9. flexibile, F. 93*.
10. Brongnartii, Spring. 221.

4e type : dichotomum.

11. setaceum, Hamilt. 221.
β Brasiliense, 221.
12. Mandioccanum, Radd. 221.

5e type : verticillatum.

13. verticillatum, L. 221, 94*.
β apertum.
14. tenue, H. Bonpl. 222.
15. fontinaloides, Spring. 222.
β coronatum, F. 94*
ϑ adpressum, F. 94*.
16. nitens, Chamiss. F. 223, 94*.

7e type : Gnidioides.

17. rubrum, Chamiss. 223.

8e type : phlegmaria.

† 18. erythrocaulon, F. 94*.

9e type : ophioglossoides.

19. subulatum, Desv. 223.
† 20. assurgens, F. 95*.

10e type : inundatum.

21. alopecuroides, L. 223, 96*.
β furcatum.
23. contextum, Mart. 223.

11e type : annotinum.

24. cernuum, L. 224, 96*.
25. Eichleri, Glaz. 96*.

12e type : clavatum.

26. clavatum, L. 224, 97*.
Var. distachyum.
† 27. eriostachys, F. 224.
28. trichiatum, Bory. 225, 97*.

13e type : Carolinianum.

29. Carolinianum, L. 225, 97*.
30. paradoxum, Mart. 225.

14e type : complanatum.

31. complanatum, L. 225, 97*.
Var. β adpressifolium, Spring.

15e type : Jussiæi.

32. comptonoides, Desv. 226.

2. Selaginella, Spring.

1er type : rupestris.

1. rupestris, Spring. 226.
† 2. brevipes, F. 226.

2e type : involvens.

3. convoluta, Spring. 226.

3e type : apus.

4. apus, Spring. 227, 267, 97*.
5. crassinervia, Spring. 227, 97*.
6. polysperma, Spring. 227, 98*.
† tenuissima, F. 98.

4e type : microphylla.

8. microphylla, Spring. 227.

5e type : cœspitosa.

9. erectifolia, Spring. 227.

6e type : porelloides.

10. muscosa, Spring. 228, 98*.

7e type : serpens.

11. serpens, Spring. 98.

8e type : Jungermannioides.

12. Jungermannioides, Spring. 228.
13. Breynii, Spring. 228.
† 14. canescens, F. 99.

9e type : Ericina.

† 15. ericoides, F. 228.

10e type : didymostachya.

16. flexuosa, Spring. 229, 69.
17. macrostachya, Spring. 229.
† 18, Bella, F. 99*.
19. Gardneri, Spring. 229.
† 20. geminata, F. 100*.
† 21. camptostachys, F. 229.

11e type : lævigata.

22. lævigata, Spring. 230.

12e type : inæqualifolia.

23. Bahiensis, Spring. 230.
24. erythropus, Spring. 230, 267.

13e type : caulescens.

25. coarctata, Spring. 230.

14e type : flabellosa.

26. amazonica, Spring. 230.

15e type : decomposita.

27. decomposita, Spring. 231.

16e type : stolonifera.

28. marginata, Spring. 231.
29. distorta, Spring. 231.
30. excurrens, Spring. 231.

17e type : sulcata.

31. sulcata, Spring. 231.
32. suavis, Spring. 232.
33. Pœppigiana, Spring. 232.
† 34. Glaziovii, F. 232, 101*.

18e type : stellata.

35. stellata, Spring. 233.
36. conduplicata, Spring. 233.

3. Psilotum, Sw.

1. triquetrum, Sw. 233.

III. HYDROPTÉRIDÉES.

I. Salviniacées.

1. Azolla, Lmrk.

4. Magellanica, Willd. 234.
2. microphylla, Klfss. 234.

2. Salvinia, Mich.

1. hispida, H.-B. Kth. 234.
2. rotundifolia, Willd. 235.
3. oblongifolia, Mart. 235.

II. Marsiléacées.

3. Marsilea, L.

1. Brasiliensis, Mart. 235.

IV. ÉQUISÉTACÉES.

1. Equisetum, L.

1. Brasiliense, Mild. 236.
2. Martii, Mild. 236.
3. pyramidale, L. 236.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES.

NB. Le premier chiffre conduit à l'espèce décrite.

	Pages.
Aconiopteris longifolia, F.	1, 2
Acrophorus bifidus, Th. Moor.	79
ACROSTICHÉES.	1
ACROSTICHUM, F.	1
acuminans, F.	10
acutum, F.	9
alismæfolium, F.	2
angustum, F.	12
Auberti, Desv.	15
auricomum, Bak.	10
Beaurepairei, F.	10
chrysolepsis, F.	10
conforme, Sw.	15
crassinerve, Kze.	3, 15
craspedariæforme, F.	5
cuspidatum, Willd.	11
elegans, F.	11
erinaceum, F.	6, 15
flaccidum, F.	5
Gardnerianum, Kze.	12
gracile, F.	8
Herminieri, F.	9
hirtipes, F.	6
horridulum, Klfss.	14
hybridum, Hook. Gr.	15
hymenodiastrum, F.	4
insigne, F.	6, 7
latifolium, Sw.	1
Langsdorffii, Hook. Gr.	13
Lechlerianum, Metten	5
Lingua, Radd.	3, 4, 5
Lisianum, Glaz.	13
longifolium, Sw.	1
Macahense, F.	2
Martinicense, Desv.	7, 8
minutum, Pohl.	5
mollissimum, F.	5
obliquatum, F.	9
omphalodes, F.	7
ovalifolium, F.	3
ovatum, F.	3
prælongum, F.	10
producens, F.	4
rigidum, F.	7
scandens, F.	5
spissum, F.	5, 15
splendens, Bor.	11
squamatum, Sw.	12
stramineum, F.	8
viscidum, F.	12
ADENOPHORUS, Gaud.	59
ADIANTÉES.	22
ADIANTOPSIS, F.	34
incisa, Th. Moor.	34
obtusissima, F.	34
regularis, Th. Moor.	34
ADIANTUM, L.	22
Æthiopicum, L.	23
Capillus Veneris, L.	24
cardiochlæna, Kze.	23
cuneatum, Land. Fisch.	24
curvatum, Klfss.	22
delicatulum, Mart.	22
Flagellum, F.	22
fovearum, Radd.	23
gratum, F.	23
hirtum, Klotz.	23
intermedium, Sw.	23
lunulatum, Burm.	22, 24
obtusum, Desv.	24
pectinatum, Kze.	23
polyphyllum, Willd.	23
pulverulentum, L.	22
Seemanni, Hook.	22
tenerum, Lk.	23
thalictroides, F.	23
trigonum, Labill.	23
ALEURITOPTERIS, F.	36
farinosa, F.	36
ALSOPHILÉES.	80
ALSOPHILA, R. Br.	80
aperta, F.	80
Capensis, Hook.	83
Corcovadensis, F.	80
decipiens, F.	81
dichromatolepis, F.	80
Glaziovii, F.	80
glumacea, F.	80
Guimaraensis, F. et Glaz.	81
impressa, F.	81
leptocladia, F.	80
leucolepis, Mart.	80
Ludoviciana, F.	80
nigrescens, F.	80
phalerata, Mart.	80
pilosa, Mart.	41
procera, Klfss.	80
rigidula, Mart.	80
scrobiculata, F.	80
villosa, Desv.	80
ANEIMIA, Sw.	88
adiantifolia, Sw.	89
ciliata, Presl.	89
flexuosa, Radd.	89
Raddiana, Lk.	89
rotundifolia, Schrad.	88
radicans, Radd.	88
tomentosa, Sw.	89
ANEIMIACÉES.	88
ANEIMIÆBOTRYS, F.	89
aspera, F.	89
ANEIMIÆDICTYON, J. Sw.	89
Phyllitidis, J. Sw.	89
ANOGRAMME, Lk.	41
Chærophyllum, Desv.	41
ANTIGRAMME.	47
Douglasii, H. et Grev.	48
Lageana, F. et Glaz.	48
repanda, Presl.	47, 48
ANTROPHYÉES.	39
ANTROPHYUM, Klfss.	39
lineatum, Klfss.	39
APOTOMIA.	22, 21
ASPIDIÉES.	75
ASPIDIUM, Sw.	71, 77
acutum, Hook.	76

Pages.
alsophilaceum, Kze. 76
amaurolepis, F. 75
amplissimum, Bak. 75
biforme, F. 75
Caripense, Hook. 75
consobrinum, Bory. 75
conspersum, Schrad. 72
denticulatum, Sw. 74
eriocaulon, F. 74
eriosorus, F. 73
Filix-mas, L. 72
flexuosum, F. 75
flexuosum, Bak. 75
gracilipes, F. 74
helveolum, F. 74
latissimum, F. 75
macrostegium, Hook. 76
Mexicanum, Presl. sub lastrea. 76
nephrodioides, F. 75
oligocarpon, Willd. 74
paludosum, Radd. 76
palustre, Bak. 76
parallelogrammum, Kze. 72
patens, Radd. 72, 75
patulum, Sw. 76
phœochlamys, F. 75, 76
platyrachis, F. 71
Ptarmica, Kze. 76
pubescens, Radd. 73
ramentaceum, Bak. 75
ramosum, F. 75
Rivoirei, F. 74
rivulorum, Radd. 71, 74
rufescens, Schrad. 76
Sancti-Gabrieli, Bak. 75
semi-cordatum, Sw. 70
Sprengelii, Klfss. 74
subobliquatum, Bak. 75
tenerrimum, F. 74
Tijucense, F. 72
ASPLÉNIÉES. 41
Asplenium, L. 42
abscissum, Willd. 43, 46
Adiantum-nigrum, L. 47
alatum, H. B. Kze. 43
auritum, Sw. 44
bidentatum, Kze. 43
Blanchetii, Metten. 48
camptocarpon, F. 42
caudatum, Forst. 45
cirrhatum, Rich. 42
cuneatum, Lmrk. 46
divergens, Mett. 47
Douglasii, H. Grev. 48
Escragnollei, F. 42
falcatum, Lmrk. 47
firmum, Kze. 43
gibbosum, F. 42
Hallii, Hook. 45
harpeodes, Kze. 43

Pages.
incisuratum, F. 44
jucundum, F. 44
lætum, Schk. 46, 47
Lechleri, Mett. 48
macrodon, F. 43
monanthemum, L. 47
Neogranatense, F. 42
oligophyllum, Klfss. 42
ovalescens, F. 46
præmorsum, Sw. 47
pseudonitidum, Radd. 46
pulchellum, Radd. 44, 45
pumilum, Sw. 46
regulare, Sw. 43
Riedelianum, Bong. 48
salicifolium, Radd. 42, 44
scandicinum, Hook. 47
Schkuhrianum, Presl. 46
Serra, Langsd., Fisch.; var. Woodwardioides. 45
Serronii, F. 44
trapezoides, Sw. 46
Trichomanes, L. var. Brasiliensis, F. 45
Athyrium, Roth. 41
incisum, F. 41
Balantium, Presl. 79
Sellowianum, Presl. 79
Belvisia, Mirb. 84
Blechnopsis, Presl. 18
Blechnum, L. 16
Brasiliense, Desv. 19
cognatum, Presl. 17
diplotaxicum, F. 18
elongatum, Gaud. 9
glandulosum, Kze. 17
gracile, Klfss. 16, 19
hastatum, Klfss. 18, 19
helveolum, F. 17
heterocarpon, F. 17
integerrimum, Spr. 19
Lanceola, Sw. 16
Lechleri, Metten. 19
mucronatum, F. 17
nitidum, Presl. 19
occidentale, L. 17, 19
serrulatum, C. Rich. 18
triangulare, Lk. 17
unilaterale, Willd. 16
Campylonevron, Presl. 64
latum, Th. Moor. 65
lucidum, Th. Moor. 64
Phyllitidis, Pr. 65
repens, Presl. 64
Cassebeeria *paradoxa*, F. 28
CÉRATOPTÉRIDÉES. 84
Ceratopteris, A. Brong. 84
thalictroides, A. Brong. 84
CHEILANTHÉES, Sw. 34
Cheilanthes, Sw. 36
aquilinaris, F. 37

Pages.
glandulifera, F. 36, 37, 40
glandulosa, F. 36, 37
hirsuta, Lk. 38
hirta, Sw. 37
incisa, Metten. 34
microphylla, Sw. 36
pyramidalis, F. 38
regularis, Kze. 34
rigescens, Kze. 36
Sellowiana, Presl. 38, 39
Tweediana, Hook. 36
viscosa, Klfss. 37
Chiladostachys, Wall. *Herb.* 84
Craspedaria, Lk. 65
auriseta, F. 65
camptocarpa, F. 65
crispata, F. 66
grandis, F. 66
serpens, F. 66
Cryptogenis, Rich. 84
Cyathea grandifolia, Willd. 84
vestita, Spreng. 62
CYCLODIÉES. 68
Cyclodium, Presl. 71
meniscioides, Presl. 71
DANÆACÉES. 90
Danæa, Smith. 90
longifolia, Desv. 90
Davallia, Sm. 78
bifida, Klfss. 79
Schimperi, Hook. 78
Sprucei, Hook. 78
thecigera, H. Bonpl. 78
DAVALLIÉES. 78
Dicksonia, Lher. 79
apiifolia, Sw. 79
cicutaria, Radd. et auct. 78
Sellowiana, Hook. 79
DICKSONIÉES. 79
Didymoglossum, Presl. 85
Hookerii, Presl. 85
sociale, F. 85
DIPLAZIÉES. 48
Diplazium, Sw. 48
ambiguum, Radd. 49
Callipteris, F. 48
celtidifolium, Kze. 48
delicatulum, F. 49
dissimile, F. 48
Glaziovii, Bak. 49
grandifolium, Sw. 48
herbaceum, F. 49
Lechleri, Moor. 48
leptochlamys, F. 49
parallelogrammum, F. 48
rostratum, F. 49
Doryopteris, J. Sw. 29
angularis, F. 29, 30
hastata, F. 29
patula, F. 30

Pages.
pedata, J. Sm. 31
Raddiana, F. 29, 30
Raddiana, var. multipartita, F. 29
Raddiana, var. *patula*, F. 30
rediviva, F. 30
DRYNARIA, Bory. 66
exul, Metten. 67
iteophylla, F. 67
lepidota, Schlec. 67
Lindbergii, Metten. 67
lycopodioides. 66
percussa, F. 66
serpens, F. 66
ELLOBOCARPUS, Klfss. 84
EUPOLYSTICHUM. 68
EUPTÉRIDÉES. 33
EUSCHIZÉACÉES. 88
FURCARIA, Desv. 84
GLAPHYROPTERIS, Presl. 40
decussata, L. 40
erubescens, Wall. 41
rudis, Presl. 41
GLEICHÉNIACÉES. 87
GONIOPHLEBIUM, Presl. 62
albo-punctatum, J. Sm. 64
demissum, F. 63
dissimile, F. 64
elatius, Th. Moor. 64
grammatoides, F. 63
hirsutissimum, F. 62
lætum, F. 62
latipes, J. Sm. 62
meniscifolium, F. 63
GONIOPTERIS, Presl. 61, 77
Bahiensis, F. 61
Guadalupensis, F. 62
hastata, F. 61
leptocladia, F. 62
pyramidata, F. 62
quadrangularis, F. 62
rostrata, F. 62
GRAMMITIS, Sw. 50
Fluminensis, F. 51
furcata, H. et Grev. 52
limbata, F. 51
marginella, Sw. 51
muscosa, F. 51
myosuroides, Radd. 51
Organensis, F. 50
paucinervata, F. 51
setosa, Klfss. 51
Wittigiana, Fr. et Glaz. 50
GYMNOGRAMME, Desv. 39
asplenioides, Sw. 39
attenuata, F. 39
insignis, Metten. 40
microcarpa, F. 40
myriophylla, Sw. 40
patula, F. 40
Sellowiana, Metten. 39
GYMNOTHECA, Presl. 90

Pages.
cicutæfolia, Presl. 90
HEMICARDION, F. 70
Nephrolepis, F. 70
HÉMIONITIDÉES. 38
HEMISTEGIA, Presl. 84
Willdenowii, F. 84
HEMITHELIA, Presl. 83
Gardneriana, Presl. 83
grandiflora, Hook. 84
multiflora, R. Br. 84
platylepis, Hook. 84
Sellowiana, Presl. 83
HETEROPTERIS, F. 67
Doryopteris, F. 67
HEWARDIA, J. Sm. 24
dolosa, Kze. 24
HYMENOPHYLLACÉES. 85
HYMENOPHYLLÉES, Sm. 85
HYMENOPHYLLUM, Smith. 85
asplenioides, Sw. 85
caudiculatum, Mart. 86
caulopterum, F. 87
delicatissimum, F. 86
Jalappense, Schlech. 86
macrocarpon, F. Schaff. 86
microcarpon, F. 86
polyanthos, Sw. 86
rufum, F. 87
HYPOLEPIS, Bernh. 34, 36
Dicksonioides, F. 34
parviloba, F. 34
repens, L. 34
rigescens, Kze. 35
serrata, F. 35
stolonifera, F. 36
JAMESONIA, Hook. Grev. 38
adnata, Kze. (tardivement reçue). »
scalaris, Kze. 38
LEPIDONEVRON, F. 76, 77
rufescens, F. 76
LEPTOGRAMMÉES. 39
LINDSAYA, Dryand. 20
botrychioides, Saint-Hil. 21
curvans, F. 20
dentata, F. 20, 21
ovoidea, F. 21
polymorpha, Wall. 21
reniformis, Dryand. 20
LINDSAYÉES. 20
LITOBROCHIA, Presl. 31
aculeata, Bak. 33
angustata, F. 32
Brasiliensis, F. 31
denticulata, F. 32
dissimilis, F. 31
elegans, F. 33
gigantea, F. 32
macroptera, Link. 32
pallida, Presl. 33
sericea, F. 32
splendens, F. 31

Pages.
varians, F. 33
LOMARIA, Willd. 15
Fialhoi, F. Glaz. 15
Gayana, F. 16
mucronata, Glaz. 16
obtusata, Labill. 16
Penna-marina, Poir. 16
tabularis, Thunb. 16
LOMARIÉES. 15
LONCHITIS, L. 33
Lindeniana, Hook. 33
repens, L. 34
LOPHOSORIA, Presl. 82
cæsia, Presl. 82
dorsalis, F. 83
pruinata, Presl. 82
LYCOPODIACÉES. 92
LYCOPODIUM, Spring. 92
alopecuroides, L. 96
assurgens, F. 95
Carolinianum, L. 97
cernuum, L. 96
clavatum, L. 97
complanatum, L. 97
Eichleri, Glaz. 96
erythrocaulon, F. 95
flaccidum, F. 92
flexibile, F. 94
fontinaloides, Spring. 94
heterocarpon, F. 93
intermedium, Spring. 93
linifolium, L. 93
reflexum, Lmrk. 92
Selago, L. 92
serpyllifolium, F. 94, 95
trichiatum, Bory. 97
verticillatum, L. 94
LYGODIACÉES. 90
LYGODIUM, Sw. 90
hastatum, Desv. 90
Pohlianum, Presl. 90
MARATTIACÉES. 90
MÉNISCIÉES. 50
MENISCIUM, Schrad. 50
reticulatum, Sw. 50
MERTENSIA, Willd. 87
furcata, Willd. 87
grandis, F. 38
latissima, F. 88
longipes, F. 87
MESOTHEMA, Presl. 18
MICROLEPIA, Presl. 78
Fluminensis, F. 78
Microstegnus grandifolius, Presl. 84
NEPHRODIUM, Rich. 77
flexuosum, Bak. 75
molle, Schott. 77
Pohlianum, Presl. 77
NÉPHROLÉPIDÉES. 77
NEPHROLEPIS, Schott. 77
biserrata, Sm. 78

Pages.
exaltata, Schott. 78
tuberosa, Presl. 78
undulata, J. Sm. 77
NEVROGRAMME, Lk. 38
scandens, F. 39
tomentosa, L. 38
Odontoloma bifidum, Mett. 79
OLEANDRA, Cav. 77
hirta, Brak. 77
OLIGOLÉPIDÉES. 1
ONYCHIUM, Klfss. 25—84
OPHIOGLOSSACÉES. 91
OPHIOGLOSSUM, L. 91
reticulatum, L. 91
Paesia viscosa, Saint-Hil. 36, 37, 40
PARKERIA, Hook. 84
PELLÆA, Link. 26
Bongardiana, Bak. 28
crenulans, F. 27
flavescens, F. 28
Itatiaiensis, F. 26
microphylla, F. 27
paradoxa, F. 28
subsimplex, F. 29
PELLÆES. 33
PHANEROPHLEBIA, Presl. 70
aurita, F. 70
PHEGOPTERIS, F. 59
camptocaulon, F. 60
connexa, F. 60
decussata, Metten. 40
divergens, Sw. 61
flavo-punctata, F. 59
hirsuta, Baker. 61
lasiernos, Metten. 61
pteroidea, F. 60
splendida, F. 60
subincisa, F. 75
PHEGOPTEROIDES. 69
PLEUROGRAMMEES. 19
POLYLÉPIDÉES. 10
POLYPODIACÉES. 1
POLYPODIÉES. 50, 77
POLYPODIUM, L. 52, 61
achilleæfolium, Klfss. 59
acrodontium, F. 53
angustissimum, F. 55, 56
apiculatum, Klotz. 56, 57
argyratum, Bor. var. Brasiliana. 53
aurisetum, Radd. 65
ciliare, F. 59
confluens, F. 56, 58
connexum, Klfss. 60
cultratum, Willd. 59
dissimile, L. 64
divergens, Sw. 61
diversifolium, Bak. 62
exiguum, F. 56
ferrugineum, Mart. et Gal. 56

Pages.
flavo-punctatum, Klfss. 59
gradatum, Bak. 45
hirsutulum, F. 54
hirsutulum, Radd. 54
immersum, F. 56
jubæforme, Klfss. 55
Karwinskianum, A. Br. 53
lætum, Radd. 62
lepidotum, Schlec. 67
leucostictum, Klotz. 54
longipes, F. 53
meniscifolium, Langs. Fisch. 63
Meridense, Klotz. 57
moniliforme, Cav. 55, 56, 59
nidulans, Beyr. 57
otites, L. 57
ovalescens, F. 59
paradisiastrum, F. 56
Pecten, F. 57
pectinatum, L. 56, 57
pectinellum, F. 57
percussum, Cav. 66
pilosum, F. 58
plebeium, Schlec. 53
pleopeltidis, F. 53
pteroideum, Klfss. 40, 60
pubescens, Radd. 73
punctatum, Baker. 35
recurvatum, Klfss. 56
repandum, F. 54
rigescens, Bor. 59
robustum, F. 57
semi-adnatum, Hook. 59
serpens, F. 66
Spixianum, Mart. 57
splendidum, Klfss. 60
subdicarpon, F. 55
submarginale, Lang. Fisch. 75
tenuiculum, F. 53
Trichomanes, L. 56
typicum, F. 52
villosum, F. 54
vulgare, L. 52, 62
POLYSTICHUM, Roth. 68, 77
coriaceum, Schott. 68
giganteum, F. 69
lanosum, F. 69
platylepis, F. 70
quadrangulare, F. 68
Rochaleanum, F. 69
PTÉRIDÉES. 25
PTERIS, L. 25, 77
aculeata, Sw. 33
aquilina, L. 38
arachnoidea, Klfss. 26
Brasiliensis, Radd. 31, 32
caudata, L. 26
collina, Radd. 29
Cretica, L. 32

Pages.
Cretica, Americana, F. 25
denticulata, Sw. 32
elegans, Velloz. 30
elegans, Sw. 33
esculenta, Forst. 26
fallax, Kze. 60
geraniifolia, Radd. 27
gigantea, Willd. 32
gracilis, F. 25
hastata, Radd. 29
litobrochioides, F. 25
lomariacea, Hook. et B. 28
lonchophora, Metten. 28, 29
macroptera, Lk. 32
pallida, Radd. 33
palmata, Willd. 31
pedata, L. 30, 31
platychlamys, F. 25
sagittifolia, Radd. 29
semi-dentata, F. 25
splendens, Klfss. 31
varians, Radd. 29
vespertilionis, Labill. 27
viscosa, Th. Moor. 37
RHIPIDOPTERIS, Schott. 15
peltata, Schott. 15
var. stenophylla, F. 15
SCHIZÆA, Sm. 84
SCHIZÉACÉES. 88
SCOLOPENDRIÉES. 47
SELAGINELLA, Spring. 98
apus, Spring. 98
Bella, F. 100
Brennii, Spring. 99
canescens, F. 99
crassinervia, Spring. 98
flexuosa, Spring. 100
geminata, F. 100
Glaziovii, F. 101
Jungermannioides, Spring. 99
macrostachya, Spring. 100
muscosa, Spring. 98
polysperma, Spring. 98
serpens, Spring. 99
tenuissima, F. 98
SPHÆROCIONIUM, Presl. 86
Stenoloma Glaziovii, F. 79
SYNECHIA. 21, 22, 24
TECTARIA, Cavan. 68
TELEOZOMA, R. Br. 84
TRICHOMANOIDÉES. 85
TRICHOPTERIS, Presl. 83
elegans, Presl. 83
VITTARIA, Sm. 19
lineata, L. 19
VITTARIÉES. 19
XIPHOPTERIS, Klfss. 19
serrulata, Klfss. 19
setosa, Klfss. 51



Jobin, del. & lith. *Lith. Hubert & Haberer, Succ.rs de E. Simon Strasbourg*

Fig. 1. **Acrostichum** *Macahense. F.* | *Fig. 2.* **Acrostichum** *Beaurepairii. F.*



John. del. & lith.

Lith. Hubert & Haberer. Succ.r de F. Simon. Strasb.g

Fig. 1. **Acrostichum** *producens, F.* | *Fig. 2.* **Acrostichum** *ovatum, F.*



Meyer del. et lith. *Lith. Hubert & Haberer Suc.rs de F. Simon Strasb.g*

Fig. 1. **Acrostichum** *craspedarioeforme F.* | *Fig. 2.* **Acrostichum** *omphalodes, F.*



Meyer, del & lith

Lith. Hubert & Haberer Succ^rs de E. Simon, Strasbourg.

Fig. 1. **Acrostichum** *insigne, F.*

Fig. 2. **Acrostichum** *crinaceum, F.* (*Fragmentum ad comparandum*)



Jobin del. & lith. *Lith. Hubert & Haberer Succ.rs de E. Simon à Strasb.g*

Fig. 1. **Acrostichum** *rigidum, F.* | *Fig. 2.* **Acrostichum** *gracile, F.*

Fig. 3. **Acrostichum** *acutum, F.*



Jobin del & lith *Lith. Hubert & Haberer, Succ.rs de E. Simon Strasb.g*

Fig. 1. **Acrostichum** *obliquatum, F.* | *Fig. 2.* **Acrostichum** *stramineum, F.*



Meyer del. et lith. *Lith. Hubert & Haberer, Succ.rs de E. Simon, Strasbourg*

Fig. 1. **Acrostichum** *elegans, F.* | *Fig. 2.* **Rhipidopteris** *peltata, Schott. var: stenophylla, F.*

Fig. 3. **Didymoglossum** *sociale, F.*



Meyer del. & lith. *Lith. Hubert & Haberer Succ.rs de E. Simon, Strasb.g*

Fig. 1. **Acrostichum** *viscidum, F.* *Fig. 2.* **Acrostichum** *Liaisianum, Glaz.*
Fig. 3. **Acrostichum** *angustum, F.*

Jobia, del. & lith. *Lith. Hubert & Haberer, Succ.rs de E. Simen, Strasb.g*

Fig. 1. **Lindsaya** *ovoidea, F.* | **Lindsaya** *dentata, F.*

Fig. 3. **Pellæa** *crenulans, F.*



Jobin del. et lith. *Lith. Hubert & Haberer, Succ.rs de F. Simon, Strasb.g*

Fig. 1. **Pellæa** *Itatiaiensis, F.* | *Fig. 2.* **Doryopteris** *angularis, F.*

Fig. 3. **Cheilanthes** *glandulifera, F.* (*Paesia, St. Hil.*).



Jobin del et lith. *Lith. Hubert & Haberer, Succ.d F. Simon, Strasb.*

Fig. 1. **Doryopteris** *rediviva, F.* | *Fig. 2.* **Doryopteris** *patula, F.*



Jobin del. et lith.

Lith. Imbert & Haberer Succ.d de Simon Strasb.

Litobrochia *dissimilis, F.*

FILICES BRASILIANÆ.



Jobin del & lith.

Lith Hubert & Haberer Succ.s d'F. Simon Strasb.

Fig. 1. **Cheilanthes** *aquilinaris*, *F.*

Fig. 2. **Cheilanthes** *stolonifera*, *F.*



Jobin del et lith. *Lith. Hubert & Haberer, Succ.d E. Simon, Strasb.g*

Nevrogramme *scandens, F.*



Jobin del & lith *Lith. Hubert & Haberer Succ.s d'E. Simon, Strsb*

Athyrium *incisum*, F.



Meyer del & lith.

Lith. Hubert & Haberer, Succ.d E. Simon, Strasb.g

Fig. 1. Asplenium *incisuratum, F.* || *Fig. 2.* Asplenium *Trichomanes, L.* *var: Brasiliensis.*



Jobin del et lith. *Lith. Hubert & Haberer, Succ.d E. Simon, Strsb.*

Fig. 1. **Grammitis** *wittigiana F. et Gl.*

Fig. 2. **Grammitis** *muscosa, F.*

Fig. 3. **Polypodium** *longipes, F.*

Fig. 4. **Drynaria** *ideophylla, F.*



J. Meyer, del et lith.

Lith. Hubert & Haberer, Succ.d E. Simon Strasb.g

Fig. 1. **Grammitis** *uninervata, F.*

Fig. 2. **Polypodium** *typicum, F.*

Fig. 3 **Polypodium** *angustissimum, F.*

Fig. 4. **Polypodium** *subdicarpon, F.*



Jobin, del & lith. *Lith. Hubert & Haberer Succ.ʳ d'E. Simon, Strasb.*

Fig. 1. **Polypodium** *villosum, F.* | *Fig. ?* **Polypodium** *acrodontium, F.*

Fig. 3. **Polypodium** *pilosum, F.*



J. Meyer, del et lith. Lith. Hubert & Haberer, Succ.s d'E. Simon, S.r

Fig. 1. **Craspedaria**, *camptocarpa*, *F.* ‖ *Fig. 2.* **Phegopteris**, *camptocaula*, *F.*



Johin del. et lith. *Lith. Hubert & Haberer, Succ.r de E. Simon, Strasb.g*

Fig. 1. **Polystichum** *quadrangulare, F.* ‖ *Fig. 2.* **Polystichum** *Rochaleanum, Glaz.*

Jobin del et lith.

Lith. Hubert & Haberer, Succ.d E. Simon, Strasb.g

Fig. 1. **Phanerophlebia** *aurita, F.* | *Fig. 2.* **Aspidium** *platyrachis, F.*



Jobin, del & lith. *Lith. Hubert & Heberer Succ.d E. Simon, Strsb.*

Aspidium *eriosorus, F.*



Jobin del & lith.

Lith. Hubert & Haberer, Succ.d V. Simon, Strasb.

Aspidium *Tijucense, F.*



Meyer del & lith *Lith. Hubert & Haberer, Succ.r d'E. Simon Strsb.*

Fig. 1. **Alsophila** *decipiens. F.* | *Fig. 2.* **Alsophila** *Guimaraensis, F.*

FILICES BRASILIANÆ.



Sobin del & lith. *Lith. Hubert & Haberer. Succ.d E. Simon, Strasb.*

Lophosoria *cæsia, F.*



Jobin. del. et lith. *Lith. Hubert & Haberer, Succ.d d'E. Simon, Strasb.g*

Fig. 1. **Hymenophyllum** *delicatissimum, F.* | *Fig. 2.* **Mertensia** *longipes, F.*

Fig. 3. **Lycopodium** *flexible, F.*



J. Meyer, del et lith

Lith. Hubert & Haberer; Succ.d W. Simon, Strasbourg.

Fig. 1. **Lycopodium** *flaccidum*, F.

Fig. 2. **Lycopodium** *erythrocaulon*, F.

Fig. 3. **Lycopodium** *assurgens*, F.

Fig. 4. **Lycopodium** *Eichleri*, Glaz.

LYCOPODIACEÆ BRASILIANÆ.



Meyer del & lith. *Lith. Hubert & Haberer, Succ.r d'E. Simon, Strasb.g*

Lycopodium *trichiatum*, *Bory*.



J. Meyer, del. et lith. *Lith. Hubert & Haberer, Succ.r d'E. Simon Strasb.*

Fig. 1. **Selaginella** *tenuissima, F.*
Fig. 3. **Selaginella** *bella, F.*

Fig. 2. **Selaginella** *canescens, F.*
Fig. 4. **Selaginella** *geminata, F.*